

第 6 章 事後調査の結果の概要

第 6 章 事後調査の結果の概要

6.1 陸域生物・陸域生態系

陸域改変区域に分布する重要な種及びコアジサシの繁殖については、改変区域の一部緑化の環境保全措置を実施することとしているが、効果の不確実性を伴うため、事後調査を実施した。

6.1.1 陸域改変区域に分布する重要な種

(1) 調査概要

「自然環境保全基礎調査」（環境省）及び「河川水辺の国勢調査マニュアル」（建設省）等に準拠し、陸域改変区域を踏査し、評価書で提示した重要な種の確認地点などについて記録を行い、可能な限り写真撮影を行った。

各調査の事後調査地域、踏査ルート等は、図－6.1.1、図－6.1.3～図－6.1.5 に示しておりである。


なお、踏査ルート等は、調査地域に植生の状況や地形、土質等を考慮しながら設定した。

●重要な植物種・植物群落

- ・ 任意踏査法
- ・ 重要な植物種・植物群落の位置、生育状況等を記録

●重要な動物種

- ・ 任意踏査法、トラップ法等
- ・ 重要な動物種の個体数、確認位置、生息状況等を記録



図一6.1.1 事後調査地域（陸域生物・陸域生態系）




□：調査地域（陸域改変区域）

注：調査地域（陸域改変区域）の海側は、空港の外周道路までを範囲としており、写真に示すように再侵入防止対策（道路脇にある黒の管）を設置し、調査地域（陸域改変区域）の内外を判断していた。


注：令和元年度を以て工事が終了し、陸域改変区域の境界として扱っていたオカヤドカリ類の進入防止柵が撤去されたが、令和2年度も同様のラインで内外を区別した。ただし、オカヤドカリ類については、大嶺崎周辺のフェンスの内側において、陸域改変区域とその周辺を合わせて取りまとめを行った。

注：令和元年度冬季以降、連絡誘導路の取り付け部では調査を行っていない。

図－6.1.2 大嶺崎周辺における陸域改変区域



図－6.1.3 任意踏査法の調査範囲及び踏査ルート（重要な植物種・植物群落）



図－6.1.4 トラップ法の実施地点（哺乳類）




図-6.1.5 (1) 任意踏査法の調査範囲及び踏査ルート(哺乳類、昆虫類)




図-6.1.5 (2) 任意踏査法の調査範囲及び踏査ルート(陸生貝類、オカヤドカリ類)

(2) 調査結果

1) 重要な植物種・植物群落

(ア) 重要な植物種

確認された重要な植物種一覧は表－6.1.1 及び表－6.1.2 に、確認状況は表－6.1.3 に、確認位置は図－ 6.1.6 に示すとおりである。

なお、調査地域に生育する植物の生育環境や地形、土質等を考慮しながら、調査ルート等を設定した。

環境影響評価時の現地調査及び事前調査の際に陸域改変区域（連絡誘導路及び仮設橋の取り付け部を含む）で確認された重要な植物種はハリツルマサキであり、平成 26 年度に連絡誘導路の工事で消失したため、それ以降確認されなかった。

令和 2 年度調査では、陸域改変区域では重要な植物種は確認されなかった。

一方、陸域改変区域外の重要な植物として、イソフジ、ミズガンピ、ハリツルマサキ、タマハリイの 4 種が確認された。

イソフジは、11 個体の生育が確認され、開花、結実が確認されるなど生育状況は良好であった。令和 2 年度調査時では、過年度の 1 個体に比べ、個体数が 11 個体に増加した。これは、従来確認されていた成木 1 個体のほかに、実生株 10 個体の生育が確認されたためである。成木個体には、過去に結実が確認されていたことから、実生株は成木個体を由来とした種子からの発芽個体と考えられる。新たに実生株が発生した要因としては、周辺環境の変化が挙げられる。イソフジに近接して生育するアダンの枝が伐採された状況を確認したことから、枝の伐採によりイソフジが生育する箇所の光条件が変化し、種子からの発芽が促されたと考えられる。

ミズガンピは、1 個体の生育が確認され、開花、結実が確認されるなど生育状況は良好であった。

ハリツルマサキは、20 個体の生育が確認され、生育状況は良好であった。

タマハリイは、新たに 150 個体の生育が確認され、開花、結実が確認された。生育状況はやや悪い状況であったものの、季節要因と考えられる。

表－6.1.1 陸域改変区域で確認された重要な植物種一覧

調査期日：夏季：令和2年7月20、21日、8月6日

冬季：令和3年1月27、28日

No.	学名	和名	選定基準				調査時期	
			天然 記念物	種の 保存法	環境省 RL	沖縄県 RDB	夏季	冬季
1	該当なし							
計	0 種		0	0	0	0	0	0

注：重要な植物種の選定基準は表－6.1.2 と同様とした。

表－6. 1. 2 陸域改変区域外で確認された重要な植物種一覧

調査期日：夏季：令和2年7月20、21日、8月6日
冬季：令和3年1月27、28日

No.	和名	選定基準				調査時期	
		天然記念物	種の保存法	環境省 RL	沖縄県 RDB	夏季	冬季
1	イソフジ			絶滅危惧 IB 類		○	○
2	ミズガンピ				準絶滅危惧	○	○
3	ハリツルマサキ			準絶滅危惧		○	○
4	タマハリイ				準絶滅危惧		○
計	4 種	0 種	0 種	2 種	2 種	3 種	4 種

以下の①～④のいずれかに該当しているものを「重要な種」として選定した。

①天然記念物：文化財保護法により、保護されている種及び亜種

- ・特天：国指定特別天然記念物
- ・国天：国指定天然記念物
- ・県天：沖縄県指定天然記念物

②種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」において以下の項目に選定される種及び亜種

- ・国内希少：国内希少野生動植物種
- ・国際希少：国際希少野生動植物種

③環境省 RL：「環境省レッドリスト 2020 の公表について」（令和2年3月27日記者発表、環境省）に記載されている種、亜種、変種、品種

- ・絶滅危惧 I 類：絶滅の危機に瀕している種
- ・絶滅危惧 IA 類：絶滅の危機に瀕している種のうち、ごく近い将来における野生での絶滅の可能性が極めて高いもの
- ・絶滅危惧 IB 類：絶滅の危機に瀕している種のうち、IA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
- ・絶滅危惧 II 類：絶滅の危険が増大している種
- ・準絶滅危惧：存続基盤が脆弱な種。現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種
- ・情報不足：評価するだけの情報が不足している種
- ・地域個体群：地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれが高い個体群

④沖縄県 RDB：「改定・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（レッドデータおきなわ）第3版-菌類編・植物編-」（平成30年、沖縄県）に記載されている種、亜種、変種、品種

- ・絶滅危惧 I 類：沖縄県では絶滅の危機に瀕している種
- ・絶滅危惧 IA 類：沖縄県では、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
- ・絶滅危惧 IB 類：沖縄県では IA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
- ・絶滅危惧 II 類：沖縄県では絶滅の危機が増大している種
- ・準絶滅危惧：沖縄県では存続基盤が脆弱な種
- ・情報不足：沖縄県では評価するだけの情報が不足している種
- ・絶滅のおそれのある地域個体群：沖縄県で地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの

表－6.1.3 陸域改変区域外の重要な植物種の確認状況

調査期日：夏季：令和２年７月 20、21 日、８月 6 日
 冬季：令和３年 1 月 27、28 日

No.	分類群	和名	重要な種の 選定基準	確認状況
1	維管束植物	イソフジ	環境省 RL： 絶滅危惧 IB 類	夏季及び冬季に、陸域改変区域外にて、海浜の 1 地点で確認された。従来確認されていた成木 1 個体のほかに、実生株 10 個体が生育してい た。
2		ミズガンピ	沖縄県 RDB： 準絶滅危惧	夏季及び冬季に、陸域改変区域外にて、海岸の 1 地点で確認された。
3		ハリツルマサキ	環境省 RL： 準絶滅危惧	夏季及び冬季に、陸域改変区域外にて、林内と 林縁の 8 地点で確認された。
4		タマハリイ	沖縄県 RDB： 準絶滅危惧	冬季に、陸域改変区域外にて、草地の 2 地点で 確認された。

※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図ー 6.1.6 (1) 重要な植物種の確認位置(イソフジ、陸域改変区域外)

※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図ー 6.1.6 (2) 重要な植物種の確認位置(ミズガンピ、陸域改変区域外)

※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図ー 6.1.6 (3) 重要な植物種の確認位置(ハリツルマサキ、陸域改変区域外)

※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図ー 6.1.6 (4) 重要な植物種の確認位置(タマハリイ、陸域改変区域外)

 確認個体	 生育地の状況
イソフジ	
 確認個体	 生育地の状況
ミズガンピ	
 確認個体	 生育地の状況
ハリツルマサキ	
 確認個体	 生育地の状況
タマハリイ	

図ー 6.1.7 重要な植物種の確認状況（令和2年度夏季・冬季、陸域改変区域外）

(イ) 重要な植物群落

確認された重要な植物群落一覧は表－6.1.4 に、確認位置は図－6.1.8 に示すとおりである。

なお、調査地域に生育する植生の生育環境や地形、土質等を考慮しながら、調査ルート等を設定した。

環境影響評価時の現地調査及び事前調査にて、調査範囲及びその周辺で分布が確認された重要な植物群落（調査対象群落）8 群落のうち、令和 2 年度には、平成 29 年度から引き続き 6 群落が確認された。

令和 2 年度にはヨシ群落及びハマササゲ群落の縮小、キダチハマグルマ群落の生育状況悪化、ヒメガマ群落の土砂堆積、ナンゴクワセオバナ群落の一部伐採が確認されたものの、計 6 群落が確認され、群落数に変化はみられていない。

ヨシ群落及びハマササゲ群落の縮小、キダチハマグルマ群落の生育状況悪化については、パラグラス等の外来種との種間競争が要因と考えられる。冬季調査においては、ハマササゲ群落について、生育基盤となる砂が強風や波などにより移動したことも縮小の一因とみられた。ヒメガマ群落の土砂堆積については、側溝からの土砂と考えられるが、生育状況の悪化はみられていない。ナンゴクワセオバナ群落の一部伐採は、道路や側溝の管理に伴うものと考えられ、伐採面積は調査範囲内のわずかである。

表－6. 1. 4 陸域改変区域で確認された重要な植物群落一覧

調査期日：夏季：令和 2 年 7 月 20、21 日、8 月 6 日

冬季：令和 3 年 1 月 26、27、28 日

冬季：令和元年1月20日、21、26日

群落名称	天然 記念物	植生 自然度	特定 植物群落	植物群落 RDB	その他	R2	
						夏季	冬季
F. 海岸砂丘植生							
F5 キダチハマグルマ群落		10	該当 (D)			○	○
F8 ハマササゲ群落		10	該当 (D)			○	○
G. 湿地植生							
G1 ヨシ群落		10	該当 (D)			○	○
G2 ヒメガマ群落		10	該当 (D)			○	○
H. 隆起サンゴ礁植生							
H1 アダン群落		9	該当 (A・D・H)	掲載		○	○
I. 休耕地・路傍雑草群落							
I5 ナンゴクワセオバナ群落		4			○	○	○
合計 6 群落						6	6

注 1：重要な植物群落の選定基準は表－6. 1. 5 に示すとおりである。

2：陸域改変区域（連絡誘導路及び仮設橋の取付部）の扱いについて、平成 26 年度事後調査報告書から一部修正している。

3：ナンゴクワセオバナ群落については、平成 26 年度環境保全措置要求（沖縄県）に基づき確認対象として追加している。

表－6.1.5 重要な植物群落の選定基準

略称	基準法令・基準文献等	判定基準
天然記念物	「文化財保護法」 「沖縄県文化財保護条例」 「那覇市文化財保護条例」 「豊見城市文化財保護条例」	国、県、市の天然記念物
植生自然度	「日本の植生Ⅱ」（平成16年、環境省自然環境局）	植生自然度9・10に該当する植物群落
特定植物群落	「第2回特定植物群落調査報告書」（昭和53年、環境庁） 「第3回特定植物群落調査報告書」（昭和63年、環境庁） 「第5回特定植物群落調査報告書」（平成12年、環境庁）	特定植物群落選定基準（表－6.1.6）に該当する植物群落
植物群落 RDB	「植物群落レッドデータ・ブック」（平成8年、（財）日本自然保護協会・（財）世界自然保護基金日本委員会）	掲載されている植物群落
その他	学識経験者・委員会・審議会等で指摘のあった群落	指摘群落

表－6.1.6 特定植物群落の選定基準

A	原生林もしくはそれに近い自然林
B	国内若干地域に分布するが、極めてまれな植物群落または個体群
C	比較的普通にみられるものであっても、南限、北限、隔離分布等分布限界になる産地にみられる植物群落または個体群
D	砂丘・断崖地・塩沼地・湖沼・河川・湿地・高山・石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なもの
E	郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴が典型的なもの
F	過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても、長期にわたって伐採等の手が入っていないもの
G	乱獲、その他人為の影響によって、当該都道府県で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群
H	その他、学術上重要な植物群落または個体群

出典：「第5回特定植物群落調査報告書」（平成12年、環境庁）

※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図－6.1.8 (1) 重要な植物群落の確認位置(夏季)

※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図－6.1.8 (2) 重要な植物群落の確認位置(冬季)

2) 重要な動物種

(ア) 哺乳類

確認された重要な種一覧（哺乳類）は表－6.1.7 に、確認位置は図－6.1.9 に、重要な種の確認状況は図－6.1.10 に示すとおりである。

なお、調査地域に生息する哺乳類の生息環境や地形、土質等を考慮しながら、調査ルート等を設定した。

環境影響評価時の現地調査及び事前調査の際に陸域改変区域（連絡誘導路及び仮設橋の取り付け部を含む）で確認された重要な種である 4 種（調査対象種）のうち、ワタセジネズミ、オキナワハツカネズミ、オリイオオコウモリの 3 種が確認された。

表－6.1.7 陸域改変区域で確認された重要な種一覧（哺乳類）

調査期日：夏季 令和 2 年 8 月 4、5、6、7 日
冬季 令和 3 年 1 月 26、27、28 日

No.	和名	選定基準					調査時期	
		天然 記念物 ①	種の 保存法 ②	環境省 RL ③	沖縄県 RDB ④	水産庁 DB ⑤	夏季	冬季
1	ワタセジネズミ			準絶滅危惧	準絶滅危惧		○	○
2	オキナワハツカネズミ				情報不足		○	
3	オリイオオコウモリ				準絶滅危惧			○
計	3 種	0 種	0 種	1 種	3 種	0 種	2 種	2 種

以下の①～⑤のいずれかに該当しているものを「重要な種」として選定した。

①天然記念物：文化財保護法により、保護されている種及び亜種

・ 特天：国指定特別天然記念物 ・ 国天：国指定天然記念物 ・ 県天：沖縄県指定天然記念物

②種の保存法：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」において以下の項目に選定される種及び亜種

・ 国内希少：国内希少野生動植物種 ・ 国際希少：国際希少野生動植物種

③環境省 RL：「環境省レッドリスト 2020 の公表について」（環境省、令和 2 年 3 月 27 日）に記載されている種及び亜種

・ 絶滅危惧Ⅰ類：絶滅の危機に瀕している種

・ 絶滅危惧ⅠA 類：絶滅の危機に瀕している種のうち、ごく近い将来における野生での絶滅の可能性が極めて高いもの

・ 絶滅危惧ⅠB 類：絶滅の危機に瀕している種のうち、ⅠA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの

・ 絶滅危惧Ⅱ類：絶滅の危険が増大している種

・ 準絶滅危惧：存続基盤が脆弱な種。現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種

・ 情報不足：評価するだけの情報が不足している種

・ 地域個体群：地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれが高い個体群

④沖縄県 RDB：「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 第 3 版（動物編）」（沖縄県、平成 29 年 3 月）に記載されている種及び亜種

・ 絶滅危惧Ⅰ類：沖縄県では絶滅の危機に瀕している種

・ 絶滅危惧ⅠA 類：沖縄県では、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの

・ 絶滅危惧ⅠB 類：沖縄県ではⅠA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの

・ 絶滅危惧Ⅱ類：沖縄県では絶滅の危機が増大している種

・ 準絶滅危惧：沖縄県では存続基盤が脆弱な種

・ 情報不足：沖縄県では評価するだけの情報が不足している種

・ 絶滅のおそれのある地域個体群：沖縄県で地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの

⑤水産庁 DB：「日本の希少な野生水生生物に関するデータブック」（水産庁、平成 12 年）

・ 絶滅危惧種：絶滅の危機に瀕している種・亜種

・ 危急種：絶滅の危険が増大している種・亜種

・ 希少種：存続基盤が脆弱な種・亜種

・ 減少種：明らかに減少しているもの

・ 減少傾向：長期的に見て減少しつつあるもの

※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図－6.1.9 (1) 重要な種確認位置(陸域改変区域、夏季)

※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図－6.1.9 (2) 重要な種確認位置(陸域改変区域、冬季)

 確認個体	 生息地の状況
ワタセジネズミ	
 確認個体	 生息地の状況
オキナワハツカネズミ	
 出典：「日本の哺乳類 改訂版」 阿部ほか (2005) 東海大学出版会	 生息地の状況
オリイオオコウモリ	

図ー6.1.10 重要な種（哺乳類）確認状況

(イ) 昆虫類

確認された重要な種一覧（昆虫類）は表－ 6.1.8 に、確認位置は図－ 6.1.11 に、確認状況は図－ 6.1.12 に示すとおりである。

なお、調査地域に生息する昆虫類の生息環境や地形、土質等を考慮しながら、調査ルート等を設定した。

環境影響評価時の現地調査及び事前調査において、陸域改変区域（連絡誘導路及び仮設橋の取り付け部を含む）で生息が確認された重要な昆虫類 3 種（調査対象種）のうち、コガタノゲンゴロウが確認された。

また、調査対象種以外の種として、重要な昆虫類のヒメイトトンボ、トビイロヤンマ、コマルケシゲンゴロウの 3 種が確認された。

表－ 6.1.8 陸域改変区域で確認された重要な種一覧（昆虫類）

調査期日：夏季 令和 2 年 8 月 4、5、6、7 日

冬季 令和 3 年 1 月 26、27、28 日

No.	和名	選定基準					調査時期	
		天然 記念物 ①	種の 保存法 ②	環境省 RL ③	沖縄県 RDB ④	水産庁 DB ⑤	夏季	冬季
1	ヒメイトトンボ			準絶滅危惧			○	
2	トビイロヤンマ			絶滅危惧 IB 類	絶滅危惧 IB 類		○	○
3	コガタノゲンゴロウ			絶滅危惧 II 類			○	○
4	コマルケシゲンゴロウ			準絶滅危惧			○	
合計	4 種	0 種	0 種	4 種	1 種	0 種	4 種	2 種

注：重要な動物種の選定基準は表－6.1.7 と同様とした。

※重要種保護のため位置情報は表示しない。	※重要種保護のため位置情報は表示しない。
※重要種保護のため位置情報は表示しない。	※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図一 6.1.11 (1) 重要な種確認位置(陸域改変区域内、夏季)

※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図一 6.1.11 (2) 重要な種確認位置(陸域改変区域内、冬季)

 確認個体	 生息地の状況
ヒメイトトンボ	
 確認個体	 生息地の状況
トビイロヤンマ	
 確認個体	 生息地の状況
コガタノゲンゴロウ	
 目盛は mm 単位 採集標本	 生息地の状況
コマルケシゲンゴロウ	

図ー 6.1.12 重要な種（昆虫類）確認状況

(ウ) 陸生貝類

確認された重要な種一覧（陸生貝類）は表－6.1.9 に、確認位置は図－ 6.1.13 に、確認状況は図－6.1.14 に示すとおりである。

なお、調査地域に生息する陸生貝類の生息環境や地形、土質等を考慮しながら、調査ルート等を設定した。

環境影響評価時の現地調査及び事前調査において、陸域改変区域（連絡誘導路及び仮設橋の取り付け部を含む）で確認された重要な種 2 種（調査対象種）のうち、ノミガイが確認された。オイランカワザンショウは、平成 29 年度には生息地が連絡誘導路部の工事によって消失していたため、確認されなかった。

また、調査対象種以外の種として、重要な陸生貝類のスナガイ及びパンダナマイマイの 2 種が確認された。

他にヌノメカワニナ、タイワンモノアラガイ、ヒラマキミズマイマイ、トウキョウヒラマキガイがため池の水生植物帯で確認された。

表－6.1.9 陸域改変区域で確認された重要な種一覧（陸生貝類）

調査期日：夏季 令和 2 年 8 月 4、5、6、7 日


冬季 令和 3 年 1 月 26、27、28 日

No.	和名	選定基準					調査時期	
		天然 記念物 ①	種の 保存法 ②	環境省 RL ③	沖縄県 RDB ④	水産庁 DB ⑤	夏季	冬季
1	ノミガイ			絶滅危惧 II 類			○	○
2	スナガイ			準絶滅危惧			○	○
3	パンダナマイマイ				準絶滅危惧		○	○
4	ヌノメカワニナ			準絶滅危惧			○	
5	タイワンモノアラガイ			情報不足			○	○
6	ヒラマキミズマイマイ			情報不足			○	○
7	トウキョウヒラマキガイ			情報不足			○	○
合計	7 種	0 種	0 種	6 種	1 種	0 種	7 種	6 種

注：重要な動物種の選定基準は表－6.1.7 と同様とした。

※重要種保護のため位置情報は表示しない。	※重要種保護のため位置情報は表示しない。
※重要種保護のため位置情報は表示しない。	※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図一 6.1.13 (1) 重要な種確認位置(陸域改変区域内、夏季)



図一 6.1.13 (2) 重要な種確認位置 (陸域改変区域内、夏季)

※重要種保護のため位置情報は表示しない。	※重要種保護のため位置情報は表示しない。
※重要種保護のため位置情報は表示しない。	※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図一 6.1.13 (3) 重要な種確認位置(陸域改変区域内、冬季)

※重要種保護のため位置情報は表示しない。	※重要種保護のため位置情報は表示しない。
----------------------	----------------------

図一 6.1.13 (4) 重要な種確認位置(陸域改変区域内、冬季)

 確認個体	 生息地の状況
ノミガイ	
 目盛は mm 単位 確認個体	 生息地の状況
スナガイ	
 目盛は mm 単位 確認個体	 確認個体
パンダナマイマイ	

図ー6.1.14 (1) 重要な種（陸生貝類）確認状況

 確認個体	 確認環境
ヌノメカワニナ	
 確認個体	 確認環境
タイワンモノアラガイ	
 確認個体	 確認環境
ヒラキミズマイマイ	
 確認個体	 確認環境
トウキョウヒラキガイ	

図－6.1.14 (2) 重要な種（陸生貝類）確認状況

(エ) オカヤドカリ類

確認された重要な種一覧（オカヤドカリ類）は表－6.1.10 に、確認位置は図－6.1.15 に、確認状況は図－6.1.16 に示すとおりである。

なお、調査地域に生息するオカヤドカリ類の生息環境や地形、土質等を考慮しながら、調査ルート等を設定した。

環境影響評価時の現地調査及び事前調査において、陸域改変区域に生息が確認されたオカヤドカリ類 5 種（調査対象種）のうち、オカヤドカリ、ムラサキオカヤドカリ、ナキオカヤドカリの 3 種が確認された。


令和元年度を以て工事は終了し、陸域改変区域の境界として扱っていたオカヤドカリ類の進入防止柵が撤去されたことから、オカヤドカリ類について供用時の取りまとめは、大嶺崎周辺のフェンスの内側において、陸域改変区域とその周辺を合わせて行った。

表－6.1.10 陸域改変区域及び周辺で確認された重要な種一覧（オカヤドカリ類）

調査期日：夏季 令和 2 年 8 月 4、5、6、7 日
冬季 令和 3 年 1 月 26、27、28 日

No.	和名	選定基準					調査時期	
		天然 記念物 ①	種の 保存法 ②	環境省 RL ③	沖縄県 RDB ④	水産庁 DB ⑤	夏季	冬季
1	オカヤドカリ	国天				減少種	○	
2	ムラサキオカヤドカリ	国天					○	○
3	ナキオカヤドカリ	国天					○	○
合計	3 種	3 種	0 種	0 種	0 種	1 種	3 種	2 種

注：重要な動物種の選定基準は表－6.1.7 と同様とした。



図－ 6.1.15 (1) 重要な種確認位置(陸域改変区域及び周辺、夏季)

※重要種保護のため位置情報は表示しない。	※重要種保護のため位置情報は表示しない。
----------------------	----------------------

図ー 6.1.15 (2) 重要な種確認位置(陸域改変区域及び周辺、冬季)

	
確認個体	生息地の状況
オカヤドカリ	
	
確認個体	生息地の状況
ムラサキオカヤドカリ	
	
確認個体	生息地の状況
ナキオカヤドカリ	

図－6. 1. 16 (1) 重要な種(オカヤドカリ類)確認状況

(オ) 魚類

確認された重要な種一覧（魚類）は表－ 6.1.11 に、確認位置は図－ 6.1.17 に、確認状況は図－ 6.1.18 に示すとおりである。


調査対象種以外の種として、重要な魚類のタウナギが確認された。

表－ 6.1.11 陸域改変区域で確認された重要な種一覧（魚類）

調査期日：夏季 令和2年8月4、5、6、7日
冬季 令和3年1月26、27、28日

No.	和名	選定基準					調査時期	
		天然記念物 ①	種の保存法 ②	環境省 RL ③	沖縄県 RDB ④	水産庁 DB ⑤	夏季	冬季
1	タウナギ			絶滅危惧 I A 類	絶滅危惧 I A 類	絶滅危惧 種		○
合計	1 種	0 種	0 種	1 種	1 種	1 種	0 種	1 種

注：重要な動物種の選定基準は表－6.1.7 と同様とした。



図－ 6.1.17 重要な種確認位置（陸域改変区域内、冬季）

	
確認個体	主な生息地の状況
タウナギ	

図ー 6.1.18 重要な種（魚類）確認状況

(カ) 環形動物

確認された重要な種一覧（環形動物）は表－ 6.1.12 に、確認位置は図－ 6.1.19 に、確認状況は図－ 6.1.20 に示すとおりである。

調査対象種以外の種として、重要な環形動物のイボビルが確認された。

表－ 6.1.12 陸域改変区域で確認された重要な種一覧（環形動物）

調査期日：夏季 令和2年8月4、5、6、7日
冬季 令和3年1月26、27、28日

No.	和名	選定基準					調査時期	
		天然記念物 ①	種の保存法 ②	環境省 RL ③	沖縄県 RDB ④	水産庁 DB ⑤	夏季	冬季
1	イボビル			情報不足			○	
合計	1 種	0 種	0 種	1 種	0 種	0 種	1 種	0 種

注：重要な動物種の選定基準は表－6.1.7と同様とした。

※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図－ 6.1.19 重要な種確認位置（陸域改変区域内、夏季）



図ー 6.1.20 重要な種（環形動物）確認状況

6.1.2 コアジサシの繁殖状況

(1) 調査概要

調査はコアジサシを対象に、陸域改変区域内における個体数、確認環境、行動等を記録した。

なお、調査地域に生息する鳥類の生息環境や地形、土質等を考慮しながら、調査ルート等を設定した。

(2) 調査結果


大嶺崎西側や北側の海上を飛翔する個体は確認されたが、陸域改変区域で営巣は確認されなかった。また、環境影響評価時の現地調査の生息地（陸域改変区域の内陸部の西側管理区域：消火訓練ピット北側、消火訓練ピット東側）では繁殖は確認されなかった。

6.2 海域生物・海域生態系


6.2.1 付着生物

護岸構造とサンゴ類の生息状況を勘案し、サンゴ類や底生動物の着生に適した加工を施した凹凸加工異形消波ブロック及び自然石塊根固被覆ブロック、自然石護岸の設置箇所は図ー 6.2.2 に示すとおりである。

凹凸加工異形消波ブロックや被覆ブロックの設置箇所は、サンゴ類や底生動物が着生しやすいと考えられる場所として、前面にサンゴ類が生息しており、平均水面以下の水深が確保できる場所とした。



図ー 6.2.1 凹凸加工異形消波ブロック、自然石塊根固被覆ブロック、自然石護岸



図ー 6.2.2 生息基盤となるような護岸の設置箇所

(1) 調査概要

付着生物調査は、評価書において、環境保全措置として、護岸の一部に凹凸加工を施した消波ブロックや、自然石塊根固被覆ブロックを用い護岸を整備することとしており、新たに出現した護岸がサンゴ類や底生動物の着生基盤となっていることを確認している調査である。

平成 29 年度から令和 2 年度は図ー 6.2.3 に示すとおり、広範囲に調査を実施した。

自然石護岸、自然石塊根固被覆ブロックの調査範囲において、コドラートをそれぞれ 11 か所、18 か所設置し、自然石塊根固被覆ブロックの加工を施していないコンクリート部についても調査を実施した。また、凹凸消波ブロックは、令和 2 年度から調査を開始した。

なお、評価書における付着生物に係る事後調査地点は図ー 6.2.7 に示す。

1) サンゴ類

付着生物の着生に適した加工を施した自然石塊根固被覆ブロック及び凹凸消波ブロック上の調査地点の水深 0～2m において、50cm×50cm のコドラートを敷設し、コドラート内の稚サンゴについて目視観察を行い、出現種及び概算群体数を記録した。凹凸消波ブロックについては、水深 0～8m において、1 地点あたり浅所と深所に 2 か所のコドラートを設置した。

2) 底生動物

付着生物の着生に適した加工を施した自然石護岸、自然石塊根固被覆ブロック及び凹凸消波ブロックの潮間帯に 50 cm×50 cm のコドラートを敷設し、コドラート内の底生動物について目視観察を行い、出現種及び概算個体数を記録した。

3) その他生物等

上記の調査を実施する際に、海藻類の付着状況や外観等についても記録した。

(2) 調査結果

付着生物の出現種一覧は表ー 6.2.1～表ー 6.2.3 に、付着生物の調査結果は表ー 6.2.4 に示すとおりである。

1) 夏季

(ア) サンゴ類

自然石塊根固被覆ブロックでは、自然石部でハナヤサイサンゴ属、ミドリイシ属及びビモンサンゴ属の3種類が確認され、コドラート8でミドリイシ属及びビモンサンゴ属が計3群体、コドラート12でハナヤサイサンゴ属及びミドリイシ属が計3群体確認された。コンクリート部では確認されなかった。

凹凸消波ブロックでは、ハナヤサイサンゴ属、ミドリイシ属、ハマサンゴ属等の8種類が確認され、⑦角形消波ブロック（中）の下、溝ありのコドラートでは15群体が確認された。

(イ) 底生動物

自然石護岸では、各コドラートにおいて2～12種類の範囲にあり、コドラート3で最も多かった。

自然石塊根固被覆ブロックでは、コドラート別の出現種は自然石部で8～16種類の範囲にあり、コドラート8で最も多かった。コンクリート部は1～7種類の範囲にあり、全体的に少なかった。

凹凸消波ブロックでは、各コドラートにおいて1～11種類の範囲にあり、⑥角形消波ブロック（中）の下、溝ありのコドラートで最も多かった。

(ウ) その他生物等

自然石護岸では、各コドラートにおいて1～4種類の範囲にあり、コドラート2で最も多かった。全体被度は5%未満～70%の範囲にあり、潮間帯中部～下部に位置するコドラート2で高く、コドラート1、3、5～9及び11で5%未満と最も低かった。護岸の浮泥は潮間帯中部～下部に位置するコドラート2、4、7で浮泥がまばらに堆積しているのが確認された。

自然石塊根固被覆ブロックでは、コドラート別の出現種類数は自然石部で12～15種類、全体被度は30～65%、コンクリート部で7～13種類、全体被度は25～55%であった。全体的に微小海藻類の被度が多かった。

なお、護岸の浮泥の堆積は全てのコドラートにおいて確認されなかった。

凹凸消波ブロックでは、コドラート別の出現種数は4～12種類、全体被度は20～90%であった。また、コドラート別の浮泥の堆積はⅠ～Ⅲの範囲であった。

2) 冬季

(ア) サンゴ類

自然石塊根固被覆ブロックでは、自然石部でハナヤサイサンゴ属、ミドリイシ属及びコモンサンゴ属の 3 種類が確認された。コンクリート部では確認されなかった。コドラート 6 ではハナヤサイサンゴ属 1 群体、コドラート 8 ではコモンサンゴ属 1 群体が新規に確認され、新たに死亡・消失した群体は確認されなかった。

凹凸消波ブロックでは、ハナヤサイサンゴ属、ミドリイシ属、ハマサンゴ属等の 9 種類が確認された。

(イ) 底生動物

自然石護岸では、各コドラートにおいて 2～11 種類の範囲にあり、コドラート 3 で最も多かった。

自然石塊根固被覆ブロックでは、コドラート別の出現種は自然石部で 5～18 種類の範囲にあり、コドラート 8 で最も多かった。コンクリート部は 2～6 種類の範囲にあり、全体的に少なかった。

凹凸消波ブロックでは、各コドラートにおいて 0～16 種類の範囲にあった。

(ウ) その他生物等

自然石護岸では、各コドラートにおいて 1～7 種類の範囲にあり、コドラート 2 で最も多かった。全体被度は 5%未満～25%の範囲にあり、潮間帯中部～下部に位置するコドラート 2 で最も高かった。護岸上の浮泥は、コドラート 5 及び潮間帯中部～下部に位置するコドラート 2、4、7 で、浮泥がまばらに堆積しているのが確認された。

自然石塊根固被覆ブロックでは、コドラート別の出現種類数は自然石部で 12～16 種類、全体被度は 40～50%、コンクリート部で 9～14 種類、全体被度は 25～45%であった。全体的に微小海藻類の被度が高かった。


なお、護岸の浮泥の堆積は、コドラート 9 を除いて確認されなかった。

凹凸消波ブロックでは、コドラート別の出現種類数は 3～13 種類、全体被度は 30～95%であった。また、コドラート別の浮泥の堆積はⅠ～Ⅱの範囲であった。




注：凹凸消波ブロックについては、令和2年度から調査を行っている。


図ー 6.2.3 令和2年度調査位置




図ー 6.2.4 コドラート設置位置（自然石護岸）




図ー 6.2.5 コドラート設置位置（自然石塊根固被覆ブロック）



図－ 6.2.6 (1) 調査地点図 (凹凸消波ブロック 北側)



図－ 6.2.6 (2) 調査地点図 (凹凸消波ブロック 南側)



図一 6.2.7 評価書に記載された事後調査地点（付着生物）

表－ 6.2.1 出現生物一覧（自然石護岸）

調査日：令和2年度 夏季：令和2年8月6日
冬季：令和2年12月6日

自然石護岸

凡 例：○＝出現

No.	門	綱	目	科	種名	夏季	冬季
1	軟体動物	多板	新ヒザラガイ	ウスヒザラガイ	ウスヒザラガイ	○	
2		腹足	カサガイ	ヨメカサガイ	オオヘッコウカサ	○	○
3				ユキノカサガイ	リュウキュウアオガイ	○	○
4					クサイロアオガイ	○	○
5			古腹足	ニシキウスガイ	ニシキウス	○	
6					オキナワイシタミ	○	○
7				ササエ	カンギク	○	○
8			アマオブネガイ	アマオブネガイ	アマオブネガイ	○	○
9		盤足	オニツノガイ		ヒメクワノミカニモリ	○	○
10					オニツノガイ科		○
11				ムカデガイ	ムカデガイ科	○	○
12			頭楯	ブトウガイ	ブトウガイ科	○	
13			基眼	カラマツガイ	コウダカラマツガイ	○	○
14		二枚貝	フネガイ	フネガイ	エカガイ	○	○
15			イガイ	イガイ	ヒバカリガイモトキ	○	○
16			ウグイスガイ	ウグイスガイ	ミトリアオリ	○	
17				シュモクガイ	ニワトリカギ	○	○
18				マクガイ	ヘリトリアオリ	○	○
19			カキ	イタボカギ	オハクロカギ	○	○
20					クロヘリカギ	○	○
21					ワニガイ	○	
22					イタボカギ科	○	○
23	環形動物	多毛	ケヤリムシ	カンザシコカイ	ウスマキコカイ亜科	○	○
24	節足動物	顎脚	無柄	フシツボ	タテシマフシツボ	○	○
25					シロスジフシツボ	○	○
26		軟甲	十脚	ヤトカリ	スヘスヘサンコヤトカリ		○
27				ホンヤトカリ	キカイホンヤトカリ	○	
28				オウキガニ	ヒツメガニ属	○	
29	棘皮動物	ウニ	ホンウニ	ナカウニ	ツマジロナカウニ	○	
底生動物出現種類数						27	21
1	藍色植物	藍藻	－	－	藍藻綱	○	○
2	紅色植物	紅藻	テンクサ	テンクサ	ヒメテンクサ	○	○
3			マサコシバリ	フシツナギ	テンクサモトキ属		○
4			イギス	イギス	イギス科	○	○
5	緑色植物	緑藻	アオサ	アオサ	スジアオリ		○
6					アオサ属	○	○
7			ハネモ	ハネモ	ハネモ属		○
8			カサノリ	ダシクラスス	フデノホ		○
9	－	－	－	－	微小海藻類	○	○
植物出現種類数						5	9

表ー 6.2.2 (1) 出現生物一覧（自然石塊根固被覆ブロック：コンクリート部）

調査日：令和2年度 夏季：令和2年8月5日
冬季：令和2年12月3日

自然石塊根固被覆ブロック

凡 例：○＝出現

No.	門	綱	目	科	種名	コンクリート部			
						夏季	冬季		
1	有孔虫	有孔虫	有孔虫	アカスナゴ	モミジスナゴ	○			
2	軟体動物	多板	サメハダヒサハラガイ	サメハダヒサハラガイ	ツヤシリブトヒサハラガイ	○			
3		腹足	カサガイ	ヨメカサ	クルマカサ		○		
4			新生腹足	オニツノガイ	コオニツノガイ		○	○	
5					コマフカニモリ			○	
6					オニツノガイ科			○	
7					ムカデガイ	リュウキュウヘビガイ			○
8					ムカデガイ科		○		○
9					ミノムシガイ	マメオトメフデ			○
10					真後鰓	フドウガイ	フドウガイ科		
11			汎有肺	カラマツガイ	コウダカラマツガイ		○	○	
12			二枚貝	ウグイスガイ	ウグイスガイ	ミドリリアオリ	○		
13	節足動物	軟甲	エビ	コシオリエビ	ホクロコシオリエビ	○			
14					コシオリエビ科	○			
15				ヤトカリ	Diogenes pallescens			○	
16				ホンヤトカリ	ホンヤトカリ上科	○			
17				モカニ	イッカカニ	○			
18				オウキカニ	オウキカニ科	○			
19				脊索動物	ホヤ	マメホヤ	ウスホヤ	ミドリミスジウスホヤ	○
20		ウスホヤ科						○	
21		ヘンケホヤ	ヘンケホヤ科				○		
底生動物出現種類数						13	11		
1	藍色植物	藍藻	－	－	藍藻綱	○	○		
2	紅色植物	紅藻	ウミゾウメン	ガラガラ	ソテガラミ	○	○		
3			サンゴモ	サンゴモ	ホソエダカニノテ			○	
4					モサスキ属	○	○		
5					ハバリテウム	サビ亜科(無節サンゴモ類)	○	○	
6			テンクサ	テンクサ	テンクサ属	○	○		
7			スキノリ	イワノカリ	イワノカリ科	○	○		
8			イギス	イギス	イギス科	○	○		
9			不等毛植物	褐藻	クロカシラ	クロカシラ	クロカシラ属	○	○
10	アミシグサ	アミシグサ			アミシグサ属	○	○		
11					ハイオギ属	○	○		
12					ウミウチ属	○	○		
13	緑色植物	緑藻	アオサ	アオサ	アオサ属	○			
14			カサノリ	ダシクラズス	ミスタマ			○	
15					フデノホ	○	○		
16					カサノリ	リュウキュウカサ			○
17					ヒナカサノリ			○	
18	－	－	－	－	微小海藻類	○			
海藻類出現種類数						14	16		

表ー 6.2.2 (2) 出現生物一覧（自然石塊根固被覆ブロック：自然石部）

調査日：令和2年度 夏季：令和2年8月5日
冬季：令和2年12月3日

自然石塊根固被覆ブロック						凡 例：○＝出現	
No.	門	綱	目	科	種名	自然石部	
						夏季	冬季
1	有孔虫	有孔虫	有孔虫	ソラテス	ゼニシ属		○
2	海綿動物	普通海綿	－	－	普通海綿綱	○	○
3	刺胞動物	ヒトコロ虫	ハナクラゲ	エタウミヒトドラ	ミナミエタウミヒトドラ	○	○
4	軟体動物	腹足	古腹足	サラサハ	サラサハ	○	
5				ニシキウス	クルマチクサ	○	○
6				ササエ	コシタカササエ	○	○
7				ヒメカタハ	リュウキュウヒメカタハ	○	
8			新生腹足	オニツノガイ	ヒメクリミカニモリ	○	○
9					ゴマフカニモリ	○	○
10					オニツノガイ科	○	○
11				ソテホラ	ソテホラ科	○	
12				ムカデガイ	ムカデガイ科	○	○
13				タカラガイ	ハナマルコキ		○
14				ミツチキリオレ	ミツチキリオレ科	○	○
15				フトコロガイ	マツムシ	○	
16				エゾハ	ホソノシカ		○
17				アツキガイ	レイシタマシ	○	
18					クチムラサキレイシタマシ	○	
19					アツキガイ科		○
20				ミノシカ	アラレトメフテ		○
21					マメオトメフテ	○	○
22				イモガイ	サヤカタイモ	○	○
23					シユスカタサヤカタイモ	○	
24					マダライモ	○	
25					カクフイモ	○	○
26					シロセイロンイモ	○	○
27			真後鰓	フトウカ	フトウカ科		○
28		二枚貝	ウグイスカ	ウグイスカ	ミドリリアオリ	○	○
29			マルスタレカ	ツクエカ	ツクエカ科	○	○
30				シャコカ	ヒメシャコカ	○	○
31	節足動物	軟甲	シヤコ	フトエビシヤコ	コトケフトエビシヤコ	○	○
32				ウニシヤコ	ウニシヤコ科	○	○
33			エビ	コシオリエビ	コシオリエビ科	○	
34				ヤトカリ	ツマシロサンコヤトカリ	○	○
35				ホンヤトカリ	ヒメホンヤトカリ属		○
36					ホンヤトカリ上科	○	
37					ホンヤトカリ科		○
38	節足動物	軟甲	エビ	サンコガニ	サンコガニ科	○	○
39				オウキガニ	コオウキガニ	○	○
40					オウキガニ科		○
41	棘皮動物	クモヒトデ	－	－	クモヒトデ綱	○	○
42		ウニ	ホンウニ	ナカウニ	ホンナカウニ	○	○
43					ツマシロナカウニ	○	○
44					リュウキュウナカウニ	○	○
45					タワシウニ	○	○
46	脊索動物	ホヤ	マホヤ	ウスホヤ	ウスホヤ科	○	○
47				ヘンケホヤ	ヘンケホヤ科		○
底生動物出現種類数						37	37
1	刺胞動物	花虫	イシキノ	ハナヤサイシノ	ハナヤサイシノ属	○	○
2				ミドリイシ	コモシキノ属	○	○
3					ミドリイシ属	○	○
サンゴ類出現種類数						3	3
1	藍色植物	藍藻			藍藻綱	○	○
2	紅色植物	紅藻	ウミツウメン	ガウカ	ソテカラム	○	○
3			サンコモ	サンコモ	ホソエタカニノテ	○	○
4					カニノテ属	○	○
5					モサズキ属	○	○
6				ハバリテウム	サビ亜科(無節サンコモ類)	○	○
7			デンクサ	デンクサ	デンクサ属	○	○
8			スキノリ	イワノカリ	イワノカリ科	○	○
9			イキス	イキス	イキス科	○	○
10	不等毛植物	褐藻	クロカシラ	クロカシラ	クロカシラ属	○	○
11			アミシグサ	アミシグサ	アミシグサ属	○	○
12					ハイオキ属	○	○
13					ウミウチリ属	○	○
14	緑色植物	緑藻	アオサ	アオサ	アオサ属	○	
15			ミドリカ	ハロニア	タマハロニア	○	
16			イワズタ	ハコロモ	サホテンクサ属		○
17			カサノリ	タシクラズ	ミスタマ	○	○
18					フデノホ	○	○
19				カサノリ	リュウキュウカサ	○	○
20					ヒナカサノリ	○	○
21	－	－	－	－	微小海藻類	○	
海藻類出現種類数						20	18

表－ 6.2.3 (1) 出現生物一覧（凹凸消波ブロック）

調査日：令和2年度 夏季：令和2年8月5, 6, 7日
冬季：令和2年12月18, 23日

凹凸消波ブロック

凡 例：○＝出現

No.	門	綱	目	科	種名	夏季	冬季
1	有孔虫	有孔虫	有孔虫	ソリテス	ゼニイ属	○	○
2				アカスナコ	モミシスナコ	○	○
3	海綿動物	普通海綿	－	－	普通海綿綱	○	○
4	刺胞動物	ヒドロ虫	花クラゲ	ハネウミヒドラ	ハネウミヒドラ	○	
5					ハネウミヒドラ科		○
6				エダウミヒドラ	ミナエダウミヒドラ	○	○
7			軟クラゲ	ハネヤ	ハネヤ科	○	
8		花虫	スナギンチャク	スナギンチャク	Zoanthus 属		○
9					イワスナギンチャク		○
10	外肛動物	－	－	－	外肛動物門	○	○
11	軟体動物	多板	新ヒサラガイ	ウスヒサラガイ	ウスヒサラガイ	○	
12				－	新ヒサラガイ目		○
13		腹足	カサガイ	ツタノハガイ	ツタノハガイ		○
14			古腹足	ササエ	リュウキュウヒメカタヘ	○	
15			盤足	オニツノガイ	コマフカニモリ		○
16					オニツノガイ科	○	○
17				ムカデガイ	フタモチヘビガイ	○	○
18					リュウキュウヘビガイ	○	○
19					ムカデガイ科	○	○
20			翼舌	ミツチキリオレ	ミツチキリオレ科	○	
21			新腹足	アッキガイ	クチムラサキレイシタマシ		○
22					シロイカレイシ		○
23				フトコロガイ	フトコロガイ	○	
24				エゾハ	シロイボノシガイ		○
25				イトマキホラ	マルニシ		○
26				フデガイ	チョウチンフデ	○	
27				イモガイ	シロセロンイモ		○
28					ナカシマイモ		○
29			頭楯	フドウガイ	フドウガイ科	○	
30			基眼	カラマツガイ	ヒラカラマツガイ		○
31		二枚貝	フネガイ	フネガイ	ヘニエガイ	○	○
32			ウグイスガイ	ウグイスガイ	ミドリアオリ	○	○
33				シュモクガイ	ニワトリカキ		○
34			カキ	ネスミノテ	カスリイシカキモドキ	○	
35				イタボカキ	イタボカキ科	○	○
36			マルスターレガイ	キクサルガイ	キクサルガイ科		○
37				サルガイ	クサヒビシガイ	○	
38				シャコガイ	ヒメシャコガイ	○	○
39					ヒレシャコガイ		○
40			オオノガイ	ツクエガイ	ツクエガイ科	○	○
41	環形動物	多毛	ケヤリムシ	カンサシコカイ	イバラカンサシコカイ	○	
42					ウスマキコカイ亜科	○	○
43					カンサシコカイ科		○
44			－	－	多毛綱	○	
45	節足動物	顎脚	無柄	サンゴフジツボ	ヒドロサンゴフジツボ		○
46					サンゴフジツボ科	○	○
47				フジツボ	タテシマフジツボ	○	○
48					シロスジフジツボ	○	○
49		軟甲	口脚	ウニシヤコ	ウニシヤコ		○
50			端脚	－	端脚目	○	○
51			十脚	テナカエビ	ミドリイシエビ		○
52				ヤトカリ	ツマシロサンコヤトカリ	○	○
53					アカツメサンコヤトカリ		○
54					ウスイロサンコヤトカリ		○
55					ツマキヨコハサミ	○	
56					ヨコハサミ属	○	○
57			－	－	ホンヤトカリ上科		○
58			ワタリカニ		フタハベニツケモドキ	○	
59			サンコカニ		ヒメサンコカニ属		○
60					サンコカニ科	○	○

表－ 6.2.3 (2) 出現生物一覧（凹凸消波ブロック）

調査日：令和2年度 夏季：令和2年8月5, 6, 7日

冬季：令和2年12月18, 23日

凹凸消波ブロック

凡 例：○＝出現

No.	門	綱	目	科	種名	夏季	冬季	
61	棘皮動物	クモヒトデ	—	—	クモヒトデ綱	○		
62		ウニ	ホンウニ	ナカウニ	ホンナカウニ	○	○	
63					リュウキュウナカウニ	○	○	
64					タワシウニ	○	○	
65	脊索動物	ホヤ	マメホヤ	ウスホヤ	チャツボヤ		○	
66					ミトリンエキホヤ		○	
67					ミトリンシウスホヤ		○	
68					ウスボヤ科	○	○	
69				ヘンゲホヤ	コハルトツツボヤ		○	
70					ツツボヤ属		○	
71					ヘンゲボヤ科	○	○	
72					ナツメボヤ	ナツメボヤ科	○	○
73			マボヤ	イタボヤ	イタボヤ科		○	
74				シロボヤ	シロボヤ科	○	○	
75				マボヤ	ベニボヤ属	○	○	
76					マボヤ科		○	
底生動物出現種類数						45	61	
1	刺胞動物	花虫	イシサンゴ	ハナヤサイサンゴ	ハナヤサイサンゴ属	○	○	
2					ミトリンイシ	ミトリンイシ属	○	○
3					ハマサンゴ	ハマサンゴ属	○	○
4					キクメイシ	キクメイシ属	○	○
5					コカメノコキクメイシ	コカメノコキクメイシ属	○	○
6					ノウサンゴ	ノウサンゴ属	○	○
7					ルリサンゴ	ルリサンゴ属	○	○
8					トゲキクメイシ	トゲキクメイシ属		○
9		ヒトリロ虫	ヒトリロサンゴ	アナサンゴモドキ	アナサンゴモドキ属	○	○	
サンゴ類出現種類数						8	9	
1	藍色植物	藍藻	—	—	藍藻綱	○	○	
2	紅色植物	紅藻	ウミゾウメン	ガラガラ	ソデガラミ	○	○	
3					ガラガラ			○
4				サンゴモ	サンゴモ	ホソエタカニノテ		○
5						ヒメカニノテ	○	
6						カニノテ属	○	○
7						モサスキ属	○	○
8						—	無節サンゴモ類	○
9				テンクサ	テンクサ	ハイトンクサ	○	○
10				テンクサ属	○	○		
11			スキノリ	イワナカリ	イワナカリ科	○	○	
12				ナミノハナ	ホソバナミノハナ	○	○	
13				—	スキノリ目		○	
14			マサコシバリ	ワツナギソウ	ワツナギソウ属		○	
15				フツナギ	テンクサモドキ属	○	○	
16				イギス	イギス	イギス科	○	○
17					ダシニア	ダシニア科	○	○
18				フシマツモ	イトクスグサ	○	○	
19			黄色植物	褐藻	クロカシラ	クロカシラ	クロカシラ属	○
20	アミシグサ	アミシグサ			アミシグサ属	○	○	
21		ハイオギ			ハイオギ属	○	○	
22		ウスエキウチリ			○			
23		ウミウチリ属			○	○		
24	緑色植物	緑藻	アオサ	アオサ	アオサ属	○		
25			ミトリンケ	ハロニア	キッコウケサ	○		
26			イワスタ	ハコロモ	サボテンクサ属		○	
27			ハネモ	ハネモ	ハネモ属		○	
28			カサノリ	ダシクラス	ミスタマ	○		
29					フデノホ	○	○	
30				カサノリ	リュウキュウカサ		○	
31					ヒナカサノリ	○	○	
32			—	—	—	微小海藻類	○	○
海藻類出現種類数						25	27	

表－ 6.2.4 (1) 付着生物の調査結果（自然石護岸、夏季）

調査日：令和2年8月6日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo.										
		①		②		③		④	⑤	⑥	⑦	⑧
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ウスヒサラガイ		rr									
2	オオベッコウガイ			rr								
3	リュウキュウアカガイ			r		rr	r	rr		r		rr
4	クサイロアカガイ			rr								
5	ニシキウス						rr					
6	オキナワシダタミ					rr			rr	rr		
7	カンギク									rr		
8	アマオブネガイ			rr						rr		
9	ヒメクワノミカニモリ		r									
10	ムカデガイ科		+		+							
11	フトウガイ科		rr									
12	コウタカカラマツガイ	rr		rr			r	rr				
13	エガイ			rr						rr		
14	ヒバカリガイモドキ			+	+	r	+	r		rr	rr	r
15	ミドリリアオリ				rr							
16	ニワトリガイ				rr							
17	ヘリトリアオリ					rr						rr
18	オハクロガイ				rr					rr		
19	クロヘリガイ			rr								
20	ワニガイ			rr	rr		rr					
21	イタボガイ科			rr	rr	rr	rr			rr	rr	
22	ウスマキコカイ亜科				r							
23	タデマフシツボ	rr		+	r	rr	r	+		rr		
24	シロスシフシツボ			r								
25	キカイホシヤドリ								rr			
26	ヒツメガイ属						rr					
27	ツマジロナガイ									rr		
底生動物出現種類数		2	4	12	9	6	8	4	2	10	2	3
1	藍藻綱				40							
2	ヒメテングサ		R									
3	イサ科		R									
4	アサ属		R							R	R	
5	微小海藻類	R	65	R	R	R	R	R	R	R	R	R
全体被度(%)		R	70	R	40	R	R	R	R	R	5	R
海藻類出現種類数		1	4	1	2	1	1	1	1	2	2	1
浮泥の堆積状況		I	III	II	III	I	II	III	I	I	II	II

注：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

I：海底面（護岸）をはたいても濁らない。

II：海底面（護岸）をはたと濁る。

III：浮泥がまばらに堆積している。

IV：浮泥が一様に（厚く）堆積している。

表－ 6.2.4 (2) 付着生物の調査結果（自然石護岸、冬季）

調査日：令和2年12月6日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo.										
		①		②		③		④	⑤	⑥	⑦	⑧
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	オオヘッコウカサ			rr								
2	リュウキュウアカイ	rr		r		rr	rr			rr		rr
3	クサイロアカイ			rr								
4	オキナワイシダタミ								rr			
5	カンギク									rr		
6	アマオブネカイ			rr								
7	ヒメクワノミカニモリ		r				rr					
8	オニツノカイ科				rr							
9	ムカデカイ科		+		+							
10	コウダカラマツカイ	rr		rr		rr						
11	エカイ			rr						rr		
12	ヒハリカイモドキ			+	+	r	+	rr		r	r	r
13	ニワトリカキ				rr							
14	ヘリトリアオリ				rr	rr				rr		
15	オハクロカキ				rr					rr		
16	クロヘリカキ			rr								
17	イタボカキ科			rr	rr	rr	rr			rr	rr	
18	ウスマキコカイ亜科				rr							
19	タデマフシツボ	rr		+	r	rr	r	+				
20	シロスシマフシツボ			r								
21	スベスベサンコヤトカリ								rr			
底生動物出現種類数		3	2	11	9	6	5	2	2	7	2	2
1	藍藻綱	R	R	10	10	10	R	5		R	10	5
2	ヒメテングサ		R									
3	テングサモドキ属			R								
4	イギス科		R		R							
5	スシアオリ		R		R							
6	アサ属	R	R	R	R	R	R	R		R	R	
7	ハネモ属				R							
8	フデノホ		R									
9	微小海藻類	R	20	R	R	R	R	5	R	R	R	R
全体被度(%)		R	25	10	15	10	R	10	R	R	10	5
海藻類出現種類数		3	7	4	6	3	3	3	1	3	3	2
浮泥の堆積状況		I	III	I	III	III	I	III	I	I	I	I

注：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。

II：海底面(護岸)をはたと濁る。

III：浮泥がまばらに堆積している。

IV：浮泥が一様に(厚く)堆積している。

表ー 6.2.4 (3) 付着生物の調査結果（自然石塊根固被覆ブロック、夏季）

調査日：令和2年8月5日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

サンゴ類は群体系数、海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo.（基質種別）											
		①		②		③		④		⑤		⑥	
		1 (コンクリート)	2 (自然石)	3 (コンクリート)	4 (自然石)	5 (コンクリート)	6 (自然石)	7 (コンクリート)	8 (自然石)	9 (コンクリート)	10 (自然石)	11 (コンクリート)	12 (自然石)
1	モミジスナコ									R		R	
2	普通海綿綱				R						R		R
3	ミナミタウミヒトラ								R				
4	ツヤシリブトヒサラガイ									rr			
5	クルマチクサ				rr								rr
6	リュウキュウヒメカタヘ								rr				
7	コシタカササエ										rr		rr
8	サラサハiei										rr		
9	コオニツノガイ									rr			
10	ヒメクワノミカニモリ								rr				
11	コマツカニモリ						rr		rr		rr		
12	オニツノガイ科						rr						rr
13	ソデホウライ科										rr		
14	ムカデガイ科	rr	rr	rr	rr	rr	rr	r	rr		rr	rr	r
15	ミツクチギリオレ科				rr								
16	レイシタマシ				rr								
17	クチムラサキレイシタマシ				rr								
18	マツムシ										rr		
19	マメオトメフデ								rr		rr		rr
20	マダライモ								rr				
21	サヤカタイモ						rr						rr
22	シユズカケサヤカタイモ								rr				
23	シロセイロソイモ				rr								
24	カクフイモ												rr
25	コウタカカマツガイ			rr									
26	ミドリリアオリ								rr			rr	
27	ヒメシヤコガイ		rr				rr		rr		rr		
28	ツクエガイ科				rr				rr				rr
29	コトケフトユビシヤコ		rr										
30	ウニシヤコ科		rr		rr		rr		rr				
31	ツマシロサンコヤトカリ		rr		rr		rr		rr				rr
32	ホンヤトカリ上科					rr		rr	rr				
33	ホクロコシオリエビ									r			
34	コシオリエビ科		rr							rr		rr	
35	イッカクガニ											rr	
36	コオウキガニ												rr
37	オウキガニ科											rr	
38	サンコガニ科				rr		rr		rr		rr		rr
39	クモヒデ綱										rr		
40	ホンナカウニ		rr		rr		rr		rr				rr
41	ツマシロナカウニ				rr								
42	リュウキュウナカウニ		rr				rr						
43	タワシウニ						rr						
44	ミドリミスシウスボヤ											R	
45	ウスボヤ科										rr		
46	ヘンケボヤ科									R			
底生動物出現種類数		1	8	2	13	2	11	2	16	6	12	7	13

表ー 6.2.4 (4) 付着生物の調査結果（自然石塊根固被覆ブロック、夏季）

調査日：令和2年8月5日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

サンゴ類は群體数、海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo. (基質種別)											
		①		②		③		④		⑤		⑥	
		1 (コンク リート)	2 (自然石)	3 (コンク リート)	4 (自然石)	5 (コンク リート)	6 (自然石)	7 (コンク リート)	8 (自然石)	9 (コンク リート)	10 (自然石)	11 (コンク リート)	12 (自然石)
1	ハナヤサイサンゴ 属												1
2	ミトリアシ属		1		1		1		2		1		2
3	コモサンゴ 属								1				
サンゴ類出現種類数		0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2
1	藍藻綱	R	5	R	10	R	R	R	R		R	R	R
2	ツゲカラム	R	R		R		R		R	R	R	R	R
3	ホソエタカニノテ		R						R				
4	カニノテ属		R		R		R		R		R		R
5	モサズキ属	5	R	R	5	5	R	R		R		R	R
6	サヒ亜科	10	5	5	R	10	5	5	5	10	5	5	5
7	テンクサ属	5	R	R	5	5	5	R	5		R		5
8	イワノカリ科	R	R	R	10	R	10			R	R	R	R
9	イキス科	R		R		R			R		R		
10	クロカシラ属	R			R	R	R	R					R
11	アミシグサ属	R	R	R	R	R	5	R	5		R	R	R
12	ハイオキ 属	R	R	5	5	R	R		5			R	5
13	ウミウチノテ属	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R
14	アサ属			R		R	R	R			R		
15	タマハロニア				R								
16	ミスタマ		R				R						
17	フデノホ		R		R	R			R	R	R		
18	リュウキュウカサ										R		
19	ヒナカサノリ	R	R						R		R		
20	微小海藻類	30	25	20	20	25	20	30	30	10	20	20	30
全体被度(%)		55	45	35	65	55	50	40	55	25	30	30	50
海藻類出現種類数		13	15	11	14	13	14	9	13	7	14	8	12
浮泥の堆積状況		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

注1：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。

II：海底面(護岸)をはたと濁る。

III：浮泥がまばらに堆積している。

IV：浮泥が一様に(厚く)堆積している。

注2：コドラートNo.13～18は、地点上に新たに消波ブロックが設置されたため、調査地点から除外した。

表ー 6.2.4 (5) 付着生物の調査結果（自然石塊根固被覆ブロック、冬季）

調査日：令和2年12月3日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

サンゴ類は群体数、海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo. (基質種別)											
		①		②		③		④		⑤		⑥	
		1 (コンクリート)	2 (自然石)	3 (コンクリート)	4 (自然石)	5 (コンクリート)	6 (自然石)	7 (コンクリート)	8 (自然石)	9 (コンクリート)	10 (自然石)	11 (コンクリート)	12 (自然石)
1	ゼニヒ属										R		R
2	普通海綿綱				R						R		R
3	ミナエタウミヒトエ								R				
4	クルマカサ									rr			
5	クルマチカサ								rr				rr
6	コシタカササエ												rr
7	コオニツノガイ									rr		rr	
8	ヒメクワノミカニモリ				rr				rr				
9	コマフカニモリ				rr		rr	rr	rr		r		rr
10	オニツノガイ科						rr	rr		rr	rr		rr
11	リュウキュウヘビガイ					rr							
12	ムカデガイ科	rr	rr	rr	rr	rr	rr	r	rr		rr	rr	rr
13	ハナマルコギ						rr						
14	ミツクチキリウレ科				rr								
15	アツキガイ科								rr				
16	ホソノシガイ										rr		
17	アラレオトメフデ												rr
18	マメオトメフデ									rr	rr		rr
19	サヤガイタイモ								rr				rr
20	シロセイロンモ						rr						rr
21	カクフイモ								rr				
22	フトウガイ科									rr			rr
23	コウダカカラマツガイ			rr		rr							
24	ミドリアオリ								rr				
25	ヒメシヤコガイ		rr				rr		rr		rr		
26	ツクエガイ科				rr				rr				rr
27	コトケフトコビシヤコ								rr				
28	ウニシヤコ科						rr		rr				
29	ツマジロサンコヤトカリ		rr				rr		rr				rr
30	<i>Diogenes pallescens</i>									rr			
31	ヒメホヤトカリ属				rr								
32	ホヤトカリ科								rr				
33	コウキガニ												rr
34	オウキガニ科						rr						
35	サンコガニ科				rr		rr		rr		rr		rr
36	クモヒトデ綱								rr				
37	ホソナガウニ		rr		rr		rr						rr
38	ツマジロナガウニ				rr								
39	リュウキュウナガウニ		rr		rr		rr						
40	タリシウニ								rr				
41	ウスボヤ科	R									R		
42	ベンゲボヤ科				R		R						
底生動物出現種類数		2	5	2	12	3	13	3	18	6	10	2	17

注1：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

- I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。
- II：海底面(護岸)をはたと濁る。
- III：浮泥がまばらに堆積している。
- IV：浮泥が一様に(厚く)堆積している。

注2：コドラートNo.13～18は、地点上に新たに消波ブロックが設置されたため、調査地点から除外した。

表ー 6.2.4 (6) 付着生物の調査結果（自然石塊根固被覆ブロック、冬季）

調査日：令和2年12月3日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

サンゴ類は群数、海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo.（基質種別）											
		①		②		③		④		⑤		⑥	
		1 (コンクリート)	2 (自然石)	3 (コンクリート)	4 (自然石)	5 (コンクリート)	6 (自然石)	7 (コンクリート)	8 (自然石)	9 (コンクリート)	10 (自然石)	11 (コンクリート)	12 (自然石)
1	ハナヤサイサンゴ属						1						1
2	ミドリシ属		1		1		1		2		1		2
3	モモンサンゴ属								2				
サンゴ類出現種類数		0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	2
1	藍藻綱	R	R	R	R	R	R	R	R	5	R	R	R
2	ソテツガラムシ		R		R		R		R	R	R		R
3	ホソエダマカニノテ	R	R		R				R		R		
4	カニノテ属		R		R		R		R		R		R
5	モサズキ属	R	R	R	5	5		R		5		R	R
6	無節サンゴモ類	5	5	15	5	5	5	R	5	R	5	R	5
7	テングサ属	5	R	R	R	R	R	R	R		R	R	R
8	イワナガリ科	R	10	5	10	5	5			R	R		R
9	イギス科	R		R		R		R	R	R	R		
10	クロカシラ属	R			R	R	R	R	R		R	R	5
11	アミジクサ属	R	R	R	R	R	R	R	5	R	R	R	R
12	ハイオキ属	R	R	R	R	R	R		5	R		R	R
13	ウミウチリ属				R		R	R	R	R	R		R
14	サボテンクサ属				R								
15	ミスミタマ						R	R	R	R	R		R
16	フデノホ		R	R		R		R	R	R	R		R
17	リュウキュウカササ					R	R	R	R	R	R	R	R
18	ヒナカサノリ	R					R	R	R	R			
19	微小海藻類	25	15	15	15	25	15	20	25	30	30	15	35
全体被度(%)		45	40	40	45	45	40	30	45	45	40	20	50
海藻類出現種類数		12	12	10	14	12	14	13	16	14	15	9	15
浮泥の堆積状況		I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I

注1：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。

II：海底面(護岸)をはたと濁る。

III：浮泥がまばらに堆積している。

IV：浮泥が一様に(厚く)堆積している。

注2：コドラートNo.13～18は、地点上に新たに消波ブロックが設置されたため、調査地点から除外した。

表ー 6.2.4 (7) 付着生物の調査結果（凹凸消波ブロック、夏季）

調査日：令和2年8月5, 6, 7日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ = 21～50個体；c = 51～99個体

cc = 100個体以上；R = 被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コードラートNo. (基質種別) , コドラート設置深度															
		①丸型消波ブロック (小)				②丸型消波ブロック (大)				③丸型消波ブロック (大)				④角型消波ブロック (大)			
		上		下		上		下		上		下		上		下	
		溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし
1	ゼニシス属																
2	モジノスナゴ					R	R					R	R	R			
3	普通海綿綱																
4	ハネミドリ									rr				r			
5	ミナミエダウミヒドリ																
6	ハネミドリ科	r		r	r												
7	外肛動物門														R	R	
8	ウスヒメツバキ															rr	
9	リュウキュウヒメツバキ																
10	オニノツバキ科																
11	フタモトヒメツバキ																
12	リュウキュウヒメツバキ																
13	ムカデガイ科			rr	r	rr	rr	r	r	r	r	r	r	rr	rr	rr	rr
14	ミツケキリレ科																
15	フトコロガイ													rr			
16	チョウチンフデ													rr			
17	フトコロガイ科																
18	ベニエガイ																
19	ミドリリアリ																
20	カスリイカキモトキ																
21	イタボカキ科									rr	rr					rr	
22	クサビヒシガイ																
23	ヒメシヤコガイ																
24	ツクエガイ科		rr			rr	rr			rr	rr			rr			rr
25	イハランサシコカイ							rr		rr							
26	ウスマキコガイ亜科			r				rr							r	r	rr
27	多毛綱					rr											
28	サンゴフシツボ科			r										rr			
29	タテマフシツボ		rr												rr		
30	シロスシフシツボ		rr	rr				rr	rr		rr	rr					
31	端脚目													rr	rr		
32	ツマシロサンゴヤトカリ	rr		rr													
33	ツマキヨコハサミ																
34	ヨコハサミ属							rr									
35	フタバベニツケモトキ																
36	サンゴガイニ科			rr													
37	クモヒト綱							rr				rr					
38	ホナカウニ					rr											
39	リュウキュウナカウニ																
40	タリシ																
41	ウスボヤ科							R					R		R	R	
42	ヘンケボヤ科															R	
43	ナツメボヤ科							rr		rr							
44	シロボヤ科																
45	ベニボヤ属									rr						rr	
底生動物出現種数		2	3	7	2	5	3	7	3	7	4	4	3	8	6	8	3

注1：主な出現種は20個体以上(cc、c、+)確認された種を示す。

注2：主な出現種の欄の-は20個体以上(cc、c、+)の種が確認されなかったことを示す。

注3：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。

II：海底面(護岸)をはたと濁る。

III：浮泥がまばらに堆積している。

IV：浮泥が一様に(厚く)堆積している。

表ー 6.2.4 (8) 付着生物の調査結果 (凹凸消波ブロック、夏季)

調査日：令和2年8月5, 6, 7日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+=21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo. (基質種別) , コドラート設置深度															
		①丸型消波ブロック (小)				②丸型消波ブロック (大)				③丸型消波ブロック (大)				④角型消波ブロック (大)			
		上		下		上		下		上		下		上		下	
		溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし
1	ハナササコノ属	1		2													
2	ミドリシ属	6		6													
3	ハマサソノ属																
4	キクメイシ属																
5	コカメコキクメイシ属																
6	ルリサソノ属																
7	トゲキクメイシ属																
8	アサソノモトノキ属			1													
サンゴ類出現種類数		2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	藍藻綱	R	R		R	R	R		R			R	R		R		R
2	ソテツ科			R												R	
3	ヒメカニノテ											R					
4	カニノテ属																
5	モサノキ属					R	R		R	R	R	R	R	R	R	R	
6	無節サソノモ類	40	55	10	35	10	35	30	5	10	15	20	20	R	R	85	75
7	ハデンクサ						R										
8	デンクサ属	R	R				R		R	R	R	R	R	R	R	R	R
9	イワナリ科	R	5	45	R	R	5	R	10	35	25	30	10	5	50	10	R
10	ホソバナミノナ									R	R						
11	デンクサモトノキ属						R					R					
12	イキス科				R	R	R										
13	ダシノ科																
14	イトクスダシ												R				
15	クロカシラ属		R		5	R	R	R	5			R	R	R	R		5
16	アミシダシ属			R			R				R	5	R	R	R		
17	ハイオキ属	R				R	R		R	R	R	R	R	R	10	R	
18	ウスコウサ																
19	ウミウサ属																
20	アサ属																
21	キッコウダシ								R								
22	ミスダマ																
23	フデノホ											R	R		R	R	
24	ヒナカサリ								R						R		
25	微小海藻類	5	R	5	15	25	20	10	20	5	10	10	25	25	5	R	10
全体被度(%)		50	65	60	55	40	65	40	45	50	55	70	60	35	70	90	90
海藻類出現種類数		6	6	5	6	8	12	4	10	7	8	12	11	8	11	8	6
浮泥の堆積状況		I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

注1：主な出現種は20個体以上(cc、c、+)確認された種を示す。

注2：主な出現種の欄の-は20個体以上(cc、c、+)の種が確認されなかったことを示す。

注3：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。

II：海底面(護岸)をはたと濁る。

III：浮泥がまばらに堆積している。

IV：浮泥が一様に(厚く)堆積している。

表ー 6.2.4 (9) 付着生物の調査結果（凹凸消波ブロック、夏季）

調査日：令和2年8月5、6、7日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ = 21～50個体；c = 51～99個体

cc = 100個体以上；R = 被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コードラートNo. (基質種別) , コードラート設置深度															
		⑤角型消波ブロック (大)				⑥角型消波ブロック (中)				⑦角型消波ブロック (中)				⑧角型消波ブロック (小)			
		上		下		上		下		上		下		上		下	
		溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし
1	ゼニシ属											rr	r			r	r
2	モジノスナコ			R	R					R	R	R				R	R
3	普通海綿綱					R	R	R		R							
4	ハネミドリ																
5	ミナミエダウミヒドリ																
6	ハネカヤ科																
7	外肛動物門	R		R	R											R	R
8	ウスヒサカガイ			rr	rr	rr	rr							rr			
9	リュウキュウヒメカタヘ																
10	オニノツカガイ科							rr				rr					
11	フタモチヒメカタヘ																
12	リュウキュウヒメカタヘ																
13	ムカデガイ科	rr	rr	rr	rr	rr	rr	r	rr	rr	rr	rr	rr	rr	rr	rr	rr
14	ミツチケリレ科							rr									
15	フトコロガイ	rr				rr		rr								rr	rr
16	チョウチンフデ							rr									
17	フトコロガイ科												rr				
18	ベニエガイ															rr	
19	ミドリリアオリ							rr									
20	カスリイシカキモトキ																
21	イタボカキ科	rr		rr		rr							rr			rr	
22	クサヒビシガイ													rr			
23	ヒメシヤコガイ									rr							
24	ツクエガイ科										rr	rr					
25	イハラカンサシコカイ																
26	ウスマキコカイ亜科	r		r	rr	rr	rr	r									
27	多毛綱														rr		
28	サンゴフジツボ科											rr	r		rr		
29	タテマフジツボ	rr				rr	rr	rr	rr								
30	シロスジフジツボ														rr		
31	端脚目																
32	ツマジロサンゴヤトカリ	rr															
33	ツマキヨコハサミ									rr							
34	ヨコハサミ属																
35	フタバベニツケモトキ											rr					
36	サンゴガニ科									rr		rr		rr	rr		
37	クモヒデ綱																
38	ホナカウニ	rr													rr		
39	リュウキュウナガウニ							rr									
40	タリシウニ											rr					
41	ウスボヤ科	R		R								R		R			
42	ヘンケボヤ科	R						R									
43	ナツメボヤ科																
44	シロボヤ科							R									
45	ベニボヤ属					rr				rr							
底生動物出現種数		10	1	5	5	6	6	11	5	5	4	10	6	6	5	7	4

注1：主な出現種は20個体以上(cc、c、+)確認された種を示す。

注2：主な出現種の欄の-は20個体以上(cc、c、+)の種が確認されなかったことを示す。

注3：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。

II：海底面(護岸)をはたと濁る。

III：浮泥がまばらに堆積している。

IV：浮泥が一様に(厚く)堆積している。

表ー 6.2.4 (10) 付着生物の調査結果（凹凸消波ブロック、夏季）

調査日：令和2年8月5, 6, 7日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo. (基質種別) , コドラート設置深度															
		⑤角型消波ブロック (大)				⑥角型消波ブロック (中)				⑦角型消波ブロック (中)				⑧角型消波ブロック (小)			
		上		下		上		下		上		下		上		下	
		溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし
1	ハナサヤシソコ属											1					
2	ミドリイシ属									5	1	2		3	2		
3	ハマサソコ属										6	7	6			1	2
4	キクメイシ属										1						
5	コカメコキクメイシ属										1					1	
6	ルリサソコ属										1						1
7	トゲキクメイシ属											1					
8	アナサソコモドキ属										1	4	8				
サンゴ類出現種類数		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	2	1	1	2	2
1	藍藻綱			R			R	R									
2	ソテツカラムシ	R									R	R			R		
3	ヒメカニノテ									R		R					
4	カニノテ属																
5	モサズキ属	R		R	R	R	R	R			R	R	R	R	R		R
6	無節サソコモ類	10	5	R	R	5	15	R	5	15	15	15	R	5	25	R	R
7	ハビデンクサ																
8	デンクサ属		R	R		R	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R
9	イワナワ科	15	R	20	5	20	5	R	R	R	20	25	25	R	10	5	5
10	ホソバナミノナ																
11	デンクササトキ属			R					R				R				
12	イキス科								R			R	R				
13	ダシニア科			R					R								
14	イトクスグサ																
15	クロガシラ属	5	15		R		R			R	R			R	R		
16	アミシグサ属			R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R	R
17	ハイオギ属			5	R	40	35	40	10	R	5	R	R		10		
18	ウスコギナリ									R		R					
19	ウミウチ属																
20	アサ属																
21	キツコウグサ																
22	ミスミタマ												R				
23	フテノホ	R		R		R	R	R					R	R		R	R
24	ヒナカサリ												R	R			R
25	微小海藻類	10	30	15	25	10	10	5	25	25	25	10	10	30	20	15	25
全体被度(%)		40	50	45	35	75	70	50	40	40	65	55	40	40	65	20	30
海藻類出現種類数		7	5	11	7	8	10	8	9	8	9	11	12	9	9	6	8
浮泥の堆積状況		I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	III	II	II	III	III

注1：主な出現種は20個体以上(cc、c、+)確認された種を示す。

注2：主な出現種の欄の-は20個体以上(cc、c、+)の種が確認されなかったことを示す。

注3：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。

II：海底面(護岸)をはたと濁る。

III：浮泥がまばらに堆積している。

IV：浮泥が一様に(厚く)堆積している。

表ー 6.2.4 (11) 付着生物の調査結果（凹凸消波ブロック、夏季）

調査日：令和2年8月5, 6, 7日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コードラートNo. (基質種別) , コードラート設置深度															
		⑨角型消波ブロック (小)				⑩丸型消波ブロック (小)				⑪丸型消波ブロック (大)				⑫丸型消波ブロック (大)			
		上		下		上		下		上		下		上		下	
		溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし
1	ゼニシス属						rr		rr								
2	モシノスナコ						R					R	R			R	R
3	普通海綿綱																R
4	ハネミドリ									r							
5	ミナミエダウミヒドリ															R	
6	ハネカヤ科																
7	外肛動物門												R				
8	ウスヒサケガイ																
9	リュウキュウヒメカタヘ								rr								
10	オニツノガイ科																
11	フタモチヘビガイ														rr		
12	リュウキュウヘビガイ													rr			
13	ムカデガイ科	rr		rr	rr	rr	rr		rr			rr	rr				
14	ミツケキリレ科																
15	フトコロガイ																
16	チョウチンフデ																
17	フトウガイ科																
18	ベニエガイ																
19	ミドリリアリ			rr								rr		rr			
20	カスリイサキモトキ				rr												
21	イタボカキ科				rr	rr				rr		rr		rr	rr		
22	クサビヒシガイ																
23	ヒメシヤコガイ																
24	ツクエガイ科																
25	イハラカンサシコカイ																
26	ウスマキコガイ亜科				rr		rr	rr		rr	rr	r	r	r	r		
27	多毛綱																
28	サンコフシツボ科																
29	タテシマフシツボ													rr	rr		
30	シロスシフシツボ									rr							
31	端脚目																
32	ツマジロギンコヤトカリ																
33	ツマキヨコハサミ																
34	ヨコハサミ属																
35	フタバベニツケモトキ																
36	サンコフガニ科	rr	rr	rr		rr											
37	クモヒトデ綱																
38	ホナカウニ																
39	リュウキュウナガウニ													rr			
40	タリウニ															rr	
41	ウスボヤ科		R			R											
42	ヘンケボヤ科																
43	ナツメボヤ科																
44	シロボヤ科																
45	ベニボヤ属																
底生動物出現種数		2	2	3	4	4	4	1	3	4	1	5	4	6	4	3	2

注1：主な出現種は20個体以上(cc、c、+)確認された種を示す。

注2：主な出現種の欄の-は20個体以上(cc、c、+)の種が確認されなかったことを示す。

注3：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

- I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。
- II：海底面(護岸)をはたと濁る。
- III：浮泥がまばらに堆積している。
- IV：浮泥が一様に(厚く)堆積している。

表ー 6.2.4 (12) 付着生物の調査結果（凹凸消波ブロック、夏季）

調査日：令和2年8月5, 6, 7日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ = 21～50個体；c = 51～99個体

cc = 100個体以上；R = 被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo. (基質種別) , コドラート設置深度															
		⑨角型消波ブロック (小)				⑩丸型消波ブロック (小)				⑪丸型消波ブロック (大)				⑫丸型消波ブロック (大)			
		上		下		上		下		上		下		上		下	
		溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし
1	ハナササコノ属	1	1			1				1	1			1			
2	ミドリシ属		1	1		1		1									
3	ハマサソコノ属	1		1													
4	キクメイシ属																
5	コカメコキクメイシ属																
6	ルリサソコノ属																
7	トゲキクメイシ属																
8	アナサソコノモトノキ属																
サンゴ類出現種類数		2	2	2	0	2	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
1	藍藻綱						R			R	R						
2	ソテツ科		R	R													
3	ヒメカニノテ																
4	カニノテ属										R						
5	モサズノキ属	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	5	R	R
6	無節サソコノモ類	R	10	5	5	5	R	5	5	10	10	5	R	5	10	10	10
7	ハビデンクサ																
8	デンクサ属	R	R	R	R	R	5	10	5	R	R	R	R	R	R	R	R
9	イワナガ科	R	20	10	R	20		R	R	25	30	20	30	20	20	20	15
10	ホソバナミノナ																
11	デンクササトノキ属																
12	イキス科																
13	ダシノ科																
14	イトクスダクサ																
15	クロガシラ属	R	R	R	R		R										
16	アミシダクサ属	R	R	R		R	R	R	R	5	R	R	R	R	R	R	R
17	ハイオキノ属		R			R	R	R	R	R	R	10	5	5	5	5	5
18	ウスコキナリ		R	R													
19	ウミウチノ属							R				R	R	R	R	R	
20	アサノ属										R						
21	キツコダクサ																
22	ミスミタマ																
23	フデノホ	R	R	R								R	R	R		R	R
24	ヒナカサノリ			R		R											
25	微小海藻類	25	5	20	30	10	20	30	10	15	15	10	10	10	10	10	15
全体被度(%)		30	40	40	35	40	30	45	25	60	60	45	50	45	50	50	45
海藻類出現種類数		8	11	11	6	8	8	7	8	8	10	9	9	9	8	9	8
浮泥の堆積状況		II	II	II	II	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I	I	I

注1：主な出現種は20個体以上(cc、c、+)確認された種を示す。

注2：主な出現種の欄の-は20個体以上(cc、c、+)の種が確認されなかったことを示す。

注3：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。

II：海底面(護岸)をはたと濁る。

III：浮泥がまばらに堆積している。

IV：浮泥が一樣に(厚く)堆積している。

表ー 6.2.4 (13) 付着生物の調査結果（凹凸消波ブロック、冬季）

調査日：令和2年12月18, 23日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+=21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo. (基質種別)，コドラート設置深度															
		①丸型消波ブロック (小)				②丸型消波ブロック (大)				③丸型消波ブロック (大)				④角型消波ブロック (大)			
		上		下		上		下		上		下		上		下	
		溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし
1	セニシ属																
2	モシマスコ						R			R		R	R	R		R	R
3	普通海綿綱											R				R	R
4	ハネミドリ科			rr													
5	ミナミエタウミヒトラ																
6	Zoanthus 属																
7	イワナギンチャク									R							
8	外肛動物門															R	
9	新ヒザラガイ目		rr							rr	rr	rr				r	rr
10	ツタノハガイ																
11	コマフカニモリ																
12	オノヅカガイ科																
13	フタモチヘビガイ																
14	リュウキウヘビガイ											rr					
15	ムカデガイ科			rr	rr	rr	rr	r	r	r	r	r	r	rr	rr	rr	rr
16	クチムラサキレイシタマシ													rr			
17	シロイレイシ																
18	シロイボノシガイ																
19	マルニシ																
20	シロセイロンイモ																
21	ナガシマイモ																
22	ヒラカラムツガイ																
23	ヘニエガイ																
24	ミドリリアオリ																
25	ニウトリガイキ													rr			
26	イタボウキ科									rr	rr					rr	
27	キクサノルガイ科																
28	ヒメジャコガイ																
29	ヒレジャコガイ															rr	
30	ツクエガイ科																
31	ウスマキノカイ皿科																r
32	カンサシコガイ科													rr		rr	r
33	ヒドロキノコフシツボ																
34	サシコフシツボ科																
35	タチシマフシツボ																r
36	シロスシフシツボ			r				rr	rr		rr						
37	ウニシヤコ																
38	端脚目																
39	ミドリシエビ																
40	ツマシロキノコヤトカリ			rr													
41	アカツメキノコヤトカリ	rr															
42	ウスイロキノコヤトカリ																
43	ヨコハサミ属																
44	ホシヤトカリ上科																
45	ヒメキノコカニ属																
46	キノコカニ科	rr															
47	ホシナガウニ					rr								rr			
48	リュウキウナガウニ																
49	タウシウニ													rr		rr	
50	チャツボホヤ																

注1：主な出現種は20個体以上(cc、c、+)確認された種を示す。

注2：主な出現種の欄の-は20個体以上(cc、c、+)の種が確認されなかったことを示す。

注3：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

Ⅰ：海底面(護岸)をはたいても濁らない。

Ⅱ：海底面(護岸)をはたくと濁る。

Ⅲ：浮泥がまばらに堆積している。

Ⅳ：浮泥が一様に(厚く)堆積している。

表ー 6.2.4 (14) 付着生物の調査結果 (凹凸消波ブロック、冬季)

調査日：令和2年12月18, 23日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo. (基質種別) , コドラート設置深度															
		①丸型消波ブロック (小)				②丸型消波ブロック (大)				③丸型消波ブロック (大)				④角型消波ブロック (大)			
		上		下		上		下		上		下		上		下	
		溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし
51	ミドリネエキホヤ															R	
52	ミドリミシウホヤ																
53	ウスホヤ科									R		R	R	R		R	R
54	コハルトツボヤ																
55	ツツボヤ属																
56	ヘンゲホヤ科																
57	ナツホヤ科																
58	イタホヤ科													R			
59	シロホヤ科													rr		r	
60	ヘニホヤ属	rr															
61	マホヤ科																
底生動物出現種類数		3	1	4	1	2	2	2	2	5	5	6	3	10	1	12	8
1	ハナサヤシコ属	1		1					1		1					6	3
2	ミドリイシ属	6		5		1	1	3		1							
3	ハマサンコ属																
4	キクメイシ属																
5	コカメノコキクメイシ属																
6	ノウサンコ属																
7	ルリサンコ属																
8	トゲキクメイシ属																
9	アナサンコモトギ属			1													
サンゴ類出現種類数		2	0	3	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
1	藍藻綱	R	R		R	R	R		R	R	5	R	R	R	R	R	R
2	ソテガハラミ																
3	ガハラ																
4	ホリエガカニノテ																
5	カニノテ属									R	R	R				R	
6	モサズキ属									R	R	R	R	R	R	R	
7	無節サンゴモ類	80	85	35	85	50	50	65	20	10	25	25	30	50	85	5	10
8	ハイデンクサ																
9	デンクサ属								R	R	R	R			R	R	
10	イワナリ科	R	R	15	R	R	R	15	25	75	45	40	10	40	R	30	40
11	ホソバナミハナ									R	R						
12	スギノ目																
13	ワツナギノリ属															R	
14	デンクサモトギ属										R	R	R			R	
15	イグス科																
16	ダシア科																
17	トクズグサ											R					
18	クロカシ属												R		R		
19	アミジグサ属										R	R	R	R	R	R	R
20	ハイオギ属			25		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	5	R
21	ウミウチ属																
22	オホデンクサ属																
23	ハネモ属									R							
24	フデノホ																
25	リュウキュウカサ																
26	ヒナサナリ									R		R					
27	微小海藻類		R	R	R	15	30	R	20	5	10	10	30	R	5	15	R
全体被度(%)		80	85	75	95	70	85	85	70	90	90	85	70	95	95	60	55
海藻類出現種類数		3	4	4	4	5	5	4	6	11	11	12	9	7	9	11	6
浮泥の堆積状況		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

注1：主な出現種は20個体以上(cc、c、+)確認された種を示す。

注2：主な出現種の欄の-は20個体以上(cc、c、+)の種が確認されなかったことを示す。

注3：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。

II：海底面(護岸)をはたくと濁る。

III：浮泥がまばらに堆積している。

IV：浮泥が一樣に(厚く)堆積している。

表ー 6.2.4 (15) 付着生物の調査結果（凹凸消波ブロック、冬季）

調査日：令和2年12月18, 23日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo. (基質種別)，コドラート設置深度															
		⑤角型消波ブロック (大)				⑥角型消波ブロック (中)				⑦角型消波ブロック (中)				⑧角型消波ブロック (小)			
		上		下		上		下		上		下		上		下	
		溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし
1	ゼニヒ属		rr	rr	rr							rr	+			rr	r
2	モシノスゴ			R	R	R				R	R	R	R				
3	普通海綿綱	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R				
4	ハネリヒトウ科																
5	ミナミエタウミヒトラ																
6	Zoanthus 属											R					
7	イワシキソウチャク																
8	外肛動物門	R		R				R			R	R					
9	新ヒサカギ目				rr		rr	rr	rr								
10	ツタノハカギ											rr					
11	コマフカニモリ																
12	オコノツノカギ科																
13	フタモチヘビカギ																
14	リュウキュウヘビカギ										rr						
15	ムカデカギ科	rr	rr		+	r	rr	rr	rr	rr	rr	rr	rr		rr		
16	クチムラサキレイシタマシ																
17	シロイカレイシ	rr															
18	シロイボノシカギ	rr															
19	マルニシ												rr				
20	シロセイロンイモ												rr				
21	ナガシマイモ												rr				
22	ヒメカマツカギ														rr		
23	ヘニエカギ							rr									
24	ミドリリアオ			rr		rr		rr				rr					
25	ニワトリカギ			rr			rr										
26	イタボカギ科																
27	キクサノカギ科												rr				
28	ヒメシヤコカギ									rr							
29	ヒレシヤコカギ																
30	ツクエカギ科										rr	rr					
31	ウスマキコカイ亜科																
32	カンサシコカイ科			rr		rr		rr									
33	ヒトリロサンコフシツボ												+				
34	サンコフシツボ科												+		rr		
35	タテシマフシツボ					rr	rr										
36	シロスシフシツボ																
37	ウニシヤコ																
38	端脚目							rr									
39	ミドリイシヒ											rr					
40	ツマシロサンコヤトカリ														rr		
41	アカツメサンコヤトカリ									rr							
42	ウスイロサンコヤトカリ					rr											
43	ヨコハサミ属																
44	ホンヤトカリ上科																
45	ヒメサンコカニ属									r	rr						
46	サンコカニ科											rr					
47	ホンナカウニ	rr				rr				rr							
48	リュウキュウナカウニ														rr		
49	タワウニ							rr									
50	チャツボホヤ				R												

注1：主な出現種は20個体以上(cc、c、+)確認された種を示す。

注2：主な出現種の欄の-は20個体以上(cc、c、+)の種が確認されなかったことを示す。

注3：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。

II：海底面(護岸)をはたと濁る。

III：浮泥がまばらに堆積している。

IV：浮泥が一様に(厚く)堆積している。

表ー 6.2.4 (16) 付着生物の調査結果（凹凸消波ブロック、冬季）

調査日：令和2年12月18, 23日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ = 21～50個体；c = 51～99個体

cc = 100個体以上；R = 被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コードラートNo. (基質種別) , コドラート設置深度															
		⑤角型消波ブロック (大)				⑥角型消波ブロック (中)				⑦角型消波ブロック (中)				⑧角型消波ブロック (小)			
		上		下		上		下		上		下		上		下	
		溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし
51	ミドリネギホヤ				R	R				R							
52	ミドリミスジウスホヤ											R					
53	ウスホヤ科	R		R		R		R		R		R					
54	コハルトツボヤ			R													
55	ツボヤ属					R											
56	ヘンゲホヤ科	R						R									
57	ナツメホヤ科							R									
58	イホヤ科																
59	シロホヤ科			rr		rr		R									
60	ベニホヤ属																
61	マホヤ科	r		rr		rr	rr										
底生動物出現種類数		9	2	11	7	13	6	13	3	9	8	16	6	3	2	1	1
1	ハナヤサイランコ属											1					
2	ミドリイシ属									5	1	2		3	2		
3	ハマサンゴ属		1								6	7	6			1	2
4	キクメイシ属										1						
5	コカメノコキクメイシ属										1						
6	ノウサンゴ属																
7	ルリサンゴ属										1						1
8	トゲキクメイシ属										1	1					
9	アナサンゴモドキ属											3	6				
サンゴ類出現種類数		0	1	0	0	0	0	0	0	1	6	5	2	1	1	1	2
1	藍藻綱	R	40	R	R	15	5	5	25	10	10	R	R	R	R		15
2	ゾエカラムシ	R									R						
3	カクツカウ							R									
4	ホリエタカニノテ																
5	カニノテ属	R			R						R	R	R				
6	モサズキ属	R		R	R	R	R	R			R	R	R	R	R		
7	無節サンゴモ類	20	5	5	5	10	15	10	10	20	15	15	10	20	45	R	R
8	ハビテンクサ																
9	テンクサ属		R	R	R		R					R	R	R	R	R	R
10	イワナリ科	55	R	40	5	15	10	R	R	R	40	35	30	R	R	15	5
11	ホリハナミノハナ																
12	スキナリ目	R		R													
13	ワツナギナリ属																
14	テンクサモドキ属			R								R	R				
15	イギス科									R		R	R				
16	グンシア科							R					R				
17	イトクズグサ																
18	クロガシラ属																
19	アミシグサ属	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R	
20	ハノオギ属			R	R	30	35	5	R	R	10	R	5	R	R	R	
21	ウミウチ属																
22	サホテンクサ属										R	R					
23	ハネモ属						R					R					
24	フデノホ				R	R							R				
25	リュウキュウカサ				R												
26	ヒナカサリ							R									
27	微小海藻類	R	5	5	30	5	10	5	R	10	15	10	10	70	45	45	65
全体被度(%)		80	50	50	45	80	80	30	40	40	90	65	60	90	95	65	85
海藻類出現種類数		9	5	10	11	8	9	10	6	7	10	13	13	8	7	6	5
浮泥の堆積状況		I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	II	II

注 1：主な出現種は 20 個体以上(cc、c、+) 確認された種を示す。

注 2：主な出現種の欄の-は 20 個体以上(cc、c、+)の種が確認されなかったことを示す。

注 3：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。

II：海底面(護岸)をはたと濁る。

III：浮泥がまばらに堆積している。

IV：浮泥が一様に(厚く)堆積している。

表ー 6.2.4 (17) 付着生物の調査結果（凹凸消波ブロック、冬季）

調査日：令和2年12月18, 23日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo. (基質種別)，コドラート設置深度															
		③角型消波ブロック (小)				⑩丸型消波ブロック (小)				⑪丸型消波ブロック (大)				⑫丸型消波ブロック (大)			
		上		下		上 (2.2 m)		下 (4.1 m)		上 (2.5 m)		下 (6.0 m)		上 (2.5 m)		下 (7.5 m)	
		溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし
1	ゼニシ属																
2	モシ`スナコ`				R					R	R	R	R			R	R
3	普通海綿綱																R
4	ハネウミヒト`ラ科									R				R			
5	ミナミエタ`ウミヒト`ラ															R	
6	Zoanthus 属																
7	イワナギ`ンチャク																
8	外肛動物門																
9	新ヒザ`ラカ`イ目																
10	ツタノハカ`イ																
11	コ`マフカニモリ					rr		rr									
12	オ`ノツノガ`イ科						rr										
13	フタモチヘビ`カ`イ														rr		
14	リュウキュウヘビ`カ`イ										rr			rr			
15	ムカデ`カ`イ科			rr		rr	rr		rr			rr	rr			rr	
16	クヂムラサキレイシタ`マシ					rr											
17	シロイガ`レイシ																
18	シロイホ`ノシガ`イ																
19	マサニシ																
20	シロセイロンイモ																
21	ナガ`シマイモ																
22	ヒラカヲマツカ`イ																
23	ヘ`ニエカ`イ																
24	ミト`リアオリ			rr						rr		rr					
25	ニウトリカ`キ																
26	イタホ`カ`キ科		rr			rr				rr		rr		rr	rr		
27	キクサ`ルガ`イ科																
28	ヒメシヤコガ`イ																
29	ヒレシヤコガ`イ																
30	ツクエガ`イ科																
31	ウス`マキノ`カイ皿科						rr	rr		rr	rr	r	r	r	r		
32	カンサ`シコ`カイ科																
33	ヒト`ロキノコ`フシ`ツボ`																
34	サシコ`フシ`ツボ`科		rr														
35	タチシ`マフシ`ツボ`													rr	rr		
36	シロスジ`フシ`ツボ`									rr	rr						
37	ウニシヤコ												rr				
38	端脚目																
39	ミト`リイシエビ`																
40	ツマシ`ロキノコ`ヤト`カリ																
41	アカツメキノコ`ヤト`カリ																
42	ウスイロキノコ`ヤト`カリ																
43	ヨコハ`サミ属															rr	
44	ホシヤト`カリ上科			rr													
45	ヒメキノコ`カ`ニ属																
46	キノコ`カ`ニ科		rr	rr		rr											
47	ホシナガ`ウニ																
48	リュウキュウナガ`ウニ																
49	タリウニ															rr	
50	チャツボ`ホ`ヤ																

注1：主な出現種は20個体以上(cc、c、+)確認された種を示す。

注2：主な出現種の欄の-は20個体以上(cc、c、+)の種が確認されなかったことを示す。

注3：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。

II：海底面(護岸)をはたと濁る。

III：浮泥がまばらに堆積している。

IV：浮泥が一様に(厚く)堆積している。

表ー 6.2.4 (18) 付着生物の調査結果（凹凸消波ブロック、冬季）

調査日：令和2年12月18, 23日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

海藻類は被度(%)

No.	和名	調査地点・コドラートNo. (基質種別)，コドラート設置深度															
		⑨角型消波ブロック (小)				⑩丸型消波ブロック (小)				⑪丸型消波ブロック (大)				⑫丸型消波ブロック (大)			
		上		下		上 (2.2 m)		下 (4.1 m)		上 (2.5 m)		下 (6.0 m)		上 (2.5 m)		下 (7.5 m)	
		溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし	溝あり	なし
51	ミドリネンキボヤ																
52	ミドリミスウソボヤ																
53	ウスボヤ科		R			R											
54	コハルトツボヤ																
55	ツツボヤ属																
56	ヘンケボヤ科																
57	ナツメボヤ科																
58	イタボヤ科																
59	シロボヤ科					rr		rr									
60	ヘニボヤ属																
61	マボヤ科																
底生動物出現種類数		0	4	4	1	7	3	3	1	6	4	5	4	5	4	5	2
1	ハヤサシソコ属	1	1			1				2	1						
2	ミドリシ属		1	1		1		1									
3	ハマサソコ属	1		2								1	1			3	3
4	キクメシ属																
5	コカメノキクメシ属																
6	ノウサソコ属													1			
7	ルリサソコ属																
8	トゲキクメシ属											1					
9	アナサソコモドキ属		1	1									2				
サンゴ類出現種類数		2	3	3	0	2	0	1	0	1	1	2	2	1	0	1	1
1	藍藻綱			5		5	15		20	R	R	R					
2	ソデガラム		R	R										R			
3	カハラガラ																
4	ホソエダカニノテ							R									
5	カニノテ属		R														
6	モサズキ属	R	R	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7	無節サソコモドキ類	R	15	5	R	15	R	10	5	35	20	15	R	10	15	10	15
8	ハイトンガサ								R								
9	テンクサ属	R	R	R	R		5	5	5	R	R	R	R	R	R	R	R
10	イワナガリ科	R	30	10	R	10		R	R	10	20	5	15	25	30	20	20
11	ホソバチミノハナ																
12	スギナリ目																
13	ワサギツツ属																
14	テンクサモドキ属																
15	イギス科																
16	ダシニア科																
17	イトクスグサ																
18	クロガシラ属						10		15								
19	アミダグサ属	R	R	R		R	R	R		5	R	5	R	R	5	R	R
20	ハイオホノテ属		10	R		R	R	R	R	R	R	5	10	5	5	30	R
21	ウミウチ属						R	R						R		R	
22	サボテンクサ属																
23	ハネモ属		R	R													
24	フデノホ		R	R								R	R			R	R
25	リュウキュウカサ		R				R										
26	ヒナカサリ																
27	微小海藻類	65	5	30	35	10	15	25	15	5	15		5	5	R	5	5
全体被度(%)		70	70	55	40	45	45	40	65	60	60	45	35	50	60	70	45
海藻類出現種類数		6	12	11	4	7	10	9	9	8	8	8	8	9	7	9	8
浮泥の堆積状況		II	II	II	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

注1：主な出現種は20個体以上(cc、c、+)確認された種を示す。

注2：主な出現種の欄の-は20個体以上(cc、c、+)の種が確認されなかったことを示す。

注3：浮泥の堆積状況の外観区分は以下の基準に従った。

- I：海底面(護岸)をはたいても濁らない。
- II：海底面(護岸)をはたくと濁る。
- III：浮泥がまばらに堆積している。
- IV：浮泥が一樣に(厚く)堆積している。

3) 確認された重要な種

重要な種及び確認地点を表－ 6.2.5 に示す。

令和 2 年度調査において、重要な種は 2 種が確認された。

表－ 6.2.5 確認された重要な種及び確認地点（付着生物）

No.	和名	環境省 RL 2020	環境省 海洋生物 RL 2017	水産庁 DB	沖縄県 RDB 2017	WWF	確認地点・調査時期			
							自然石護岸	自然石塊根固被覆ブロック		凹凸消波 ブロック
								自然石部	コンクリート部	
1	ヒメシヤコ			減少				夏	冬	夏・冬
2	キカイヤマトカ		DD		VU		夏			

< 重要な種の選定基準 >

注：以下の①～⑥に該当しているものを「重要な種」として選定した。

①天然記念物：文化財保護法（法律第 214 号、昭和 25 年 5 月 30 日）により、保護されている種及び亜種

- ・特天：国指定特別天然記念物
- ・国天：国指定天然記念物
- ・県天：沖縄県指定天然記念物

②環境省 RL：「環境省レッドリスト 2020 の公表について」（環境省、令和 2 年 3 月 27 日）に記載されている種及び亜種

- ・ CR+EN（絶滅危惧 I 類）：絶滅の危機に瀕している種。
- ・ CR（絶滅危惧 I A 類）：絶滅の危機に瀕している種のうち、ごく近い将来における野生での絶滅の可能性が極めて高いもの。
- ・ EN（絶滅危惧 I B 類）：絶滅の危機に瀕している種のうち、IA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。
- ・ VU（絶滅危惧 II 類）：絶滅の危険が増大している種。
- ・ NT（準絶滅危惧）：存続基盤が脆弱な種。現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種。
- ・ DD（情報不足）：評価するだけの情報が不足している種。
- ・ LP（絶滅のおそれのある地域個体群）：地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれが高い個体群。

③環境省版海洋生物 RL：「環境省版海洋生物レッドリストの公表について」（環境省、平成 29 年 3 月 21 日）に記載されている種及び亜種

- ・ CR（絶滅危惧 I A 類）：絶滅の危機に瀕している種のうち、ごく近い将来における野生での絶滅の可能性が極めて高いもの。
- ・ EN（絶滅危惧 I B 類）：絶滅の危機に瀕している種のうち、IA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。
- ・ VU（絶滅危惧 II 類）：絶滅の危険が増大している種。
- ・ NT（準絶滅危惧）：存続基盤が脆弱な種。現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種。
- ・ DD（情報不足）：評価するだけの情報が不足している種。
- ・ LP（絶滅のおそれのある地域個体群）：地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれが高い個体群。

④水産庁 DB：「日本の希少な野生水生生物に関するデータブック」（水産庁、2000 年）

- ・ 絶危（絶滅危惧種）：絶滅の危機に瀕している種・亜種。
- ・ 危急（危急種）：絶滅の危険が増大している種・亜種。
- ・ 希少（希少種）：存続基盤が脆弱な種・亜種。
- ・ 減少（減少種）：明らかに減少しているもの。
- ・ 減少傾向：長期的に見て減少しつつあるもの。

⑤沖縄県 RDB：「沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（レッドデータおきなわ）ー動物編ー」（沖縄県、平成 29 年）に記載されている種及び亜種

- ・ CR+EN（絶滅危惧 I 類）：沖縄県では絶滅の危機に瀕している種。
- ・ CR（絶滅危惧 I A 類）：沖縄県では、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。
- ・ EN（絶滅危惧 I B 類）：沖縄県では A 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。
- ・ VU（絶滅危惧 II 類）：沖縄県では絶滅の危機が増大している種。
- ・ NT（準絶滅危惧）：沖縄県では存続基盤が脆弱な種。
- ・ DD（情報不足）：沖縄県では評価するだけの情報が不足している種。
- ・ LP（絶滅のおそれのある地域個体群）：沖縄県で地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの。

⑥WWF：「WWF Japan Science Report3 日本における干潟海岸とそこに生息する底生動物の現状」（和田ら、1996 年）

- ・ 絶滅：野生状態ではどこにも見あたらなくなった種。
- ・ 絶滅寸前：人為の影響の如何に関わらず、個体数が異常に減少し、放置すればやがて絶滅すると推定される種。
- ・ 危険：絶滅に向けて進行しているとみなされる種。今すぐ絶滅という危機に瀕するということはないが、現状では確実に絶滅の方向へ向かっていると判断されるもの。
- ・ 希少：特に絶滅を危惧されることはないが、もともと個体数が非常に少ない種。
- ・ 普通：個体数が多く普通にみられる種。
- ・ 現状不明：最近の生息の状況が乏しい種。

6.2.2 海域生物

生息場の減少による魚類への影響については小さいと予測されたこと、砂面変動の変化による底生動物への影響については長期的な観点で予測されたこと、潮流・波浪の変化による底生動物への影響については限られた範囲のみで予測されたことについて、新たな環境に順応した生物相が形成され则认为られることから、底生動物と魚類について事後調査を実施した。

また、工事中の濁り対策や連絡誘導路における通水性確保等の環境保全措置を実施することとしているが、海域生物への影響要素が及ぼす影響についての知見は少なく、効果の不確実性を伴うため、海域生物（植物プランクトン、動物プランクトン、魚卵・稚仔魚、魚類、底生動物（マクロベントス、メガロベントス）、サンゴ類、海藻草類、クビレミドロ）の生息・生育状況、水底質といった生息・生育環境について事後調査を実施した。

なお、海域生態系においては、工事の実施に伴い基盤環境や注目種等の一部が影響を受け、土地又は工作物の存在及び供用に伴い礁池と砂質干潟では生物相の変化に伴う生態系の機能の変化が予測されている。これらの変化については、海域生物の事後調査によってモニタリングしていくこととした。

(1) 植物プランクトン

1) 調査概要

満潮時付近に、バンドーン採水器を用いて、各地点の表層（海面下 0.5m 層）で 5L を採水し、現地でホルマリン固定して室内分析のための試料とした。持ち帰った試料について、種の同定、細胞数の計数を行った。

調査は「海洋調査技術マニュアル」（（社）海洋調査協会）等に基づいて行った。

2) 調査結果

植物プランクトンの調査結果概要は表－ 6.2.6 に、出現種一覧は表－6.2.7 に、調査結果は表－6.2.8 に示すとおりである。

(ア) 夏季

ア) 種構成

採集された植物プランクトンは渦鞭毛藻綱 7 種類、珪藻綱 15 種類、その他 7 種類の計 29 種類であった。

調査地点別の種類数は 17～24 種類の範囲にあり、St.3 で最も多く、St.2 で最も少なかった。

イ) 細胞数

調査地点別の細胞数は 49,900～536,000 細胞/L（平均：237,825 細胞/L）の範囲に

あり、St.6 で最も多く、St.5 で最も少なかった。

主な出現種は、黄色植物の珪藻綱羽状目である *Nitzschia* sp. (chain formation) であり、全地点合計細胞数の 81.5% を占めた。

ウ) 沈殿量

調査地点別の沈殿量は 0.02~0.14mL/L で St.7 で最も多かった(平均 0.05mL/L)。

(イ) 冬季

ア) 種構成

採集された植物プランクトンは渦鞭毛藻綱 12 種類、珪藻綱 37 種類、その他 8 種類の計 57 種類であった。

調査地点別の種類数は 19~39 種類の範囲にあり、St.1 で最も多く、St.2 で最も少なかった。


イ) 細胞数

調査地点別の細胞数は 9,650~61,700 細胞/L (平均:21,956 細胞/L) の範囲にあり、St.4 で最も多く、St.8 で最も少なかった。

主な出現種は、クリプト藻綱の CRYPTOMONADALES (クリプトモナス目)、渦鞭毛藻綱の PERIDINIALES (ペリディニウム目)、プラシノ藻綱 (PRASINOPHYCEAE) であり、それぞれ、全地点合計細胞数の 12.8%、19.8%、14.0% を占めた。

ウ) 沈殿量

調査地点別の沈殿量は 0.00~0.02mL/L であった(平均 0.01mL/L)。



図－ 6.2.8 事後調査地点（海域生物・海域生態系、海域生物①）

表ー 6.2.6 (1) 植物プランクトンの調査結果概要 (夏季)

調査日：令和2年8月20日
調査方法：バンドーン採水器による採水

項目	調査地点	1	2	3	4	5
沈殿量(mL/L)		0.02	0.04	0.02	0.07	0.02
種類数	渦鞭毛藻綱	5	5	6	6	7
	珪藻綱	12	8	12	9	10
	その他	6	4	6	3	5
	合計	23	17	24	18	22
細胞数 (細胞/L)	渦鞭毛藻綱	12,000	28,400	8,500	34,000	8,600
	珪藻綱	44,200	56,800	26,800	326,400	26,500
	その他	16,600	18,800	18,600	41,600	14,800
	合計	72,800	104,000	53,900	402,000	49,900
細胞数 組成比 (%)	渦鞭毛藻綱	16.5%	27.3%	15.8%	8.5%	17.2%
	珪藻綱	60.7%	54.6%	49.7%	81.2%	53.1%
	その他	22.8%	18.1%	34.5%	10.3%	29.7%
	主な出現種と細胞数 (細胞/L) ()内は組成比率 (%)	<i>Nitzschia</i> sp. (chain formation) 37,200(51.1%)	PERIDINIALES 22,400(21.5%) <i>Nitzschia</i> sp. (chain formation) 50,800(48.8%)	CRYPTOMONADALES 6,400(11.9%) <i>Nitzschia</i> sp. (chain formation) 23,700(44.0%) Unknown micro-flagellates 5,400(10.0%)	<i>Nitzschia</i> sp. (chain formation) 310,400(77.2%)	CRYPTOMONADALES 5,100(10.2%) <i>Nitzschia</i> sp. (chain formation) 24,600(49.3%)

項目	調査地点	6	7	8	平均
沈殿量(mL/L)		0.04	0.14	0.03	0.05
種類数	渦鞭毛藻綱	4	6	5	7
	珪藻綱	10	9	10	15
	その他	5	4	4	7
	合計	19	19	19	29
細胞数 (細胞/L)	渦鞭毛藻綱	16,800	12,800	10,000	16,388
	珪藻綱	503,200	373,200	257,600	201,838
	その他	16,000	20,000	10,400	19,600
	合計	536,000	406,000	278,000	237,825
細胞数 組成比 (%)	渦鞭毛藻綱	3.1%	3.2%	3.6%	6.9%
	珪藻綱	93.9%	91.9%	92.7%	84.9%
	その他	3.0%	4.9%	3.7%	8.2%
	主な出現種と細胞数 (細胞/L) ()内は組成比率 (%)	<i>Nitzschia</i> sp. (chain formation) 490,400(91.5%)	<i>Nitzschia</i> sp. (chain formation) 363,200(89.5%)	<i>Nitzschia</i> sp. (chain formation) 249,600(89.8%)	<i>Nitzschia</i> sp. (chain formation) 193,738(81.5%)

注1：主な出現種は各調査地点での上位5種(ただし、組成比が10%以上)を示した。

2：平均欄の種類数は総種類数を示した。

表ー 6.2.6 (2) 植物プランクトンの調査結果概要 (冬季)

調査日：令和2年12月17日

調査方法：バンドーン採水器による採水

項目	調査地点	1	2	3	4	5
沈殿量(mL/L)		0.01	0.02	0.01	0.02	0.00
種類数	渦鞭毛藻綱	6	4	6	5	8
	珪藻綱	27	11	19	14	17
	その他	6	4	5	6	6
	合計	39	19	30	25	31
細胞数 (細胞/L)	渦鞭毛藻綱	3,450	3,200	950	25,700	2,750
	珪藻綱	6,100	3,950	6,200	17,950	2,850
	その他	9,200	4,600	2,600	18,050	6,200
	合計	18,750	11,750	9,750	61,700	11,800
細胞数 組成比 (%)	渦鞭毛藻綱	18.4%	27.2%	9.7%	41.7%	23.3%
	珪藻綱	32.5%	33.6%	63.6%	29.1%	24.2%
	その他	49.1%	39.1%	26.7%	29.3%	52.5%
	主な出現種と細胞数 (細胞/L)	CRYPTOMONADALES 1,850 (9.9%) GYMNODINIALES 2,000 (10.7%) HAPTOPHYCEAE (Coccolithophorids) 3,800 (20.3%) Unknown micro-flagellates 1,950 (10.4%)	CRYPTOMONADALES 2,400 (20.4%) PERIDINIALES 1,900 (16.2%) PRASINOPHYCEAE 1,800 (15.3%)	CRYPTOMONADALES 1,550 (15.9%) Cylindrotheca closterium 1,550 (15.9%)	PERIDINIALES 19,200 (31.1%) PRASINOPHYCEAE 10,800 (17.5%)	CRYPTOMONADALES 1,450 (12.3%) HAPTOPHYCEAE (Coccolithophorids) 2,150 (18.2%) PRASINOPHYCEAE 2,050 (17.4%)

項目	調査地点	6	7	8	平均
沈殿量(mL/L)		0.02	0.02	0.01	0.01
種類数	渦鞭毛藻綱	5	6	7	12
	珪藻綱	15	16	12	37
	その他	5	6	4	8
	合計	25	28	23	57
細胞数 (細胞/L)	渦鞭毛藻綱	11,500	5,400	2,600	6,944
	珪藻綱	6,500	10,650	3,050	7,156
	その他	10,500	7,700	4,000	7,856
	合計	28,500	23,750	9,650	21,956
細胞数 組成比 (%)	渦鞭毛藻綱	40.4%	22.7%	26.9%	31.6%
	珪藻綱	22.8%	44.8%	31.6%	32.6%
	その他	36.8%	32.4%	41.5%	35.8%
	主な出現種と細胞数 (細胞/L)	CRYPTOMONADALES 6,200 (21.8%) PERIDINIALES 8,200 (28.8%) PRASINOPHYCEAE 3,300 (11.6%)	CRYPTOMONADALES 2,600 (10.9%) PERIDINIALES 2,500 (10.5%) PRASINOPHYCEAE 3,400 (14.3%)	CRYPTOMONADALES 2,200 (22.8%) PERIDINIALES 1,350 (14.0%) PRASINOPHYCEAE 1,350 (14.0%)	CRYPTOMONADALES 2,819 (12.8%) PERIDINIALES 4,344 (19.8%) PRASINOPHYCEAE 3,069 (14.0%)

注1：主な出現種は各調査地点での上位5種(ただし、組成比が10%以上)を示した。

2：平均欄の種類数は総種類数を示した。

表-6.2.7 植物プランクトンの出現種一覧

調査日：夏季：令和2年8月20日

冬季：令和2年12月17日

調査法：バンドーン採水器による採水

凡 例：○＝出現

No.	門	綱	目	科	学名	和名	調査季	
							夏季	冬季
1	藍色植物	藍藻	ネンジュモ	エモ	Oscillatoriaceae	エモ科	○	○
2	クリプト植物	クリプト藻	クリプトモナス	ー	CRYPTOMONADALES	クリプトモナス目	○	○
3	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	プロロセントルム	プロロセントルム	<i>Prorocentrum dentatum</i>			○
4					<i>Prorocentrum mexicanum</i>			○
5					<i>Prorocentrum minimum</i>			○
6					<i>Prorocentrum triestinum</i>			○
7			ギムノテニウム	ー	GYMNODINIALES	ギムノテニウム目	○	○
8			ヘリテニウム	ヘリテニウム	<i>Heterocapsa</i> sp.		○	○
9					<i>Peridinium quinquecorne</i>		○	○
10					<i>Protoperidinium</i> sp.		○	○
11				カルキオテニエラ	<i>Scrippsiella</i> sp.		○	○
12				セラチウム	<i>Ceratium teres</i>			○
13				オキソトクスム	<i>Oxytoxum</i> sp.		○	○
14				ー	PERIDINIALES	ヘリテニウム目	○	○
15	ハプト植物	ハプト藻	コックスファエラ	カルキオソレニア	<i>Calciosolenia murrayi</i>		○	
16				ラフトースファエラ	<i>Discosphaera tubifer</i>		○	○
17			ー	ー	HAPTOPHYCEAE (Coccolithophorids)	ハプト藻綱(円石藻類)	○	○
18	黄色植物	黄金色藻	ディクティオカ	ディクティオカ	<i>Dictyocha fibula</i>			○
19		珪藻	円心	タラシオシラ	<i>Skeletonema costatum</i>			○
20					<i>Thalassiosira</i> sp.		○	○
21					Thalassiosiraceae	タラシオシラ科		○
22				メロシラ	<i>Leptocylindrus danicus</i>			○
23					<i>Leptocylindrus mediterraneus</i>			○
24				アステロラムブラ	<i>Asteromphalus sarcophagus</i>			○
25				リゾソレニア	<i>Rhizosolenia fragilissima</i>			○
26					<i>Rhizosolenia phuketensis</i>			○
27					<i>Rhizosolenia setigera</i>			○
28					<i>Rhizosolenia stolterfothii</i>			○
29				キートケロス	<i>Bacteriastrium</i> sp.			○
30					<i>Chaetoceros curvisetum</i>			○
31					<i>Chaetoceros dadayi</i>			○
32					<i>Chaetoceros debile</i>			○
33					<i>Chaetoceros lauderi</i>			○
34					<i>Chaetoceros lorenzianum</i>			○
35					<i>Chaetoceros pendulum</i>			○
36					<i>Chaetoceros subsecundum</i>			○
37					<i>Chaetoceros</i> sp. (<i>Hyalochaete</i>)		○	○
38			羽状	ディクタマ	<i>Asterionella notata</i>			○
39					<i>Climacosphenia moniligera</i>		○	
40					<i>Cyclophora tenuis</i>		○	
41					<i>Licmophora</i> sp.		○	○
42					<i>Microtabella interrupta</i>			○
43					<i>Neodelphineis pelagica</i>			○
44					<i>Thalassionema nitzschioides</i>		○	○
45					Diatomaceae	ディクタマ科		○
46				ナウキユラ	<i>Amphora</i> sp.		○	○
47					<i>Diploneis</i> sp.		○	○
48					<i>Mastogloia</i> sp.			○
49					<i>Navicula</i> sp.		○	○
50					<i>Pleurosigma</i> sp.		○	○
51					Naviculaceae	ナウキユラ科	○	○
52				ニツシア	<i>Bacillaria paxillifer</i>			○
53					<i>Cylindrotheca closterium</i>		○	○
54					<i>Nitzschia longissima</i>			○
55					<i>Nitzschia longissima</i> var. <i>reversa</i>		○	○
56					<i>Nitzschia</i> sp. (chain formation)		○	○
57					<i>Nitzschia</i> sp.		○	○
58	ミドリムシ植物	ミドリムシ	ー	ー	EUGLENOPHYCEAE	ミドリムシ綱		○
59	緑色植物	プラシノ藻	ー	ー	PRASINOPHYCEAE	プラシノ藻綱	○	○
60	ー	ー	ー	ー	Unknown micro-flagellates	不明微細鞭毛藻類	○	○
出現種数							29	57

表-6.2.8 (1) 植物プランクトンの調査結果 (夏季)

調査日：令和2年8月20日

調査法：バンドーン採水器による採水

単 位：細胞/L, *を付した種類は糸状体/L

No.	種名 / 調査地点	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	合計
1	Oscillatoriaceae *	600	400	100		100				1,200
2	CRYPTOMONADALES	6,800	8,800	6,400	24,000	5,100	9,200	5,600	5,400	71,300
3	GYMNODINIALES	6,400	4,000	4,000	6,800	3,000	7,200	800	4,000	36,200
4	<i>Heterocapsa</i> sp.	800	800	800	2,400	600	400	1,200	800	7,800
5	<i>Peridinium quinquecorne</i>	200	400	100	2,400	2,000		800	200	6,100
6	<i>Protoberidinium</i> sp.				1,200	100		400		1,700
7	<i>Scrippsiella</i> sp.	400	800	300	800	200	1,200	400	800	4,900
8	<i>Oxytoxum</i> sp.			200		100				300
9	PERIDINIALES	4,200	22,400	3,100	20,400	2,600	8,000	9,200	4,200	74,100
10	<i>Calciosolenia murrayi</i>	200								200
11	<i>Discosphaera tubifer</i>			100			400			500
12	HAPTOPHYCEAE (Coccolithophorids)	1,600		3,400		3,200	800	800	800	10,600
13	<i>Thalassiosira</i> sp.	400		600	2,400	200	800		1,600	6,000
14	<i>Chaetoceros</i> sp. (<i>Hyalochaete</i>)	400			3,200		4,800	3,200	2,800	14,400
15	<i>Climacosphenia moniligera</i>			100						100
16	<i>Cyclophora tenuis</i>	1,200		200						1,400
17	<i>Licmophora</i> sp.	200		100	400	100	400	400		1,600
18	<i>Thalassionema nitzschioides</i>	400		200		200			400	1,200
19	<i>Amphora</i> sp.	600	800	900	3,200	100	800	2,400	600	9,400
20	<i>Diploneis</i> sp.						400			400
21	<i>Navicula</i> sp.	1,400	400	100	800	400	800	1,200	200	5,300
22	<i>Pleurosigma</i> sp.	200	400			100		400		1,100
23	Naviculaceae		800	200					400	1,400
24	<i>Cylindrotheca closterium</i>	1,600	2,000	300	1,600	400	2,800	800	1,000	10,500
25	<i>Nitzschia longissima</i> var. <i>reversa</i>	200	800	300	2,000	100	800	400	400	5,000
26	<i>Nitzschia</i> sp. (chain formation)	37,200	50,800	23,700	310,400	24,600	490,400	363,200	249,600	1,549,900
27	<i>Nitzschia</i> sp.	400	800	100	2,400	300	1,200	1,200	600	7,000
28	PRASINOPHYCEAE	2,800	6,400	3,200	13,600	2,000	4,800	12,000	2,600	47,400
29	Unknown micro-flagellates	4,600	3,200	5,400	4,000	4,400	800	1,600	1,600	25,600
	種類数	23	17	24	18	22	19	19	19	29
	合 計	72,800	104,000	53,900	402,000	49,900	536,000	406,000	278,000	1,902,600
	沈殿量(mL/L)	0.02	0.04	0.02	0.07	0.02	0.04	0.14	0.03	0.38

注：合計欄の種類数は総種類数を示した。

表-6.2.8 (2) 植物プランクトンの調査結果 (冬季)

調査日：令和2年12月17日

調査法：バンドーン採水器による採水

単 位：細胞/L, *を付した種類は糸状体/L

No.	種名 / 調査地点	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	合計
1	Oscillatoriaceae *			100	50	50				200
2	CRYPTOMONADALES	1,850	2,400	1,550	4,300	1,450	6,200	2,600	2,200	22,550
3	<i>Prorocentrum dentatum</i>		100	50						150
4	<i>Prorocentrum mexicanum</i>			100		50	100	100	100	450
5	<i>Prorocentrum minimum</i>					100			50	150
6	<i>Prorocentrum triestinum</i>							100	50	150
7	GYMNODINIALES	2,000	200	200	3,700	1,100	1,100	600	600	9,500
8	<i>Heterocapsa</i> sp.	400	1,000	200	2,600	700	1,200	2,000	400	8,500
9	<i>Peridinium quinquecorne</i>	50			100		900		50	1,100
10	<i>Protoberidinium</i> sp.	50						100		150
11	<i>Scrippsiella</i> sp.					50				50
12	<i>Ceratium teres</i>					50				50
13	<i>Oxytoxum</i> sp.	200		50	100	200				550
14	PERIDINIALES	750	1,900	350	19,200	500	8,200	2,500	1,350	34,750
15	<i>Discosphaera tubifer</i>	200			100			200		500
16	HAPTOPHYCEAE (Coccolithophorids)	3,800	200	350	1,000	2,150	200	1,000	300	9,000
17	<i>Dictyocha fibula</i>	50						100		150
18	<i>Skeletonema costatum</i>	200								200
19	<i>Thalassiosira</i> sp.	1,050	700	750	800	650	1,000	1,400	850	7,200
20	Thalassiosiraceae			300			300		100	700
21	<i>Leptocylindrus danicus</i>			100		100		300		500
22	<i>Leptocylindrus mediterraneus</i>	400					200			600
23	<i>Asteromphalus sarcophagus</i>					50				50
24	<i>Rhizosolenia fragilissima</i>	150							200	350
25	<i>Rhizosolenia phuketensis</i>	100								100
26	<i>Rhizosolenia setigera</i>	50								50
27	<i>Rhizosolenia stolterfothii</i>	100		100						200
28	<i>Bacteriastrum</i> sp.	500	400	100						1,000
29	<i>Chaetoceros curvisetum</i>	100								100
30	<i>Chaetoceros dadayi</i>	150				100				250
31	<i>Chaetoceros debile</i>	200				150				350
32	<i>Chaetoceros lauderi</i>	100		200						300
33	<i>Chaetoceros lorenzianum</i>	100								100
34	<i>Chaetoceros pendulum</i>	50								50
35	<i>Chaetoceros subsecundum</i>					100				100
36	<i>Chaetoceros</i> sp. (<i>Hyalochaete</i>)	500								500
37	<i>Asterionella notata</i>				200		200			400
38	<i>Licmophora</i> sp.	100		200	500	100	300	200		1,400
39	<i>Microtabella interrupta</i>	50		50						100
40	<i>Neodelphineis pelagica</i>	100				100	400		100	700
41	<i>Thalassionema nitzschioides</i>	200	200		200	200		200		1,000
42	Diatomaceae						100	300		400
43	<i>Amphora</i> sp.	100	100	550	1,600	50	300	800	150	3,650
44	<i>Diploneis</i> sp.	50		50		50	100	100		350
45	<i>Mastogloia</i> sp.	50		100	200				50	400
46	<i>Navicula</i> sp.	50	300	700	4,300	100	400	2,200	200	8,250
47	<i>Pleurosigma</i> sp.		100	100		50	200	400		850
48	Naviculaceae	150	200	100	400	50		200	100	1,200
49	<i>Bacillaria paxillifer</i>				2,400		800	600		3,800
50	<i>Cylindrotheca closterium</i>	450	500	1,550	4,700	200	900	1,700	550	10,550
51	<i>Nitzschia longissima</i>		50	50	50			50		200
52	<i>Nitzschia longissima</i> var. <i>reversa</i>			100	300			500	100	1,000
53	<i>Nitzschia</i> sp. (chain formation)	900	600	300	1,000	550	700	300	400	4,750
54	<i>Nitzschia</i> sp.	150	800	800	1,300	250	600	1,400	250	5,550
55	EUGLENOPHYCEAE		200			50	100			350
56	PRASINOPHYCEAE	1,350	1,800	500	10,800	2,050	3,300	3,400	1,350	24,550
57	Unknown micro-flagellates	1,950		100	1,800	450	700	400	150	5,550
	種類数	39	19	30	25	31	25	28	23	57
	合 計	18,750	11,750	9,750	61,700	11,800	28,500	23,750	9,650	175,650
	沈殿量(mL/L)	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.11

注：合計欄の種類数は総種類数を示した。

(2) 動物プランクトン

1) 調査概要

満潮時付近に、北原式定量ネットを用いて、各地点で海底上 1m から海面まで鉛直曳きし、採集したネット内の残渣をホルマリン固定した試料について、種の同定、個体数の計数、沈殿量の計測を行った。調査は「海洋調査技術マニュアル」((社)海洋調査協会)等に基づいて行った。

2) 調査結果

動物プランクトンの調査結果概要は表ー 6. 2. 9 に、出現種一覧は表ー6. 2. 10 に、調査結果は表ー6. 2. 11 に示すとおりである。

(ア) 夏季

ア) 種構成

採集された動物プランクトンは軟体動物門 4 種類、節足動物門 36 種類（うちカイアシ目 29 種類）、原索動物門 6 種類、その他 13 種類の計 59 種類であった。

調査地点別の種類数は 21～33 種類の範囲にあり、St. 7 で最も多く、St. 2 で最も少なかった。

出現種についてみると、カイアシ目のパラカラヌス科やオイトナ科のような内湾、沿岸性の種が多く出現していた。

イ) 個体数

調査地点別の個体数は、3,900～55,697 個体/m³（平均：21,827 個体/m³）の範囲にあり、St. 4 で最も多く、St. 1 で最も少なかった。

主な出現種は節足動物門甲殻綱のカイアシ目のノープリウス期幼生ノープリウス オブ
コペポダ(nauplius of COPEPODA)や沿岸性小型カイアシ類のオイトナ*Oithona* sp. であり、それぞれ全地点の合計個体数の 58.4%、15.5%を占めた。

(イ) 冬季

ア) 種構成

採集された動物プランクトンは軟体動物門 3 種類、節足動物門 52 種類（うちカイアシ目 46 種類）、原索動物門 3 種類、その他 4 種類の計 62 種類であった。調査地点別の種類数は 16～36 種類の範囲にあり、St. 6 及び St. 7 で多く、St. 4 で最も少なかった。

出現種についてみると、カイアシ目のパラカラヌス科やオイトナ科のような内湾、沿岸性の種が多く出現していた。

イ) 個体数

調査地点別の個体数は、462～40,798 個体/m³（平均：11,914 個体/m³）の範囲にあり、St.4 で最も多く、St.2 で最も少なかった。

主な出現種は節足動物門甲殻綱のカイアシ目のノープリウス期幼生ノープリウス オブ
コペポダ (nauplius of COPEPODA) や *Oithona* sp. オイトナ であり、それぞれ全地点の合計個体数の 53.0%、10.6% を占めた。

表ー 6.2.9 (1) 動物プランクトンの調査結果概要 (夏季)

調査日：令和2年7月23日

調査法：北原式定量ネットによる鉛直曳き

項目	調査地点	1	2	3	4	5
沈殿量 (mL/m ³)		0.82	10.44	0.45	2.03	0.27
種類数	軟体動物門	4	3	4	3	3
	節足動物門	18	13	17	15	13
	原索動物	4	3	3	2	5
	その他	5	2	7	5	4
	合計	31	21	31	25	25
個体数 (個体/m ³)	軟体動物門	192	1,457	444	3,688	664
	節足動物門	2,741	46,479	4,720	46,631	3,166
	原索動物	821	485	143	126	46
	その他	146	2,427	2,525	5,252	123
	合計	3,900	50,848	7,832	55,697	3,999
個体数 組成比 (%)	軟体動物門	4.9%	2.9%	5.7%	6.6%	16.6%
	節足動物門	70.3%	91.4%	60.3%	83.7%	79.2%
	原索動物	21.1%	1.0%	1.8%	0.2%	1.2%
	その他	3.7%	4.8%	32.2%	9.4%	3.1%
主な出現種と個体数 (個体/m ³) ()内は組成比率 (%)		<i>Oithona</i> sp. 484(12.4%) <i>Fritillaria</i> sp. 680(17.4%) nauplius of COPEPODA 1,719(44.1%)	<i>Oithona</i> sp. 9,345(18.4%) nauplius of COPEPODA 29,005(57.0%)	egg of UNIDENTIFIED ANIMAL 2,281(29.1%) nauplius of COPEPODA 3,450(44.1%)	<i>Oithona</i> sp. 10,563(19.0%) nauplius of COPEPODA 33,188(59.6%)	<i>Oithona</i> sp. 513(12.8%) veliger of GASTROPODA 619(15.5%) nauplius of COPEPODA 2,199(55.0%)

項目	調査地点	6	7	8	平均
沈殿量 (mL/m ³)		0.75	0.25	1.59	2.08
種類数	軟体動物門	3	4	3	4
	節足動物門	17	17	15	36
	原索動物	5	6	5	6
	その他	4	6	3	13
	合計	29	33	26	59
個体数 (個体/m ³)	軟体動物門	3,663	1,426	1,960	1,687
	節足動物門	12,619	10,352	17,983	18,086
	原索動物	589	245	340	349
	その他	1,177	876	1,108	1,704
	合計	18,048	12,899	21,391	21,827
個体数 組成比 (%)	軟体動物門	20.3%	11.1%	9.2%	7.7%
	節足動物門	69.9%	80.3%	84.1%	82.9%
	原索動物	3.3%	1.9%	1.6%	1.6%
	その他	6.5%	6.8%	5.2%	7.8%
主な出現種と個体数 (個体/m ³) ()内は組成比率 (%)		umbo larva of BIVALVIA 2,375(13.2%) nauplius of COPEPODA 10,138(56.2%)	nauplius of COPEPODA 9,025(70.0%)	<i>Oithona</i> sp. 3,125(14.6%) nauplius of COPEPODA 13,239(61.9%)	<i>Oithona</i> sp. 3,379(15.5%) nauplius of COPEPODA 12,745(58.4%)

注1：主な出現種は各調査地点での上位5種(ただし、組成比が10%以上)を示した。

2：平均欄の種類数は総種類数を示した。

表ー 6.2.9 (2) 動物プランクトンの調査結果概要 (冬季)

調査日：令和2年12月17日

調査法：北原式定量ネットによる鉛直曳き

項目	調査地点	1	2	3	4	5
沈殿量 (mL/m ³)		0.17	0.15	15.33	3.33	0.42
種類数	軟体動物門	3	2	1	2	1
	節足動物門	23	15	20	11	29
	原索動物	3	1	0	1	2
	その他	2	3	3	2	2
	合計	31	21	24	16	34
個体数 (個体/m ³)	軟体動物門	18	51	2,000	933	134
	節足動物門	677	386	12,067	39,466	4,131
	原索動物	34	5	0	133	67
	その他	34	20	3,466	266	112
	合計	763	462	17,533	40,798	4,444
個体数 組成比 (%)	軟体動物門	2.4%	11.0%	11.4%	2.3%	3.0%
	節足動物門	88.7%	83.5%	68.8%	96.7%	93.0%
	原索動物	4.5%	1.1%	0.0%	0.3%	1.5%
	その他	4.5%	4.3%	19.8%	0.7%	2.5%
主な出現種と個体数 (個体/m ³) ()内は組成比率 (%)		<i>Oithona</i> sp. 78(10.2%) <i>Oncaea</i> sp. 78(10.2%) nauplius of COPEPODA 140(18.3%)	HARPACTICOIDA 46(10.0%) nauplius of COPEPODA 194(42.0%)	veliger of GASTROPODA 2,000(11.4%) nectochaeta of POLYCHAETA 3,000(17.1%)	nauplius of COPEPODA 32,000(78.4%)	<i>Oithona</i> sp. 804(18.1%) nauplius of COPEPODA 982(22.1%)

項目	調査地点	6	7	8	平均
沈殿量 (mL/m ³)		1.13	0.58	0.60	2.71
種類数	軟体動物門	1	1	2	3
	節足動物門	33	30	27	52
	原索動物	0	2	0	3
	その他	2	3	1	4
	合計	36	36	30	62
個体数 (個体/m ³)	軟体動物門	300	150	149	467
	節足動物門	14,150	6,810	9,053	10,843
	原索動物	0	200	0	55
	その他	150	200	149	550
	合計	14,600	7,360	9,351	11,914
個体数 組成比 (%)	軟体動物門	2.1%	2.0%	1.6%	3.9%
	節足動物門	96.9%	92.5%	96.8%	91.0%
	原索動物	0.0%	2.7%	0.0%	0.5%
	その他	1.0%	2.7%	1.6%	4.6%
主な出現種と個体数 (個体/m ³) ()内は組成比率 (%)		<i>Oncaea</i> sp. 1,900(13.0%) nauplius of COPEPODA 7,600(52.1%)	<i>Oithona</i> sp. 950(12.9%) nauplius of COPEPODA 3,200(43.5%)	<i>Oithona</i> sp. 2,143(22.9%) nauplius of COPEPODA 4,702(50.3%)	<i>Oithona</i> sp. 1,260(10.6%) nauplius of COPEPODA 6,311(53.0%)

注1：主な出現種は各調査地点での上位5種(ただし、組成比が10%以上)を示した。

2：平均欄の種類数は総種類数を示した。

表-6.2.10 (1) 動物プランクトンの出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月23日

冬季：令和2年12月17日

調査法：北原式定量ネットによる鉛直曳き

凡 例：○＝出現

No.	門	綱	目	科	学名	和名	調査季	
							夏季	冬季
1	肉質鞭毛虫	顆粒性網状鞭毛虫	有孔虫	タマハリガイ	Globigerinidae	タマハリガイ科	○	
2				—	FORAMINIFERIDA	有孔虫目		○
3		濃彩	—	—	PHAEODAREA	濃彩綱	○	
4		—	—	—	ACTINOPODEA	軸足虫上綱	○	
5	繊毛虫	多膜	少毛	カンリカムシ	<i>Favella azorica</i>		○	
6					<i>Favella ehrenbergii</i>		○	
7	刺胞動物	ヒトロムシ	クダクダケ	—	SIPHONOPHORAE	クダクダケ目	○	
8				—	HYDROZOA	ヒトロムシ綱	○	○
9	軟体動物	マキガイ	カマガイ	カマガイ	<i>Creseis</i> sp.		○	○
10					veliger of GASTROPODA	マキガイ綱のヴェリジャー幼生	○	○
11		ニマイガイ	—	—	D shaped larva of BIVALVIA	ニマイガイ綱のD型幼生	○	
12			—	—	umbo larva of BIVALVIA	ニマイガイ綱の殻頂期幼生	○	○
13	環形動物	ゴカイ	—	—	trochophora of POLYCHAETA	ゴカイ綱のトロコフォラ幼生	○	
14			—	—	nectochaeta of POLYCHAETA	ゴカイ綱のネクトキータ幼生	○	○
15	節足動物	甲殻	カイシ	—	OSTRACODA	カイシ目	○	
16				カイアシ	カラヌス	<i>Cosmocalanus darwini</i>		○
17						<i>Nannocalanus minor</i>		○
18					Calanidae	カラヌス科	○	○
19				ユウカラヌス	<i>Mecynocera clausi</i>		○	○
20				ハラカラヌス	<i>Acrocalanus similis</i>			○
21					<i>Acrocalanus</i> sp.		○	○
22					<i>Delius nudus</i>			○
23					<i>Paracalanus crassirostris</i>		○	○
24					<i>Paracalanus parvus</i>		○	
25					<i>Paracalanus</i> sp.		○	○
26					Paracalanidae	ハラカラヌス科		○
27				グセウドカラヌス	<i>Clausocalanus furcatus</i>		○	○
28					<i>Clausocalanus minor</i>			○
29					<i>Clausocalanus pergens</i>			○
30					<i>Clausocalanus</i> sp.		○	○
31				カロカラヌス	<i>Calocalanus plumulosus</i>		○	○
32					<i>Calocalanus</i> sp.		○	○
33				ユウケータ	Euchaetidae	ユウケータ科		○
34				セントロパゲス	<i>Centropages</i> sp.		○	
35				グセウドテニアプトムス	<i>Pseudodiaptomus</i> sp.			○
36				ポンテラ	Pontellidae	ポンテラ科		○
37				アカルティア	<i>Acartia fossae</i>		○	○
38					<i>Acartia</i> sp.		○	○
39			オイトナ		<i>Oithona aruensis</i>		○	○
40					<i>Oithona attenuata</i>		○	○
41					<i>Oithona nana</i>		○	○
42					<i>Oithona oculata</i>		○	○
43					<i>Oithona plumifera</i>			○
44					<i>Oithona rigida</i>		○	
45					<i>Oithona simplex</i>		○	○
46					<i>Oithona tenuis</i>			○
47					<i>Oithona</i> sp.		○	○
48					<i>Paroithona pulla</i>			○
49			オンケア		<i>Lubbockia squillimana</i>			○
50					<i>Oncaea conifera</i>			○
51					<i>Oncaea media</i>			○
52					<i>Oncaea scottodicarloi</i>			○
53					<i>Oncaea venusta</i>			○
54					<i>Oncaea</i> sp.		○	○
55			クラウス		<i>Hemicyclops</i> sp.		○	
56			コリケウス		<i>Corycaeus agilis</i>			○
57					<i>Corycaeus speciosus</i>			○
58					<i>Corycaeus</i> sp.		○	○
59					<i>Farranula gibbula</i>			○
60			—	—	CYCLOPOIDA	キクロプス亜目		○

表－6.2.10 (2) 動物プランクトンの出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月23日

冬季：令和2年12月17日

調査法：北原式定量ネットによる鉛直曳き

凡 例：○＝出現

No.	門	綱	目	科	学名	和名	調査季	
							夏季	冬季
61	節足動物	甲殻	カイアシ	エクトイソマ	<i>Microsetella norvegica</i>		○	○
62					<i>Microsetella rosea</i>			○
63				タキティウス	<i>Euterpina acutifrons</i>		○	
64				ヨコミシノコ	Tegastidae	ヨコミシノコ科	○	
65				－	HARPACTICOIDA	ハルパクチス亜目	○	○
66				モンストリラ	Monstrillidae	モンストリラ科	○	○
67				－	nauplius of COPEPODA	カイアシ目のナプリアス幼生	○	○
68			フシヅホ	－	nauplius of CIRRIPIEDIA	フシヅホ 亜目のナプリアス幼生	○	○
69				－	nauplius-y of FACETOTECTA	ハセノカリス亜目のナプリアス幼生	○	○
70			ワラジノムシ	－	ISOPODA	ワラジノムシ目	○	○
71			エビ	ユメエビ	zoea of <i>Lucifer</i> sp.	ユメエビ 属のゾエア幼生	○	
72				－	zoea of CARIDEA	コエビ 亜目のゾエア幼生	○	○
73				－	zoea of ANOMURA	ヤトカリ亜目のゾエア幼生		○
74				－	zoea of BRACHYURA	カニ亜目のゾエア幼生	○	○
75	触手動物	コケムシ	－	－	cyphonautes of BRYOZOA	コケムシ綱のキフォノテス幼生	○	
76	毛顎動物	ヤムシ	ヤムシ	サジノツタ	<i>Sagitta</i> sp.		○	○
77	原索動物	ホヤ	－	－	appendicularia of ASCIDIACEA	ホヤ綱のアペンディキュリア幼生	○	
78		オタマホギ	オタマホギ	オイコブ レウラ	<i>Oikopleura dioica</i>		○	
79					<i>Oikopleura longicauda</i>		○	○
80					<i>Oikopleura</i> sp.		○	○
81							○	
82			フリテイリア		<i>Appendicularia sicula</i>		○	
83					<i>Fritillaria</i> sp.		○	
84	脊椎動物	硬骨魚	－	－	egg of OSTEICHTHYES	硬骨魚綱の卵	○	
85	－	－	－	－	egg of UNIDENTIFIED ANIMAL	不明動物の卵	○	
出現種類数							59	62

表-6.2.11 (1) 動物プランクトンの調査結果 (夏季)

調査日：令和2年 7月23日

調査法：北原式定量ネットによる鉛直曳き

単 位：個体/m³

No.	学名／調査地点	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	合計
1	Globigerinidae	5		38	63	6			28	140
2	PHAEODAREA					6				6
3	ACTINOPODEA			6						6
4	<i>Favella azorica</i>							6		6
5	<i>Favella ehrenbergii</i>		1,092	6	250			19		1,367
6	SIPHONOPHORAE							13		13
7	HYDROZOA	35		6	63	11	63	25	57	260
8	<i>Creseis</i> sp.	15		19			63	25	28	150
9	veliger of GASTROPODA	96	364	144	375	619	1,225	263	369	3,455
10	D shaped larva of BIVALVIA	10	243	75	125	6		19		478
11	umbo larva of BIVALVIA	71	850	206	3,188	39	2,375	1,119	1,563	9,411
12	trochophora of POLYCHAETA				3,688					3,688
13	nectochaeta of POLYCHAETA	81	1,335	175	1,188	100	1,088	800	1,023	5,790
14	OSTRACODA		121	19	63			6		209
15	Calanidae	5								5
16	<i>Mecynocera clausi</i>				63					63
17	<i>Acrocalanus</i> sp.	5								5
18	<i>Paracalanus crassirostris</i>	5						6		11
19	<i>Paracalanus parvus</i>	10		13						23
20	<i>Paracalanus</i> sp.	20	364	56	188	6	88	25	114	861
21	<i>Clausocalanus furcatus</i>		121		63					184
22	<i>Clausocalanus</i> sp.		485	38	63		63	19		668
23	<i>Calocalanus plumulosus</i>	5								5
24	<i>Calocalanus</i> sp.						13	6	28	47
25	<i>Centropages</i> sp.					6	13	13	28	60
26	<i>Acartia fossae</i>			6						6
27	<i>Acartia</i> sp.	71	3,762	138	1,375	39	188	31	369	5,973
28	<i>Oithona aruensis</i>			6						6
29	<i>Oithona attenuata</i>	5								5
30	<i>Oithona nana</i>	10		6			13			29
31	<i>Oithona oculata</i>				125					125
32	<i>Oithona rigida</i>		364							364
33	<i>Oithona simplex</i>	10								10
34	<i>Oithona</i> sp.	484	9,345	675	10,563	513	1,325	1,000	3,125	27,030
35	<i>Oncaea</i> sp.	35		6		11	13	13	57	135
36	<i>Hemicyclops</i> sp.	10	364		500	6			57	937
37	<i>Corycaeus</i> sp.	60		44		6	100	25	57	292
38	<i>Microsetella norvegica</i>	10		6	63	6				85
39	<i>Euterpina acutifrons</i>	15		25	63	17	100	75	142	437
40	Tegastidae						13			13
41	HARPACTICOIDA		728	13		22	138	13	85	999
42	Monstrillidae							31	57	88
43	nauplius of COPEPODA	1,719	29,005	3,450	33,188	2,199	10,138	9,025	13,239	101,963
44	nauplius of CIRRIPIEDIA	262	1,578	206	188	329	375	38	114	3,090
45	nauplius-y of FACETOTECTA			13		6				19
46	ISOPODA						13			13
47	zoea of <i>Lucifer</i> sp.		121		63		13			197
48	zoea of CARIDEA							13	170	183
49	zoea of BRACHYURA		121		63		13	13	341	551
50	cyphonautes of BRYOZOA						13			13
51	<i>Sagitta</i> sp.	10		13			13	13		49
52	appendicularia of ASCIDIACEA		121		63	6	13	25	85	313
53	<i>Oikopleura dioica</i>	10				6	63	63	142	284
54	<i>Oikopleura longicauda</i>	5		6		6	100	38	28	183
55	<i>Oikopleura</i> sp.	126	121	31	63	6	225	56	57	685
56	<i>Appendicularia sicula</i>							25		25
57	<i>Fritillaria</i> sp.	680	243	106		22	188	38	28	1,305
58	egg of OSTEICHTHYES	15								15
59	egg of UNIDENTIFIED ANIMAL			2,281						2,281
種類数		31	21	31	25	25	29	33	26	59
合 計		3,900	50,848	7,832	55,697	3,999	18,048	12,899	21,391	174,614
沈殿量 (mL/m ³)		0.82	10.44	0.45	2.03	0.27	0.75	0.25	1.59	16.60

注：合計欄の種類数は総種類数を示した。

表-6.2.11 (2) 動物プランクトンの調査結果 (冬季)

調査日：令和2年12月17日

調査法：北原式定量ネットによる鉛直曳き

単 位：個体/m³

No.	種名 / 調査地点	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	合計
1	FORAMINIFERIDA	28	5	333	133					499
2	HYDROZOA		5					50		55
3	<i>Creseis</i> sp.	6								6
4	veliger of GASTROPODA	6	41	2,000	400	134	300	150	119	3,150
5	umbo larva of BIVALVIA	6	10		533				30	579
6	nectochaeta of POLYCHAETA	6	10	3,000	133	67	100	100	149	3,565
7	<i>Cosmocalanus darwini</i>						10			10
8	<i>Nannocalanus minor</i>					4	10			14
9	Calanidae	6		67		45	50	10	30	208
10	<i>Mecynocera clausi</i>					22		50		72
11	<i>Acrocalanus similis</i>								30	30
12	<i>Acrocalanus</i> sp.						50	50	30	130
13	<i>Delius nudus</i>	22	10	1,000		134	50	50		1,266
14	<i>Paracalanus crassirostris</i>	11	5					200		216
15	<i>Paracalanus</i> sp.	50	10	333	1,333	424	150	350	30	2,680
16	Paracalanidae	22	5	333	133	179	50	100	30	852
17	<i>Clausocalanus furcatus</i>	6		1,000		22	50	10		1,088
18	<i>Clausocalanus minor</i>			667		22	50	50		789
19	<i>Clausocalanus pergens</i>	6						10	30	46
20	<i>Clausocalanus</i> sp.	56	5	667	133	290	700	100	89	2,040
21	<i>Calocalanus plumulosus</i>	6					10			16
22	<i>Calocalanus</i> sp.	39				89				128
23	Euchaetidae						10			10
24	<i>Pseudodiaptomus</i> sp.								30	30
25	Pontellidae			67				10		77
26	<i>Acartia fossae</i>							50	30	80
27	<i>Acartia</i> sp.						100	200		300
28	<i>Oithona aruensis</i>							50	30	80
29	<i>Oithona attenuata</i>						50			50
30	<i>Oithona nana</i>						50	50		100
31	<i>Oithona oculata</i>				22	50			298	370
32	<i>Oithona plumifera</i>							10		10
33	<i>Oithona simplex</i>	17			267	67	200	150	208	909
34	<i>Oithona tenuis</i>		5					10		15
35	<i>Oithona</i> sp.	78	41	1,333	3,333	804	1,400	950	2,143	10,082
36	<i>Paroithona pulla</i>	11	5			45				61
37	<i>Lubbockia squillimana</i>	6		67						73
38	<i>Oncaea conifera</i>			67		22			60	149
39	<i>Oncaea media</i>	11		333		67	300	50	30	791
40	<i>Oncaea scottodicalloi</i>	11					100			111
41	<i>Oncaea venusta</i>			133						133
42	<i>Oncaea</i> sp.	78		1,667	133	357	1,900	150	89	4,374
43	<i>Corycaeus agilis</i>			333		22	50			405
44	<i>Corycaeus speciosus</i>	6				22				28
45	<i>Corycaeus</i> sp.	33				45	50	50		178
46	<i>Farranula gibbula</i>			333		22	50	50		455
47	CYCLOPOIDA		15		667	22	50	100	30	884
48	<i>Microsetella norvegica</i>	50	5		267	134	250	350	60	1,116
49	<i>Microsetella rosea</i>					45	250	50	30	375
50	HARPACTICOIDA	6	46	667	800	156	250	300	179	2,404
51	Monstrillidae								30	30
52	nauplius of COPEPODA	140	194	1,667	32,000	982	7,600	3,200	4,702	50,485
53	nauplius of CIRRIPIEDIA	6	5	1,000		22	100		30	1,163
54	nauplius-y of FACETOTECTA					22	100		30	152
55	ISOPODA		20	333	400	22			60	835
56	zoea of CARIDEA								30	30
57	zoea of ANOMURA						10			10
58	zoea of BRACHYURA		15				50	50	685	800
59	<i>Sagitta</i> sp.			133		45	50	50		278
60	<i>Oikopleura longicauda</i>	11				45		50		106
61	<i>Oikopleura</i> sp.	17	5		133	22		150		327
62	<i>Thalia</i> sp.	6								6
種類数		31	21	24	16	34	36	36	30	62
合 計		763	462	17,533	40,798	4,444	14,600	7,360	9,351	95,311
沈殿量(mL/m ³)		0.17	0.15	15.33	3.33	0.42	1.13	0.58	0.60	21.71

注：合計欄の種類数は総種類数を示した。

(3) 魚卵

1) 調査概要

船上より MTD ネットを用いて、約 2 ノットで 10 分間、表層水平曳きにより採集し、試料はホルマリンで固定後、種同定し、個体数を計数した。

2) 調査結果

魚卵の調査結果概要は表ー 6.2.12 に、出現種一覧は表ー6.2.13 に、調査結果は表ー 6.2.14 に示すとおりである。

(ア) 夏季

ア) 種構成

採集された魚卵は、ブダイ科等と不明卵 13 タイプの計 15 種類であった。調査地点別の種類数は 3~8 種類の範囲にあり、St.3 で最も多く、St.6 で最も少なかった。

出現種についてみると、分類できる魚卵(ブダイ科など)はいずれも琉球列島沿岸に分布している種類であった。

イ) 個体数

調査地点別の個体数は 13~1,876 個/曳網(平均:435 個/曳網)の範囲にあり、St.5 で最も多く、St.4 で最も少なかった。

主な出現種をみると、単脂球形卵 279(卵径 0.52~0.56mm)、単脂球形卵 278(卵径 0.46~0.48mm)、ブダイ科 1 であり、それぞれ全地点の合計個数の 33.7%、30.3%、20.9%を占めていた。

(イ) 冬季

ア) 種構成

採集された魚卵は、エソ科、ヤガラ属、ブダイ科、不明卵 13 タイプの計 18 種類であった。調査地点別の種類数は 1~14 種類の範囲にあり、St.6 で最も多く、St.4 で最も少なかった。

出現種についてみると、分類できる魚卵(エソ科、ヤガラ属、ブダイ科)はいずれも琉球列島沿岸に分布している種類であった。

イ) 個体数

調査地点別の個体数は 1~3,100 個/曳網(平均:486 個/曳網)の範囲にあり、St.5 で最も多く、St.4 で最も少なかった。

主な出現種は、ブダイ科 1 であり、全地点の合計個数の 79.1%を占めていた。ブダイ科 1 は St.4 を除く全ての地点で確認された。

表－ 6.2.12 (1) 魚卵の調査結果概要 (夏季)

調査日：令和2年7月23日

調査方法：MTDネットによる水平曳き

項目	調査地点	1	2	3
種類数		7	6	8
個数 (個/曳網)		307	552	149
主な出現種と個数 (個/曳網)	フタダイ科 1 45 (14.7%) 単脂球形卵 279 0.52～0.56mm 240 (78.2%)	単脂球形卵 280 0.66～0.70mm 176 (31.9%) 単脂球形卵 279 0.52～0.56mm 368 (66.7%)	単脂球形卵 280 0.66～0.70mm 24 (16.1%) フタダイ科 2 28 (18.8%) 単脂球形卵 279 0.52～0.56mm 80 (53.7%)	
()内は組成比率 (%)				

項目	調査地点	4	5	6
種類数		4	7	3
個数 (個/曳網)		13	1,876	61
主な出現種と個数 (個/曳網)	無脂球形卵 68 0.54～0.58mm 2 (15.4%) 単脂球形卵 283 0.82～0.90mm 2 (15.4%) 単脂球形卵 279 0.52～0.56mm 8 (61.5%)	フタダイ科 1 680 (36.2%) 単脂球形卵 278 0.46～0.48mm 992 (52.9%)	無脂球形卵 68 0.54～0.58mm 12 (19.7%) 単脂球形卵 279 0.52～0.56mm 47 (77.0%)	
()内は組成比率 (%)				

項目	調査地点	7	8	平均
種類数		4	4	15
個数 (個/曳網)		492	30	435
主な出現種と個数 (個/曳網)	単脂球形卵 278 0.46～0.48mm 64 (13.0%) 単脂球形卵 279 0.52～0.56mm 408 (82.9%)	無脂球形卵 68 0.54～0.58mm 5 (16.7%) 単脂球形卵 279 0.52～0.56mm 22 (73.3%)	フタダイ科 1 91 (20.9%) 単脂球形卵 278 0.46～0.48mm 132 (30.3%) 単脂球形卵 279 0.52～0.56mm 147 (33.7%)	
()内は組成比率 (%)				

注1：主な出現種は各調査地点での上位5種(組成比率が10%以上)を示した。

2：不明卵に付した数値は卵径範囲を示した。

3：平均欄の種類数は総種類数を示した。

表－ 6.2.12 (2) 魚卵の調査結果概要 (冬季)

調査日：令和2年12月17日

調査方法：MTDネットによる水平曳き

項目	調査地点	1	2	3
種類数		9	6	9
個数 (個/曳網)		453	25	51
主な出現種と個数 (個/曳網)		アサギイ科 1 286 (63.1%) アサギイ科 2 125 (27.6%)	アサギイ科 1 5 (20.0%) 単脂球形卵 287 5 (20.0%) 単脂球形卵 290 10 (40.0%)	アサギイ科 1 13 (25.5%) 無脂球形卵 72 0.60～0.62mm 9 (17.6%) 単脂球形卵 287 0.62～0.65mm 16 (31.4%) 単脂球形卵 289 0.71～0.78mm 7 (13.7%)
()内は組成比率 (%)				

項目	調査地点	4	5	6
種類数		1	6	14
個数 (個/曳網)		1	3,100	172
主な出現種と個数 (個/曳網)		無脂不整形卵 31 0.49mm×0.56mm 1 (100.0%)	アサギイ科 1 2,689 (86.7%)	アサギイ科 1 41 (23.8%) 単脂球形卵 287 0.62～0.65mm 30 (17.4%) 単脂球形卵 290 0.82～0.84mm 64 (37.2%)
()内は組成比率 (%)				

項目	調査地点	7	8	平均
種類数		6	6	18
個数 (個/曳網)		71	18	486
主な出現種と個数 (個/曳網)		アサギイ科 1 37 (52.1%) 単脂球形卵 288 0.63～0.68mm 17 (23.9%) 単脂球形卵 290 0.82～0.84mm 12 (16.9%)	アサギイ科 1 7 (38.9%) 単脂球形卵 286 0.52～0.57mm 2 (11.1%) 単脂球形卵 288 0.63～0.68mm 3 (16.7%) 単脂球形卵 290 0.82～0.84mm 3 (16.7%) 単脂球形卵 292 1.04～1.10mm 2 (11.1%)	アサギイ科 1 385 (79.1%)
()内は組成比率 (%)				

注1：主な出現種は各調査地点での上位5種(組成比率が10%以上)を示した。

2：不明卵に付した数値は卵径範囲を示した。

3：平均欄の種類数は総種類数を示した。

表－6.2.13 魚卵の出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月23日
 冬季：令和2年12月17日
 調査法：MTDネットによる水平曳き
 凡 例：○＝出現

No.	綱	目	科	学名	和名	卵径	油球数	調査季			
								夏季	冬季		
1	硬骨魚綱	ヒメ目	エソ科	Synodontidae 1	エソ科 1				○		
2				Synodontidae 2	エソ科 2				○		
3			トケウ目	ヤガラ科	<i>Fistularia</i> sp. 1	ヤガラ属 1				○	
4		スズキ目	フグイ科	Scaridae 1	フグイ科 1			○	○		
5				Scaridae 2	フグイ科 2			○	○		
6		-	-	Unidentified warp-egg of n. o. 30	無脂不整球形卵 30	0.72～0.80mm×0.84～0.91mm	0	○			
7				Unidentified warp-egg of n. o. 31	無脂不整球形卵 31	0.49mm×0.56mm	0		○		
8				Unidentified warp-egg of n. o. 32	無脂不整球形卵 32	0.62～0.70mm×0.80～0.84mm	0		○		
9				Unidentified egg of n. o. 68	無脂球形卵 68	0.54～0.58mm	0	○			
10				Unidentified egg of n. o. 69	無脂球形卵 69	0.60～0.66mm	0	○			
11				Unidentified egg of n. o. 70	無脂球形卵 70	0.72～0.79mm	0	○			
12				Unidentified egg of n. o. 71	無脂球形卵 71	1.36mm	0	○			
13				Unidentified egg of n. o. 72	無脂球形卵 72	0.60～0.62mm	0		○		
14				Unidentified egg of s. o. 278	単脂球形卵 278	0.46～0.48mm	1	○			
15				Unidentified egg of s. o. 279	単脂球形卵 279	0.52～0.56mm	1	○			
16				Unidentified egg of s. o. 280	単脂球形卵 280	0.66～0.70mm	1	○			
17				Unidentified egg of s. o. 281	単脂球形卵 281	0.66～0.70mm	1	○			
18				Unidentified egg of s. o. 282	単脂球形卵 282	0.80～0.88mm	1	○			
19				Unidentified egg of s. o. 283	単脂球形卵 283	0.82～0.90mm	1	○			
20				Unidentified egg of s. o. 284	単脂球形卵 284	1.14～1.20mm	1	○			
21				Unidentified egg of s. o. 285	単脂球形卵 285	1.28mm	1	○			
22				Unidentified egg of s. o. 286	単脂球形卵 286	0.52～0.57mm	1		○		
23				Unidentified egg of s. o. 287	単脂球形卵 287	0.62～0.65mm	1		○		
24				Unidentified egg of s. o. 288	単脂球形卵 288	0.63～0.68mm	1		○		
25				Unidentified egg of s. o. 289	単脂球形卵 289	0.71～0.78mm	1		○		
26				Unidentified egg of s. o. 290	単脂球形卵 290	0.82～0.84mm	1		○		
27				Unidentified egg of s. o. 291	単脂球形卵 291	0.96～1.02mm	1		○		
28				Unidentified egg of s. o. 292	単脂球形卵 292	1.04～1.10mm	1		○		
29				Unidentified egg of s. o. 293	単脂球形卵 293	1.31mm	1		○		
30				Unidentified egg of s. o. 294	単脂球形卵 294	1.38～1.40mm	1		○		
31						Unidentified egg of m. o. 61	多脂球形卵 67	0.96～1.00mm	約10		○
出現種類数							15	18			

注：多脂卵の油球数は概数を示す。

表－6.2.14 (1) 魚卵の調査結果 (夏季)

調査日：令和2年7月23日
 調査法：MTDネットによる水平曳き
 単 位：個体/曳網

No.	和名	卵径	油球数	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	合計
1	アダイ科 1			45				680	2			727
2	アダイ科 2			2		28		136				166
3	無脂不整球形卵 30	0.72～0.80mm×0.84～0.91mm	0		3			1		4		8
4	無脂球形卵 68	0.54～0.58mm	0		1	9	2		12		5	29
5	無脂球形卵 69	0.60～0.66mm	0	9								9
6	無脂球形卵 70	0.72～0.79mm	0			1					1	2
7	無脂球形卵 71	1.36mm	0			1						1
8	単脂球形卵 278	0.46～0.48mm	1					992		64		1,056
9	単脂球形卵 279	0.52～0.56mm	1	240	368	80	8		47	408	22	1,173
10	単脂球形卵 280	0.66～0.70mm	1	9	176	24	1	64		16	2	292
11	単脂球形卵 281	0.67～0.70mm	1		3			2				5
12	単脂球形卵 282	0.80～0.88mm	1		1	5						6
13	単脂球形卵 283	0.82～0.90mm	1	1			2					3
14	単脂球形卵 284	1.14～1.20mm	1	1		1						2
15	単脂球形卵 285	1.28mm	1					1				1
種類数				7	6	8	4	7	3	4	4	15
合 計				307	552	149	13	1,876	61	492	30	3,480

表－6.2.14 (2) 魚卵の調査結果 (冬季)

調査日：令和2年12月17日
 調査法：MTDネットによる水平曳き
 単 位：個体/曳網

No.	和名	卵径	油球数	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	合計
1	エソ科 1					1			14			15
2	エソ科 2			2								2
3	サクラ属 1								1			1
4	アダイ科 1			286	5	13		2,689	41	37	7	3,078
5	アダイ科 2			125	2	1		218	5			351
6	無脂不整球形卵 31	0.49mm×0.56mm	0			1	1					2
7	無脂不整球形卵 32	0.62～0.70mm×0.80～0.84mm	0		1				4	1	1	7
8	無脂球形卵 72	0.60～0.62mm	0			9			1			10
9	単脂球形卵 286	0.52～0.57mm	1	1		2				3	2	8
10	単脂球形卵 287	0.62～0.65mm	1	4	5	16		167	30			222
11	単脂球形卵 288	0.63～0.68mm	1							17	3	20
12	単脂球形卵 289	0.71～0.78mm	1	29	2	7		16	1			55
13	単脂球形卵 290	0.82～0.84mm	1		10	1		9	64	12	3	99
14	単脂球形卵 291	0.96～1.02mm	1	3				1	2			6
15	単脂球形卵 292	1.04～1.10mm	1	1					6		2	9
16	単脂球形卵 293	1.31mm	1						1			1
17	単脂球形卵 294	1.38～1.40mm	1	2					1			3
18	多脂球形卵 67	0.96～1.00mm	約10						1	1		2
種類数				9	6	9	1	6	14	6	6	18
合 計				453	25	51	1	3,100	172	71	18	3,891

注：多脂卵の油球数は概数を示す。

(4) 稚仔魚

1) 調査概要

船上より MTD ネットを用いて、約 2 ノットで 10 分間、表層水平曳きにより採集し、試料はホルマリンで固定後、種同定し、個体数を計数した。

2) 調査結果

稚仔魚の調査結果概要は表ー 6. 2. 15 に、出現種一覧は表ー6. 2. 16 に、調査結果は表ー 6. 2. 17 に示すとおりである。

なお、和名に付したタイプ番号は環境影響評価時の現地調査及び過年度の事後調査結果に対応している。

(ア) 夏季

ア) 種構成

採集された稚仔魚は、ヘビギンポ科、イソギンポ科、ハゼ科など計 29 種類であった。調査地点別の種類数は 4～9 種類であり、St. 6 及び St. 7 で最も多く、St. 1 で最も少なかった。

出現種についてみると、琉球列島沿岸及び内湾域に分布している種類が多く、特にハゼ科に属する稚仔魚が多かった。

イ) 個体数

調査地点別の個体数は 4～66 個体/曳網（平均：30 個体/曳網）であり、St. 2 で最も多く、St. 1 で最も少なかった。

主な出現種はハゼ科 10、ハゼ科 63 であり、それぞれ全地点の合計個体数の 27. 7%、37. 6%を占めていた。

(イ) 冬季

ア) 種構成

採集された稚仔魚は、エソ科、ヘビギンポ科、ハゼ科など計 36 種類であった。調査地点別の種類数は 0～15 種類であり、St. 6 で最も多く、St. 1 及び St. 4 では稚仔魚は確認されなかった。

出現種についてみると、琉球列島沿岸及び内湾域に分布している種類が多く、特にハゼ科に属する稚仔魚の種類数が多かった。

イ) 個体数

調査地点別の個体数は 0～25 個体/曳網（平均：9 個体/曳網）であり、St. 5 で最も多く、St. 1 及び St. 4 では稚仔魚は確認されなかった。

主な出現種はハタ科 4、ハゼ科 63 であり、それぞれ全地点の合計個体数の 11.8%、10.3%を占めていた。

表一 6.2.15 (1) 稚仔魚の調査結果概要 (夏季)

調査日：令和2年7月23日
調査方法：MTDネットによる水平曳き

項目 調査地点		1	2	3
種類数		4	8	6
個体数 (個/曳網)		4	66	9
主な出現種と個体数 (個/曳網)	ヒレギンボ科 13		不明孵化仔魚	ヨウジウオ科 1
	4 (25%)		17 (25.8%)	1 (11.1%)
	イソギンボ科 20		ハゼ科 10	イソギンボ科 16
	4 (25%)		39 (59.1%)	1 (11.1%)
	イソギンボ科 21			ネズツボ科 1
	4 (25%)			1 (11.1%)
()内は組成比率 (%)	ハゼ科 57			ハゼ科 59
	4 (25%)			1 (11.1%)
				ハゼ科 63
				4 (44.4%)
			不明孵化仔魚	1 (11.1%)

項目	調査地点	4	5	6
種類数		6	5	9
個数 (個/曳網)		40	5	48
主な出現種と個体数 (個/曳網)	ハゼ科 63	7 (17.5%)	イサギノホ科 4	ハゼ科 4
	ハゼ科 10		1 (20.0%)	10 (20.8%)
			ハゼ科 2	ハゼ科 63
		26 (65.0%)	1 (20.0%)	28 (58.3%)
			ハゼ科 10	
			1 (20.0%)	
()内は組成比率 (%)			ハゼ科 11	
			1 (20.0%)	
		不明孵化仔魚		
			1 (20.0%)	

項目	調査地点	7	8	平均
種類数		9	7	29
個数 (個/曳網)		51	19	30
主な出現種と個体数 (個/曳網)	ハゼ科 63 39 (76.5%)	イダギノボ科 4 4 (21.1%)	ハゼ科 10 8 (27.7%)	
		ハゼ科 63 10 (52.6%)	ハゼ科 63 11 (37.6%)	
()内は組成比率 (%)				

注1：主な出現種は各調査地点での上位5種(組成比率が10%以上、同率含む)を示した。

2: 平均欄の種類数は総種類数を示す。

表－ 6.2.15 (2) 稚仔魚の調査結果概要 (冬季)

調査日：令和2年12月17日

調査方法：MTDネットによる水平曳き

項目	調査地点	1	2	3	
種類数		0	6	2	
個体数 (個/曳網)		0	7	4	
主な出現種と個体数 (個/曳網)	()内は組成比率 (%)	スズメダイ科 1	2 (28.6%)	ハセ科 61	1 (25.0%)
		ハレギンボ科 2	1 (14.3%)	ハセ科 63	3 (75.0%)
		ハレギンボ科 3	1 (14.3%)		
		ハセ科 1	1 (14.3%)		
		ハセ科 4	1 (14.3%)		
		ハセ科 7	1 (14.3%)		

項目	調査地点	4	5	6	
種類数		0	14	15	
個数 (個/曳網)		0	25	23	
主な出現種と個体数 (個/曳網)		ハタカイワシ科 2		ハタ科 4	
			4 (16.0%)		3 (13.0%)
		ハタ科 4		ハセ科 63	
		5 (20.0%)		4 (17.4%)	
()内は組成比率 (%)		ハセ科 11		不明孵化仔魚	
			4 (16.0%)		3 (13.0%)

項目	調査地点	7	8	平均
種類数		6	3	36
個数 (個/曳網)		6	3	9
主な出現種と個体数 (個/曳網)	ヤハヅキエソ		スズメダイ科 1	ハタ科 4
		1 (16.7%)	1 (33.3%)	1 (11.8%)
	エソ科 3		ハセ科 4	ハセ科 63
		1 (16.7%)	1 (33.3%)	1 (10.3%)
	スズメダイ科 1		ハセ科 17	
		1 (16.7%)	1 (33.3%)	
	スズメダイ科 2			
		1 (16.7%)		
	カワハギ科 1			
	1 (16.7%)			
()内は組成比率 (%)				
	不明孵化仔魚			
	1 (16.7%)			

注1：主な出現種は各調査地点での上位5種(組成比率が10%以上、同率含む)を示した。5位が重複する場合は5種以上を記載する場合がある。

2：平均欄の種類数は総種類数を示す。

表-6.2.16 稚仔魚の出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月23日

冬季：令和2年12月17日

調査法：MTDネットによる水平曳き

凡 例：○＝出現

No.	綱	目	科	学名	和名	調査季	
						夏季	冬季
1	硬骨魚	ワニトカゲギス	ギンソハダカ	<i>Vinciguerrria nimbaria</i>	ヤハウギエソ		○
2		ヒメ	エソ	Synodontidae 1	エソ科 1		○
3				Synodontidae 3	エソ科 3		○
4		ハダカイワシ	ハダカイワシ	<i>Lampadena</i> sp. 1	カガミワシ属 1		○
5				<i>Nannobranchium</i> sp. 2	トンカマリハダカ属 2		○
6				Myctophidae 2	ハダカイワシ科 2		○
7				Myctophidae 7	ハダカイワシ科 7		○
8		タラ	サウオ	<i>Bregmaceros</i> sp. 1	サウオ属 1		○
9		トゲウオ	ヨウジウオ	Syngnathinae 4	ヨウジウオ亜科 4	○	
10				Syngnathidae 1	ヨウジウオ科 1	○	
11		スズキ	フサカサゴ	Scorpaenidae 2	フサカサゴ科 2		○
12			ハタ	Serranidae 1	ハタ科 1		○
13				Serranidae 4	ハタ科 4		○
14			タイ	Sparidae 1	タイ科 1		○
15			スズメダイ	Pomacentridae 1	スズメダイ科 1	○	○
16				Pomacentridae 2	スズメダイ科 2		○
17			ベラ	Labridae 1	ベラ科 1	○	
18			トラキス	<i>Parapercis</i> sp. 2	トラキス属 2		○
19			ヘビギンボ	Tripterygiidae 2	ヘビギンボ科 2		○
20				Tripterygiidae 3	ヘビギンボ科 3	○	○
21				Tripterygiidae 7	ヘビギンボ科 7		○
22				Tripterygiidae 13	ヘビギンボ科 13	○	
23			コケギンボ	Chaenopsidae 1	コケギンボ科 1		○
24			イソギンボ	<i>Entomacrodus</i> sp. 1	スジギンボ属 1		○
25				Blenniidae 4	イソギンボ科 4	○	
26				Blenniidae 16	イソギンボ科 16	○	
27				Blenniidae 20	イソギンボ科 20	○	
28				Blenniidae 21	イソギンボ科 21	○	
29			ネズツボ	Callionymidae 1	ネズツボ科 1	○	
30			ハゼ	Gobiidae 1	ハゼ科 1		○
31				Gobiidae 2	ハゼ科 2	○	
32				Gobiidae 4	ハゼ科 4	○	○
33				Gobiidae 6	ハゼ科 6	○	
34				Gobiidae 7	ハゼ科 7	○	○
35				Gobiidae 9	ハゼ科 9	○	
36				Gobiidae 10	ハゼ科 10	○	
37				Gobiidae 11	ハゼ科 11	○	○
38				Gobiidae 12	ハゼ科 12	○	
39				Gobiidae 17	ハゼ科 17		○
40				Gobiidae 37	ハゼ科 37		○
41				Gobiidae 53	ハゼ科 53	○	
42				Gobiidae 57	ハゼ科 57	○	
43				Gobiidae 59	ハゼ科 59	○	
44				Gobiidae 60	ハゼ科 60	○	
45				Gobiidae 61	ハゼ科 61	○	○
46				Gobiidae 63	ハゼ科 63	○	○
47				Gobiidae 64	ハゼ科 64	○	
48			クロタチカマス	Gempylidae 1	クロタチカマス科 1		○
49		フケ	カワハギ	Monacanthidae 1	カワハギ科 1		○
50				Monacanthidae 3	カワハギ科 3		○
51		-	-	Unidentified larvae 151	不明仔魚 151	○	
52				Unidentified larvae 152	不明仔魚 152	○	
53				Unidentified larvae 153	不明仔魚 153		○
54				Unidentified larvae 154	不明仔魚 154		○
55				Unidentified larvae 155	不明仔魚 155		○
56				Unidentified larvae 156	不明仔魚 156		○
57				Unidentified hatch-out larvae	不明孵化仔魚	○	○
出現種類数						29	36

表－6. 2. 17 (1) 稚仔魚の調査結果（夏季）

調査日：令和2年7月23日

調査法：MTDネットによる水平曳き

単 位：個体/曳網

No.	和名	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	合計
1	ヨシノオ科 4							1		1
2	ヨシノオ科 1			1						1
3	スズメダイ科 1		1		1			2		4
4	ハナ科 1		1							1
5	ハナ科 3		2							2
6	ハナ科 13	1								1
7	ハナ科 4				2	1		1	4	8
8	ハナ科 16		1	1						2
9	ハナ科 20	1								1
10	ハナ科 21	1								1
11	ハナ科 1			1						1
12	ハナ科 2					1	1	1	1	4
13	ハナ科 4						10	2	1	13
14	ハナ科 6								1	1
15	ハナ科 7				1					1
16	ハナ科 9							1		1
17	ハナ科 10		39		26	1	1			67
18	ハナ科 11					1				1
19	ハナ科 12						4	1	1	6
20	ハナ科 53							3		3
21	ハナ科 57	1								1
22	ハナ科 59			1			1			2
23	ハナ科 60								1	1
24	ハナ科 61				3		1			4
25	ハナ科 63		3	4	7		28	39	10	91
26	ハナ科 64						1			1
27	不明仔魚 151		2							2
28	不明仔魚 152						1			1
29	不明孵化仔魚		17	1		1				19
種類数		4	8	6	6	5	9	9	7	29
合 計		4	66	9	40	5	48	51	19	242

注：合計欄の種類数は総種類数を示した。

表-6.2.17 (2) 稚仔魚の調査結果 (冬季)

調査日：令和2年12月17日

調査法：MTDネットによる水平曳き

単 位：個体/曳網

No.	和名	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	合計
1	ヤハギエソ						1	1		2
2	エソ科 1					1				1
3	エソ科 3							1		1
4	カミイワシ属 1					1				1
5	トンカリハタカ属 2					1				1
6	ハタカイワシ科 2					4	1			5
7	ハタカイワシ科 7					1				1
8	サウオ属 1						1			1
9	フササコ科 2						1			1
10	ハタ科 1					1				1
11	ハタ科 4					5	3			8
12	タイ科 1					1				1
13	スズメダイ科 1		2					1	1	4
14	スズメダイ科 2							1		1
15	トキス属 2					1	2			3
16	ヒキソコ科 2		1							1
17	ヒキソコ科 3		1							1
18	ヒキソコ科 7					1				1
19	コケソコ科 1					1				1
20	スズソコ属 1						1			1
21	ハセ科 1		1							1
22	ハセ科 4		1						1	2
23	ハセ科 7		1							1
24	ハセ科 11					4				4
25	ハセ科 17								1	1
26	ハセ科 37						1			1
27	ハセ科 61			1						1
28	ハセ科 63			3			4			7
29	クロチカマス科 1					1				1
30	カワハギ科 1							1		1
31	カワハギ科 3						1			1
32	不明仔魚 153						1			1
33	不明仔魚 154						1			1
34	不明仔魚 155						1			1
35	不明仔魚 156						1			1
36	不明孵化仔魚					2	3	1		6
種類数		0	6	2	0	14	15	6	3	36
合 計		0	7	4	0	25	23	6	3	68

(5) 魚類

1) 調査概要

ダイバーが潜水し、5m×5m の範囲及びその周辺において、30 分間の潜水目視観察を行い魚類の出現状況を記録した。個体数については CR 法により定性的に把握した。

注：その周辺とは、周辺を遊泳している魚類も含むことを表している。

2) 調査結果

魚類の調査結果概要は表－ 6. 2. 18 に、調査地点概況は表－6. 2. 19 に、出現種一覧は表－6. 2. 20 に、地点別出現状況は表－6. 2. 21～表－6. 2. 22 に示すとおりである。

なお、和名に付したタイプ番号は環境影響評価時の現地調査及び過年度の事後調査結果に対応している。

(ア) 夏季

夏季調査で確認された魚類は、St. 1～8 の全 8 地点を通じてテンジクダイ科 5 種類、チョウチョウウオ科 10 種類、スズメダイ科 25 種類、ベラ科 20 種類、ブダイ科 6 種類、ハゼ科 23 種類、ニザダイ科 10 種類、その他 57 種類の計 156 種類であった。

地点別には 4～72 種であり、St. 5 で 72 種類と最も多く、次いで St. 1 で 60 種類と多かった。一方、St. 2 で 4 種類と最も少なく、次いで St. 4 及び St. 8 で 7 種類と少なかった。

(イ) 冬季

冬季調査で確認された魚類は、テンジクダイ科 5 種類、チョウチョウウオ科 9 種類、スズメダイ科 23 種類、ベラ科 18 種類、ブダイ科 4 種類、ハゼ科 23 種類、ニザダイ科 8 種類、その他 44 種類の計 134 種類であった。

地点別には 2～67 種であり、St. 5 が最も多く 67 種類、次いで St. 1 の 45 種類であった。一方、St. 2 が最も少なく 2 種類、次いで St. 4 の 3 種類であった。

表－ 6.2.18 (1) 魚類の調査結果概要 (夏季)

調査日: 令和2年7月27, 28, 29日

項目/調査地点		St. 1	St. 2	St. 3	St. 4
出現種類数	テンジクダイ科	1	0	0	0
	チョウチョウウオ科	5	0	1	0
	スズメダイ科	15	0	3	0
	ベラ科	7	0	2	0
	フダイ科	5	0	0	0
	ハゼ科	3	3	6	6
	ニザダイ科	5	0	1	0
	その他	19	1	14	1
	合計	60	4	27	7
主な出現種		ミツボシクロスズメダイ	－	ルリスズメダイ スジブチスズメダイ ミツボシキョウセン アマイゴ アイゴ	－

項目/調査地点		St. 5	St. 6	St. 7	St. 8
出現種類数	テンジクダイ科	2	3	4	0
	チョウチョウウオ科	4	3	4	1
	スズメダイ科	14	5	3	0
	ベラ科	14	5	1	0
	フダイ科	4	3	2	0
	ハゼ科	6	7	11	4
	ニザダイ科	8	4	2	0
	その他	20	26	8	2
	合計	72	56	35	7
主な出現種		フリヒンスズメダイ ササナミハギ	キンセンイシモチ ササムロ ルリスズメダイ アオフダイ属 イトマンクロユリハゼ アマイゴ	ホシハゼ	ケショウハゼ

項目/調査地点		合計
出現種類数	テンジクダイ科	5
	チョウチョウウオ科	10
	スズメダイ科	25
	ベラ科	20
	フダイ科	6
	ハゼ科	23
	ニザダイ科	10
	その他	57
	合計	156
主な出現種		

注1: 主な出現種は20個体以上(cc, c, +) 確認された種を示す。

2: 主な出現種の欄の-は20個体以上(cc, c, +) の種が確認されなかったことを示す。

表－ 6.2.18 (2) 魚類の調査結果概要 (冬季)

調査日: 令和2年12月16, 21, 22日

項目/調査地点		St. 1	St. 2	St. 3	St. 4
出現種類数	テンジクダイ科	1	0	0	0
	チョウチョウ科	3	0	0	0
	スズメダイ科	13	0	3	0
	ベラ科	6	0	2	0
	フダイ科	3	0	0	0
	ハゼ科	4	2	5	3
	ニサダイ科	2	0	0	0
	その他	13	0	8	0
	合計	45	2	18	3
主な出現種		ミツボシクロスズメダイ	-	スジブチスズメダイ ミツボシキューセン	-


項目/調査地点		St. 5	St. 6	St. 7	St. 8
出現種類数	テンジクダイ科	2	3	1	0
	チョウチョウ科	5	1	4	0
	スズメダイ科	14	4	0	0
	ベラ科	12	4	1	0
	フダイ科	4	1	0	0
	ハゼ科	5	8	7	5
	ニサダイ科	7	3	1	0
	その他	18	9	7	1
	合計	67	33	21	6
主な出現種		フイリヒンスズメダイ	キンセンイモチ ルリスズメダイ	-	ケショウハゼ


項目/調査地点		合計
出現種類数	テンジクダイ科	5
	チョウチョウ科	9
	スズメダイ科	23
	ベラ科	18
	フダイ科	4
	ハゼ科	23
	ニサダイ科	8
	その他	44
	合計	134
主な出現種		

注1: 主な出現種は20個体以上(cc, c, +)確認された種を示す。

2: 主な出現種の欄の-は20個体以上(cc, c, +)の種が確認されなかったことを示す。

表－6. 2. 19 魚類の調査地点概況

	St. 1	St. 2	St. 3
地点 写真			
底質 概況	砂質及び岩盤	砂泥質	砂礫質の藻場

	St. 4	St. 5	St. 6
地点 写真			
底質 概況	砂礫質（サンゴ礫が多い）	砂礫質及び岩	砂礫質（サンゴ礫が多い）


	St. 7	St. 8
地点 写真		
底質 概況	砂泥質	砂泥質

表-6.2.20 (1) 魚類の出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月27, 28, 29日

冬季：令和2年12月16, 21, 22日

凡 例：○＝出現

No.	綱	目	科	学名	和名	調査季	
						夏季	冬季
1	硬骨魚	ウナギ	ウツボ	<i>Gymnothorax thyrsoides</i>	サビウツボ		○
2		ヒメ	エソ	<i>Synodus</i> sp.	アカエソ属	○	
3		キンメダイ	イットウダイ	<i>Sargocentron spiniferum</i>	トカリエビス	○	○
4				<i>Neoniphon sammara</i>	ウケウチイットウダイ	○	○
5				<i>Myripristis violacea</i>	セグロマウカサ	○	○
6				<i>Myripristis</i> sp.	アカマウカサ属	○	○
7		トゲウオ	ヘラヤガラ	<i>Aulostomus chinensis</i>	ヘラヤガラ	○	○
8		スズキ	ハタ	<i>Epinephelus cyanopodus</i>	ツチホセリ		○
9				<i>Epinephelus merra</i>	カンモンハタ	○	○
10			メギス	<i>Labracinus cyclophthalmus</i>	メギス	○	○
11				<i>Pictichromis porphyreus</i>	クレナイニセスズメ	○	
12			タナバタウオ	<i>Assessor randalli</i>	ツバメタナバタウオ	○	
13			テンジクダイ	<i>Cheilodipterus quinquelineatus</i>	ヤライイシモチ	○	○
14				<i>Cheilodipterus macrodon</i>	リュウキュウヤライイシモチ	○	○
15				<i>Apogon properuptus</i>	キンセンイシモチ	○	○
16				<i>Apogon cookii</i>	スジイシモチ	○	○
17				<i>Apogon ishigakiensis</i>	ミヤコイシモチ	○	○
18			フエダイ	<i>Lutjanus kasmira</i>	ヨスジフエダイ	○	○
19				<i>Lutjanus fulviflamma</i>	ニセクロホシフエダイ	○	○
20				<i>Lutjanus gibbus</i>	ヒメフエダイ	○	○
21				<i>Lutjanus fulvus</i>	オキフエダイ	○	○
22				<i>Aprion virescens</i>	アオチビキ	○	
23			タカサコ	<i>Caesio caeruleaurea</i>	ササムロ	○	
24			イサキ	<i>Diagramma picta</i>	コロダイ		○
25				<i>Plectorhynchus lessonii</i>	ヒレダコロショウダイ	○	○
26			イトヨリダイ	<i>Pentapodus</i> sp.	キツネウオ属	○	
27				<i>Scolopsis ciliata</i>	ハクセンタマカシラ	○	○
28				<i>Scolopsis bilineata</i>	フタスジタマカシラ	○	
29				<i>Scolopsis lineata</i>	ヨコシマタマカシラ	○	○
30			フエキダイ	<i>Gnathodentex aureolineatus</i>	ノコギリダイ		○
31				<i>Monotaxis grandoculis</i>	ヨコシマクロダイ	○	○
32				<i>Gymnocranius</i> sp.	メイチダイ属		○
33				<i>Lethrinus harak</i>	マトフエキ	○	
34				<i>Lethrinus nebulosus</i>	ハマフエキ	○	
35				<i>Lethrinus</i> sp.	フエキダイ属	○	
36			ヒメジ	<i>Mulloidichthys flavolineatus</i>	モンツキアカヒメジ	○	
37				<i>Mulloidichthys vanicolensis</i>	アカヒメジ	○	
38				<i>Parupeneus barberinoides</i>	イントヒメジ	○	
39				<i>Parupeneus barberinus</i>	オオスジヒメジ	○	○
40				<i>Parupeneus indicus</i>	コバンヒメジ	○	○
41				<i>Parupeneus multifasciatus</i>	オジサン	○	○
42				<i>Parupeneus cyclostomus</i>	マルクチヒメジ		○
43				<i>Parupeneus ciliatus</i>	ホウライヒメジ	○	
44		チョウチョウウオ	Heniochus	<i>chrysostomus</i>	ミナミハタテダイ	○	○
45				<i>acuminatus</i>	ハタテダイ	○	○
46				<i>Chaetodon plebeius</i>	スミキトノサマダイ	○	○
47				<i>Chaetodon auriga</i>	トゲチョウチョウウオ	○	○
48				<i>Chaetodon ephippium</i>	セグロチョウチョウウオ	○	○
49				<i>Chaetodon bennetti</i>	ウミウキチョウチョウウオ	○	
50				<i>Chaetodon argentatus</i>	カガミチョウチョウウオ	○	○
51				<i>Chaetodon vagabundus</i>	フウライチョウチョウウオ	○	○
52				<i>Chaetodon lunulatus</i>	ミスジチョウチョウウオ	○	○
53				<i>Chaetodon ulietensis</i>	スターレチョウチョウウオ		○
54				<i>Chaetodon auripes</i>	チョウチョウウオ	○	
55			キンチャクダイ	<i>Pomacanthus semicirculatus</i>	ササナミヤッコ		○
56				<i>Pomacanthus imperator</i>	タテジマキンチャクダイ	○	
57				<i>Pygoplites diacanthus</i>	ニシキヤッコ	○	
58				<i>Centropyge ferrugata</i>	アカハラヤッコ	○	○
59		スズメダイ	Amphiprion	<i>frenatus</i>	ハマクマノミ		○
60				<i>clarkii</i>	クマノミ	○	○

表-6.2.20 (2) 魚類の出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月27, 28, 29日

冬季：令和2年12月16, 21, 22日

凡 例：○＝出現

No.	綱	目	科	学名	和名	調査季	
						夏季	冬季
61	硬骨魚	スズキ	スズキ目	<i>Chromis flavomaculatus</i>	キボシスズメダイ	○	
62				<i>Chromis margaritifer</i>	シロクスズメダイ	○	○
63				<i>Chromis chrysurus</i>	アマミスズメダイ	○	○
64				<i>Dascyllus trimaculatus</i>	ミツボシクロスズメダイ	○	○
65				<i>Dascyllus reticulatus</i>	フタスジリュウキュウスズメダイ	○	○
66				<i>Pomachromis richardsoni</i>	オキナクスズメダイ	○	○
67				<i>Plectroglyphidodon lacrymatus</i>	ルリボシスズメダイ	○	○
68				<i>Abudefduf sexfasciatus</i>	ロクセンスズメダイ	○	○
69				<i>Chrysiptera rex</i>	レモンズズメダイ	○	○
70				<i>Chrysiptera cyanea</i>	ルリスズメダイ	○	○
71				<i>Chrysiptera biocellata</i>	スジフチスズメダイ	○	○
72				<i>Amblyglyphidodon curacao</i>	クラカオスズメダイ	○	○
73				<i>Neoglyphidodon melas</i>	クロスズメダイ	○	○
74				<i>Neoglyphidodon nigroris</i>	ヒレナカスズメダイ	○	○
75				<i>Dischistodus prosopotaenia</i>	ダシダラズズメダイ	○	
76				<i>Pomacentrus philippinus</i>	フィリピンズスズメダイ	○	○
77				<i>Pomacentrus lepidogenys</i>	アサトスズメダイ	○	○
78				<i>Pomacentrus chrysurus</i>	オシロウスズメダイ	○	○
79				<i>Pomacentrus coelestis</i>	ソラスズメダイ	○	
80				<i>Pomacentrus alexanderae</i>	モンツキスズメダイ	○	○
81				<i>Pomacentrus nagasakiensis</i>	ナカサキスズメダイ	○	○
82				<i>Pomacentrus</i> sp.	ミナミイロスズメダイ	○	○
83				<i>Pomacentrus vaiuli</i>	クロムカネスズメダイ	○	○
84				<i>Pomacentrus amboinensis</i>	ニセネグタイスズメダイ	○	○
85			シマイギキ	<i>Terapon jarbua</i>	コトヒキ	○	
86			イスズミ	<i>Kyphosus</i> sp.	イスズミ属	○	○
87			ベラ	<i>Bodianus axillaris</i>	スミツキベラ	○	○
88				<i>Gomphosus varius</i>	クギベラ	○	○
89				<i>Hemigymnus melapterus</i>	クレクベラ		○
90				<i>Hemigymnus fasciatus</i>	シマクレクベラ	○	○
91				<i>Labroides dimidiatus</i>	ホンソメワケベラ	○	○
92				<i>Labroides bicolor</i>	ソメワケベラ	○	○
93				<i>Stethojulis strigiventer</i>	ハラスジベラ	○	○
94				<i>Stethojulis bandanensis</i>	アカオビベラ	○	○
95				<i>Thalassoma hardwicke</i>	セナスジベラ	○	
96				<i>Thalassoma lutescens</i>	ヤマブキベラ	○	○
97				<i>Thalassoma quinquevittatum</i>	ハコベラ	○	
98				<i>Halichoeres trimaculatus</i>	ミツボシキョウセン	○	○
99				<i>Halichoeres melanochir</i>	ムナデンベラ	○	○
100				<i>Halichoeres marginatus</i>	カノコベラ	○	○
101				<i>Halichoeres melanurus</i>	カサリキョウセン	○	○
102				<i>Coris aygula</i>	カンムリベラ	○	○
103				<i>Coris batuensis</i>	シチセンムスベラ	○	○
104				<i>Epibulus insidiator</i>	ギチベラ	○	○
105				<i>Cheilinus chlorourus</i>	アカデンモチノウオ	○	
106				<i>Cheilinus fasciatus</i>	ヤシキベラ	○	
107				<i>Oxycheilinus unifasciatus</i>	ヒトスジモチノウオ	○	○
108				<i>Oxycheilinus digramma</i>	ホホスジモチノウオ		○
109			フグダイ	<i>Chlorurus sordidus</i>	ハゲフグダイ	○	○
110				<i>Chlorurus microrhinos</i>	ナニヨウフグダイ	○	
111				<i>Scarus schlegelii</i>	オビフグダイ	○	○
112				<i>Scarus forsteni</i>	イチモンジフグダイ	○	○
113				<i>Scarus ghobban</i>	ヒフグダイ	○	
114				<i>Scarus</i> sp.	アオフグダイ属	○	○
115			トラギス	<i>Parapercis pacifica</i>	オグロトラギス	○	○
116				<i>Parapercis cylindrica</i>	ダシダラトラギス	○	○
117			イナギンボ	<i>Cirripectes</i> sp.	タテカミカエルウオ属	○	○
118				<i>Salarias fasciatus</i>	ヤエヤマギンボ	○	○
119				<i>Petroscirtes mitratus</i>	ハタタギンボ	○	
120				<i>Meiacanthus atrodorsalis</i>	オウゴンニシギンボ	○	○

表-6. 2. 20 (3) 魚類の出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月27, 28, 29日

冬季：令和2年12月16, 21, 22日

凡 例：○＝出現

No.	綱	目	科	学名	和名	調査季	
						夏季	冬季
121	硬骨魚	スズキ	イソギンボ	<i>Meiacnathus kamoharai</i>	カモハラギンボ	○	○
122				<i>Plagiotremus tapeinosoma</i>	テンクロスジギンボ	○	
123			ハゼ	<i>Gladiogobius</i> sp.	トゲナガハゼ 属	○	
124				<i>Oplopomus oplopomus</i>	ゲショウハゼ	○	○
125				<i>Oplopomus caninoides</i>	ウスゲショウハゼ		○
126				<i>Asterropteryx semipunctata</i>	ホシハゼ	○	○
127				<i>Gnatholepis cauerensis</i>	カタホシオオモンハゼ	○	○
128				<i>Gnatholepis anjerensis</i>	オオモンハゼ	○	○
129				<i>Amblygobius phalaena</i>	サラサハゼ	○	○
130				<i>Amblygobius</i> sp.	ホホニサラサハゼ	○	○
131				<i>Bathygobius fuscus</i>	クモハゼ	○	○
132				<i>Bathygobius</i> sp.	クモハゼ 属	○	○
133				<i>Waitea</i> sp.	カスリハゼ 属	○	○
134				<i>Yongeichthys nebulosus</i>	ツムギハゼ	○	○
135				<i>Favonigobius</i> sp.	ヒメハゼ 属		○
136				<i>Istigobius decoratus</i>	ホシサリハゼ	○	○
137				<i>Istigobius goldmanni</i>	ヒメカサリハゼ		○
138				<i>Istigobius</i> sp.	クワハゼ 属	○	○
139				<i>Myersina nigrivirgata</i>	クロオビハゼ	○	○
140				<i>Cryptocentrus caeruleomaculatus</i>	タカノハハゼ	○	
141				<i>Cryptocentrus melanopus</i>	オイランハゼ	○	
142				<i>Vanderhorstia</i> sp.	ヤツシハゼ 属	○	○
143				<i>Ctenogobiops aurocingulus</i>	オビシノビハゼ	○	○
144				<i>Ctenogobiops</i> sp.	シノビハゼ 属	○	○
145				<i>Valenciennea longipinnis</i>	サザナミハゼ	○	○
146				<i>Fusigobius inframaculatus</i>	ハタテサンカクハゼ	○	
147				<i>Fusigobius neophytus</i>	サシカクハゼ		○
148				<i>Trimma caudomaculatum</i>	アオキハゼ	○	○
149				<i>Eviota</i> sp.	イノハゼ 属	○	○
150			オオメワラスボ	<i>Gunnellichthys pleurotaenia</i>	オオメワラスボ	○	○
151			クロユリハゼ	<i>Ptereleotris microlepis</i>	イトマンクロユリハゼ	○	○
152			アイコ	<i>Siganus argenteus</i>	ハナアイコ	○	○
153				<i>Siganus spinus</i>	アミアイコ	○	○
154				<i>Siganus fuscescens</i>	アイコ	○	
155				<i>Siganus virgatus</i>	ヒメアイコ	○	
156			ツノダシ	<i>Zanclus cornutus</i>	ツノダシ	○	○
157			ニザダイ	<i>Naso unicornis</i>	テンクハギ	○	○
158				<i>Naso lituratus</i>	ミヨコテンクハギ	○	
159				<i>Zebrasoma veliferum</i>	ヒレナカハギ	○	○
160				<i>Ctenochaetus binotatus</i>	コクテンサザナミハギ	○	○
161				<i>Ctenochaetus striatus</i>	サザナミハギ	○	○
162				<i>Acanthurus nigrofuscus</i>	ナガニサ	○	○
163				<i>Acanthurus lineatus</i>	ニジハギ	○	○
164				<i>Acanthurus olivaceus</i>	モンツキハギ	○	
165				<i>Acanthurus dussumieri</i>	ニセカンランハギ	○	○
166				<i>Acanthurus</i> sp.	クロハギ 属	○	○
167		フグ	モンカヲカワハギ	<i>Balistoides conspicillum</i>	モンカヲカワハギ		○
168				<i>Sufflamen chrysopterum</i>	ツマシロモンカヲ	○	○
169				<i>Rhinecanthus aculeatus</i>	ムラサメモンカヲ	○	○
170			フグ	<i>Canthigaster valentini</i>	シマキンチャクフグ	○	○
171				<i>Arothron manilensis</i>	スジモヨウフグ	○	○
172			ハリセンボン	<i>Diodon holocanthus</i>	ハリセンボン	○	○
出現種類数						156	134

表－6.2.21 (1) 魚類の地点別出現状況（夏季）

調査日：令和2年7月27, 28, 29日

凡 例：rr＝1～5個体；r＝6～20個体

＋＝21～50個体；c＝51～99個体

cc＝100個体以上

No.	和名	調査地点							
		St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8
1	アカエソ属	rr				rr	rr		
2	トカ [°] リエヒ [°] ス					rr			
3	ウケク [°] チイトウダ [°] イ					rr			
4	セク [°] ロマツカサ					r			
5	アカマツカサ属					rr			
6	ヘラヤカ [°] ラ	rr				rr			
7	カンモンハタ	rr				rr	rr		
8	メキ [°] ス	rr				rr	rr		
9	クレナイニセスズ [°] メ	rr							
10	ツバ [°] メタナハ [°] タウオ					rr			
11	ヤライイシモチ					rr	r	rr	
12	リュウキュウヤライイシモチ					rr			
13	キンセンイシモチ	r					c	r	
14	スジ [°] イシモチ						r	rr	
15	ミヤコイシモチ							r	
16	ヨスジ [°] フエタ [°] イ						r		
17	ニセクロホシフエタ [°] イ			r	rr			rr	
18	ヒメフエタ [°] イ						rr		
19	オキフエタ [°] イ					rr		rr	
20	アオチビ [°] キ	rr							
21	ササムロ						c		
22	ヒレク [°] ロコショウダ [°] イ								rr
23	キツネウオ属								rr
24	ハクセンタマカ [°] シラ	rr							
25	フタスジ [°] タマカ [°] シラ			rr			rr		
26	ヨコシマタマカ [°] シラ			r					
27	ヨコシマクロダ [°] イ					rr			
28	マトフエフキ			rr				rr	
29	ハマフエフキ						rr		
30	フエフキダ [°] イ属			rr					
31	モンツキアカヒメシ [°]	r							
32	アカヒメシ [°]					r			
33	イント [°] ヒメシ [°]						rr		
34	オオスジ [°] ヒメシ [°]			rr			rr		
35	コバンヒメシ [°]			rr			rr	rr	
36	オシ [°] サン	rr				rr	rr		
37	ホウライヒメシ [°]	rr					r	rr	
38	ミナミハタテダ [°] イ					rr			
39	ハタテダ [°] イ							rr	rr
40	スミキトノサマダ [°] イ	rr							
41	トク [°] チョウチョウウオ	rr		rr		rr	rr	rr	
42	セク [°] ロチョウチョウウオ							rr	
43	ウミツ [°] キチョウチョウウオ							rr	
44	カカ [°] ミチョウチョウウオ	rr							
45	フウライチョウチョウウオ					rr	rr		
46	ミスジ [°] チョウチョウウオ	rr				rr	rr		
47	チョウチョウウオ	rr							
48	タテシ [°] マキンチャクダ [°] イ	rr							
49	ニシキヤッコ	rr							
50	アカハラヤッコ	rr							
51	クマノミ	rr							
52	キホシスズ [°] メダ [°] イ	r							
53	シコクスズ [°] メダ [°] イ					r			
54	アマミスズ [°] メダ [°] イ	r				rr			
55	ミツホ [°] シクロスズ [°] メダ [°] イ	c							
56	フタスジ [°] リュウキュウスズ [°] メダ [°] イ					rr			
57	オキナワスズ [°] メダ [°] イ					r			
58	ルリホシスズ [°] メダ [°] イ					rr			
59	ロクセンスズ [°] メダ [°] イ	r		r		r	r	rr	
60	レモンスズ [°] メダ [°] イ					r			

表－6. 2. 21 (2) 魚類の地点別出現状況（夏季）

調査日：令和2年7月27, 28, 29日

凡 例：rr＝1～5個体；r＝6～20個体

＋＝21～50個体；c＝51～99個体

cc＝100個体以上

No.	和名	調査地点							
		St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8
61	ルリス ^ス メ ^タ イ			＋			＋		
62	スジ ^ブ チス ^ズ メ ^タ イ			＋					
63	クラカオス ^ズ メ ^タ イ	rr				r			
64	クロス ^ズ メ ^タ イ	rr							
65	ヒレナカ ^ス メ ^タ イ	rr				r			
66	タンタ ^ラ ス ^ズ メ ^タ イ							rr	
67	フィリビ ^ン ス ^ズ メ ^タ イ	r				＋			
68	アサト ^ス メ ^タ イ	rr				rr			
69	オジ ^ロ ス ^ズ メ ^タ イ						r	rr	
70	ツラス ^ズ メ ^タ イ	r							
71	モンツキス ^ズ メ ^タ イ	r							
72	ナカ ^サ キス ^ズ メ ^タ イ	r					rr		
73	ミナミイソス ^ズ メ ^タ イ					r			
74	クロカ ^ネ ス ^ズ メ ^タ イ	rr				r			
75	ニセネッタイス ^ズ メ ^タ イ	r				rr	r		
76	コトヒキ		rr						
77	イス ^ズ ミ属					r			
78	スミキヘ ^ラ					rr			
79	クキ ^ヘ ラ					rr			
80	シマダレクチヘ ^ラ	rr				rr			
81	ボンソメウケヘ ^ラ	rr				rr			
82	ソメウケヘ ^ラ					rr			
83	ハラスジ ^ヘ ラ			r			r	r	
84	アオオビ ^ヘ ラ					rr			
85	セナスシ ^ヘ ラ					rr			
86	ヤマブ ^キ ヘ ^ラ	rr				rr			
87	ハコヘ ^ラ					rr			
88	ミツホ ^シ キュウセン			＋			r		
89	ムナテンヘ ^ラ	rr				rr			
90	カノコヘ ^ラ					rr			
91	カザ ^リ キュウセン						rr		
92	カムリヘ ^ラ					rr			
93	シチセンムスメヘ ^ラ	rr				rr	rr		
94	キ ^チ ヘ ^ラ	rr							
95	アカテンモチノウオ						rr		
96	ギシキヘ ^ラ	rr							
97	ヒトスシ ^モ チノウオ					rr			
98	ハゲ ^ブ タ ^イ	rr				r	r		
99	ナンヨウ ^ブ タ ^イ	rr							
100	オビ ^ブ タ ^イ	rr				r			
101	イチモンシ ^ブ タ ^イ	rr				rr			
102	ヒ ^ブ タ ^イ						rr	rr	
103	アオブ ^タ イ属	r				r	＋	rr	
104	オク ^ロ トラキ ^ス	rr				rr			
105	タンタ ^ラ トラキ ^ス			rr			rr		
106	タテカ ^ミ カエルウオ属					rr			
107	ギエヤマキ ^ン ボ			rr			rr		
108	ハタタテキ ^ン ボ			rr			rr		
109	オウコ ^ン ニシ ^キ ンボ	rr				rr			
110	カモハラキ ^ン ボ	rr				rr			
111	テンクロス ^シ キンボ						rr		
112	トゲ ^ナ ガ ^ハ ゼ ^属							r	
113	ケショウハゼ ^ズ							r	＋
114	ホシハゼ ^ズ				r		r	＋	
115	カタホ ^シ オオモンハゼ ^ズ	rr		rr		rr	rr		
116	オオモンハゼ ^ズ			rr					
117	サラサハゼ ^ズ			rr			rr	r	
118	ホホヘ ^ニ サラサハゼ ^ズ							rr	r
119	クモハゼ ^ズ				r				
120	クモハゼ ^属			rr	rr				

表－6. 2. 21 (3) 魚類の地点別出現状況（夏季）

調査日：令和2年7月27, 28, 29日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上

No.	和名	調査地点							
		St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8
121	カスリハゼ [°] 属		rr					rr	
122	ツムキ [°] ハゼ [°]		rr					r	rr
123	ホシカサ [°] リハゼ [°]					rr			
124	クツワハゼ [°] 属	rr						rr	
125	クロホ [°] ハゼ [°]		rr						rr
126	タカノハハゼ [°]				rr		rr	rr	
127	オイランハゼ [°]							rr	
128	ヤツシハゼ [°] 属				rr				
129	オビ [°] シノビ [°] ハゼ [°]						r	rr	
130	シノビ [°] ハゼ [°] 属				rr	rr	rr		
131	ササ [°] ナミハゼ [°]			r			rr		
132	ハタテサンカクハゼ [°]					rr			
133	アオキ [°] ハゼ [°]					r			
134	イソハゼ [°] 属	r		rr		rr			
135	オオメワラスボ [°]			rr					
136	イトマンクロユリハゼ [°]						+		
137	ハサアイコ [°]						r		
138	アマアイコ [°]			cc			c	r	
139	アイコ [°]			cc			r		
140	ヒメアイコ [°]					rr	rr		
141	ツノダ [°] シ	rr				rr	rr		
142	テンク [°] ハキ [°]					rr			
143	ミヤコテンク [°] ハキ [°]					rr			
144	ヒレナガ [°] ハキ [°]					rr	rr	rr	
145	コクテンササ [°] ナミハキ [°]	rr				rr			
146	ササ [°] ナミハキ [°]	rr				+	rr		
147	ナガ [°] ニサ [°]	r				r	rr		
148	ニシ [°] ハキ [°]					rr			
149	モンツキハキ [°]	rr							
150	ニセカンランハキ [°]	rr				rr	rr		
151	クロハキ [°] 属			rr				rr	
152	ツマシ [°] ロモンカ [°] ラ	rr							
153	ムラサメモンカ [°] ラ			r			rr		
154	シマキンチャクフク [°]	rr					rr		
155	スジ [°] モヨウフク [°]							rr	
156	ハリセンボン						r	rr	
出現種類数		60	4	27	7	72	56	35	7

表－6. 2. 22 (1) 魚類の地点別出現状況（冬季）

調査日：令和2年12月16, 21, 22日

凡 例：rr＝1～5個体；r＝6～20個体

＋＝21～50個体；c＝51～99個体

cc＝100個体以上

No.	和名	調査地点							
		St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8
1	サビウボ							rr	
2	トカリエヒス					rr			
3	ウケチイトウダ					rr			
4	セクマツカサ					r			
5	アカマツカサ属					rr			
6	ハラヤカラ	rr							
7	ツチホセリ	rr							
8	カンモンハタ	rr				rr	rr		
9	メギス					rr			
10	ヤライシモチ					rr	rr		
11	リュウキュウヤライシモチ					rr			
12	キンセンシモチ	r					c		
13	スジシモチ						r		
14	ミヤコシモチ							rr	
15	ヨスシフエタ						r		
16	ニセクロホシフエタ							rr	
17	ヒメフエタ						rr		
18	オキフエタ							rr	
19	コロタ							rr	
20	ヒレクロコショウダ								rr
21	ハクセンタマカシラ	rr						rr	
22	ヨシマタマカシラ			r			rr		
23	ノコギリタ					rr			
24	ヨシマクロタ					rr			
25	メイダ	rr							
26	オオシヒメジ			rr					
27	コバンヒメジ			rr					
28	オジサン	rr				rr			
29	マルクチヒメジ	rr							
30	ミナミハタテタ					rr			
31	ハタテタ							rr	
32	スミツキトノサマタ	rr							
33	トケチョウチョウウオ					rr	rr	rr	
34	セクロチョウチョウウオ							rr	
35	カカミチョウチョウウオ	rr							
36	フウライチョウチョウウオ					rr			
37	ミスジチョウチョウウオ	rr				rr		rr	
38	スターレチョウチョウウオ					rr			
39	サザナミヤッコ					rr			
40	アカハヤッコ	rr							
41	ハマクマノミ	rr							
42	クマノミ	r							
43	シロクサメタ					r			
44	アマミスメタ	r				rr			
45	ミツボシクロサメメタ	+							
46	フタスジリュウキュウスメタ					rr			
47	オキナウスメタ					r			
48	ルリホシウスメタ					rr			
49	ロクセンサメメタ			r		r	r		
50	レモンサメメタ					r			
51	ルリスメタ			r			+		
52	スジフチサメメタ			+					
53	クラカサメメタ	r				r			
54	クロスサメメタ	rr							
55	ヒレナガサメメタ	r				r			
56	フィリピンサメメタ	r				+			
57	アサトサメメタ	rr				rr			
58	オジロサメメタ						r		
59	モンクサメメタ	r							
60	ナガサメメタ	r							

表－6. 2. 22 (2) 魚類の地点別出現状況（冬季）

調査日：令和2年12月16, 21, 22日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+=21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上

No.	和名	調査地点							
		St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8
61	ミナミイソスズメダイ					r			
62	クロメカネスズメダイ	rr				r			
63	ニセネッタイスズメダイ	r				r	r		
64	イスズミ属					r			
65	スミツキヘラ					rr			
66	クキヘラ					rr			
67	タレクチヘラ						rr		
68	シマタレクチヘラ					rr			
69	ホンソメワケヘラ	rr				rr			
70	ソメワケヘラ	rr				rr			
71	ハラスジヘラ			r			r	rr	
72	アカオビヘラ					rr			
73	ヤマフキヘラ					rr			
74	ミツボシキュウセン			+			rr		
75	ムナテンヘラ	rr				rr			
76	カノコヘラ					rr			
77	カサリキュウセン						rr		
78	カンムリヘラ	rr							
79	シチセンムスメヘラ					rr			
80	キチヘラ	rr				rr			
81	ヒトスジモチノウオ					rr			
82	ホホスジモチノウオ	rr							
83	ハゲフダイ	rr				rr	r		
84	オビフダイ	rr				rr			
85	イチモンジフダイ	rr				rr			
86	アオブダイ属					r			
87	オウロトラキス	rr				rr			
88	タンカトラトラキス			rr			rr		
89	タテカミカエルウ属					rr			
90	キエヤマキンボ			rr					
91	オウゴンシキンボ	rr				rr			
92	カモハラキンボ	rr				rr			
93	ケショウハゼ							r	+
94	ウスゲショウハゼ								rr
95	ホシハゼ						r	r	
96	カタボシオオモンハゼ	rr		rr		rr	rr		
97	オオモンハゼ			rr					
98	サラサハゼ						rr	r	
99	ホホニサラサハゼ								r
100	クモハゼ				r				
101	クモハゼ属			rr	rr				
102	カスリハゼ属							rr	rr
103	ツムギハゼ		rr					r	
104	ヒメハゼ属				rr				
105	ホシカサリハゼ	rr				rr	rr		
106	ヒメカサリハゼ	rr					rr		
107	クツリハゼ属							rr	
108	クロオビハゼ		rr						rr
109	ヤツシハゼ属							rr	
110	オビシノビハゼ						rr		
111	シノビハゼ属						rr		
112	ササナミハゼ			rr			rr		
113	サンカクハゼ					rr			
114	アオギハゼ					r			
115	イソハゼ属	r		rr		rr			
116	オオメワラスボ			rr					
117	イトマンクロユリハゼ						r		
118	ハナアイゴ							rr	
119	アミアイゴ			rr					
120	ツノダシ	rr				rr			

表－6. 2. 22 (3) 魚類の地点別出現状況（冬季）

調査日：令和2年12月16, 21, 22日

凡 例：rr＝1～5個体；r＝6～20個体

＋＝21～50個体；c＝51～99個体

cc＝100個体以上

No.	和名	調査地点							
		St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8
121	テンガ [°] ハキ [°]					rr			
122	ヒレナカ [°] ハキ [°]					rr			
123	コクテンササ [°] ナミハキ [°]					rr			
124	ササ [°] ナミハキ [°]	rr				r	rr		
125	ナカ [°] ニサ [°]	rr				r	rr		
126	ニシ [°] ハキ [°]					rr			
127	ニセカンランハキ [°]					rr			
128	クロハキ [°] 属						rr	rr	
129	モンカ [°] ラカワハキ [°]					rr			
130	クマシ [°] ロモンカ [°] ラ	rr				rr			
131	ムラサメモンカ [°] ラ			r			rr		
132	シマキンチャクフク [°]						rr		
133	スシ [°] モヨウフク [°]							rr	
134	ハリセンボ [°] ン						rr		
出現種類数		45	2	18	3	67	33	21	6

(6) 底生動物（マクロベントス）

1) 調査概要

スミス・マッキンタイヤー型採泥器（バケット部 22cm×22cm）を用いて、1 地点当たり 2 回表層泥の採泥を行った。岩礁、サンゴ礁等表面が砂泥質でない場合は、地点近傍あるいは間隙に溜まっている砂泥質を採取した。採取した表層泥は、1mm 目のふるいでこして、ふるい上の生物を試料とし、ホルマリンで固定し、光学顕微鏡を用いて同定・計数を行った。また、干出域においても、同面積（容量）となるように採泥を行った。

調査は「海洋調査技術マニュアル」（（社）海洋調査協会）等に基づいて行った。

2) 調査結果

マクロベントスの調査結果概要は表－6. 2. 23～表－6. 2. 24 に、出現種一覧は表－6. 2. 25 に、地点別出現状況は表－6. 2. 26～表－6. 2. 27 に示すとおりである。

(ア) 夏季

ア) 種構成

採集された底生動物（マクロベントス）の種類数は 6 動物門 82 種類で、環形動物門が 28 種類と最も多く、次いで節足動物門が 26 種類、軟体動物門が 24 種類であった。調査地点別の種類数は 6～22 種類の範囲にあり、St. 6 で最も多く、St. 2 で最も少なかった。

調査地点別の個体数は 12～78 個体/0. 1m²（平均：41 個体/0. 1m²）の範囲にあり、St. 3 で最も多く、St. 5 で最も少なかった。

個体数の動物門別組成比は、全体でみると環形動物門が 40. 7%と最も多かった。

イ) 個体数

個体数組成比からみた主な出現種は、環形動物門のナナテイソメ科が全体の 13. 6%を占めており、St. 3 で 44 個体/0. 1m²と高密度で確認された。

調査地点別の湿重量は 0. 49～11. 56g/0. 1m²（平均：3. 10g/0. 1m²）の範囲にあり、St. 5 で最も多く、St. 1 で最も少なかった。

湿重量の動物門別組成比は、全体でみると軟体動物門が 73. 0%と最も多かった。

ウ) 湿重量

湿重量からみた主な出現種は、軟体動物門のゴマファイモとカワラガイで、それぞれ全体の 39. 7%、13. 4%を占めた。

ゴマファイモは St. 5 で 9. 85g/0. 1m²、カワラガイは St. 6 で 3. 33g/0. 1m²であった。

(イ) 冬季

ア) 種構成

採集された底生動物（マクロベントス）の種類数は 7 動物門 53 種類で、環形動物門が 26 種類と多く、次いで軟体動物門及び節足動物門が 11 種類であった。調査地点別の種類数は 3～15 種類の範囲にあり、St. 4 で最も多く、St. 2 で最も少なかった。

調査地点別の個体数は 4～59 個体/0.1 m²（平均：21 個体/0.1 m²）の範囲にあり、St. 4 で最も多く、St. 2 で最も少なかった。

個体数の動物門別組成比は、全体でみると環形動物門が 53.0%と最も多かった。

イ) 個体数

個体数組成比からみた主な出現種は、刺胞動物門のムシモドキギンチャク科が全体の 9.1%を占めており、St. 4 で 14 個体/0.1 m²とやや高い密度で確認されたものの、全体の 10%以上を占める出現種は確認されなかった。

調査地点別の湿重量は 0.04～13.00g/0.1 m²（平均：2.37g/0.1 m²）の範囲にあり、St. 4 で最も多く、St. 1 及び St. 2 で最も少なかった。

湿重量の動物門別組成比は、全体でみると軟体動物門が 81.8%と最も多かった。

ウ) 湿重量

湿重量からみた主な出現種は、軟体動物門のホソスジイナミガイ、ムシロタケ、サツマビナ、オイノカガミで、それぞれ全体の 45.9%、12.2%、11.3%、10.7%を占めた。ホソスジイナミガイは St. 4 で 8.69g/0.1 m²、ムシロタケは St. 5 で 2.32g/0.1 m²、サツマビナは St. 5 で 2.14g/0.1 m²、オイノカガミは St. 4 で 2.03g/0.1 m²であった。

表－6.2.23 (1) マクロベントスの調査結果概要 (夏季)

調査日：令和2年7月8,9日
調査法：スミス・マッギンタイヤー型採泥器による採泥

項目	調査地点	1	2	3	4	5
種類数	軟体動物門	3	3	2	5	7
	環形動物門	1	2	10	6	2
	節足動物門	9	0	5	5	0
	その他	0	1	1	3	1
	合計	13	6	18	19	10
個体数 (個体／0.1㎡)	軟体動物門	6	9	5	12	9
	環形動物門	1	6	58	10	2
	節足動物門	42	0	13	43	0
	その他	0	1	2	7	1
	合計	49	16	78	72	12
個体数 組成比 (%)	軟体動物門	12.2%	56.3%	6.4%	16.7%	75.0%
	環形動物門	2.0%	37.5%	74.4%	13.9%	16.7%
	節足動物門	85.7%	0.0%	16.7%	59.7%	0.0%
	その他	0.0%	6.3%	2.6%	9.7%	8.3%
	合計	0.49	0.51	1.14	4.99	11.56
湿重量 (g／0.1㎡)	軟体動物門	0.12	0.47	0.03	2.02	11.5
	環形動物門	0.00	0.04	0.92	0.08	0.06
	節足動物門	0.37	0.00	0.15	2.58	0.00
	その他	0.00	0.00	0.04	0.31	0.00
	合計	0.49	0.51	1.14	4.99	11.56
湿重量 組成比 (%)	軟体動物門	24.5%	92.2%	2.6%	40.5%	99.5%
	環形動物門	0.0%	7.8%	80.7%	1.6%	0.5%
	節足動物門	75.5%	0.0%	13.2%	51.7%	0.0%
	その他	0.0%	0.0%	3.5%	6.2%	0.0%
主な出現種と個体数 (個体／0.1㎡) ()内は組成比率 (%)	スガメソコエビ属	19(38.8)	イトコカイ科	ナナテイツメ科	スナホリシモトキ属	サメハダヒサナカイ科
	ヤトカリモトキ亜科	8(16.3)	サクラカイ属	44(56.4)	ウスヒサナカイ科	ミガキヒメサナ
	ヒキシソコエビ科	7(14.3)	シマトリカイ属		8(11.1)	2(16.7)
			4(25)			2(16.7)
			4(25)			
主な出現種と湿重量 (g／0.1㎡) ()内は組成比率 (%)	スガメソコエビ属	0.06(12.2)	サクラカイ属	ナナテイツメ科	ミナミメナカオサカニ	ゴマフイモ
	コメサクラ	0.05(10.2)	シマトリカイ属	0.49(43)	2.26(45.3)	9.85(85.2)
	ゾテカテッパ	0.22(44.9)	0.19(37.3)	ナラウロコムシ科	ヨウラクレイシタマシ	
				0.25(21.9)	1.46(29.3)	

注1：主な出現種は各調査地点での上位5種(ただし、組成比が10%以上)を示した。

表－6.2.23 (2) マクロベントスの調査結果概要 (夏季)

調査日：令和2年7月8,9日

調査法：スミス・マッキンタイヤー型採泥器による採泥

項目	調査地点	6	7	8	平均
種類数	軟体動物門	6	0	1	24
	環形動物門	9	9	5	28
	節足動物門	5	5	1	26
	その他	2	1	2	4
	合計	22	15	9	82
個体数 (個体／0.1㎡)	軟体動物門	9	0	4	7
	環形動物門	14	18	23	17
	節足動物門	7	10	1	15
	その他	5	4	2	3
	合計	35	32	30	41
個体数 組成比 (%)	軟体動物門	25.7%	0.0%	13.3%	16.7%
	環形動物門	40.0%	56.3%	76.7%	40.7%
	節足動物門	20.0%	31.3%	3.3%	35.8%
	その他	14.3%	12.5%	6.7%	6.8%
湿重量 (g／0.1㎡)	軟体動物門	3.88	0.00	0.06	2.26
	環形動物門	0.3	0.26	0.87	0.32
	節足動物門	0.3	0.28	0.05	0.47
	その他	0.04	0.02	0.03	0.06
	合計	4.52	0.56	1.01	3.10
湿重量 組成比 (%)	軟体動物門	85.8%	0.0%	5.9%	73.0%
	環形動物門	6.6%	46.4%	86.1%	10.2%
	節足動物門	6.6%	50.0%	5.0%	15.1%
	その他	0.9%	3.6%	3.0%	1.8%
主な出現種と個体数 (個体／0.1㎡) ()内は組成比率 (%)	サメハカ [°] ヒサ [°] ラカ [°] イ科 4 (11.4)	紐形動物門 4 (12.5)	<i>Terebellides</i> 属 15 (50)	サテイトム科 5.50 (13.6)	
		フサコ [°] カイ科 4 (12.5)	サカラ [°] イ属 4 (13.3)		
		コブ [°] シアナジ [°] ヤコ 4 (12.5)	<i>Sigalion</i> 属 3 (10)		
			<i>Malacoceros</i> 属 3 (10)		
主な出現種と湿重量 (g／0.1㎡) ()内は組成比率 (%)	カラカ [°] イ 3.33 (73.7)	コブ [°] シアナジ [°] ヤコ 0.14 (25)	<i>Terebellides</i> 属 0.5 (49.5)	ゴ [°] マフイ 1.23 (39.7)	
		<i>Glycera</i> 属 0.1 (17.9)	<i>Sigalion</i> 属 0.15 (14.9)	カラカ [°] イ 0.42 (13.4)	
		イトコ [°] カイ科 0.08 (14.3)	<i>Marphysa</i> 属 0.15 (14.9)		
		オサカ [°] ニ属 0.07 (12.5)			

注1：主な出現種は各調査地点での上位5種(ただし、組成比が10%以上)を示した。

2：平均欄の種類数は総種類数を示した。

表－6.2.24 (1) マクロベントスの調査結果概要 (冬季)

調査日：令和2年12月15, 23日
調査法：スミス・マッケンタイヤー型採泥器による採泥

項目	調査地点	1	2	3	4	5
種類数	軟体動物門	0	0	0	3	5
	環形動物門	1	3	6	6	4
	節足動物門	6	0	0	2	0
	その他	0	0	2	4	0
	合計	7	3	8	15	9
個体数 (個体／0.1m ²)	軟体動物門	0	0	0	3	5
	環形動物門	1	4	17	16	4
	節足動物門	10	0	0	13	0
	その他	0	0	5	27	0
	合計	11	4	22	59	9
個体数 組成比 (%)	軟体動物門	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%	55.6%
	環形動物門	9.1%	100.0%	77.3%	27.1%	44.4%
	節足動物門	90.9%	0.0%	0.0%	22.0%	0.0%
	その他	0.0%	0.0%	22.7%	45.8%	0.0%
湿重量 (g／0.1m ²)	軟体動物門	0	0	0	10.74	4.57
	環形動物門	<0.01	0.04	0.17	0.16	0.03
	節足動物門	0.04	0	0	0.6	0
	その他	0	0	0.07	1.5	0
	合計	0.04	0.04	0.24	13	4.6
湿重量 組成比 (%)	軟体動物門	0.0%	0.0%	0.0%	82.6%	99.3%
	環形動物門	0.0%	100.0%	70.8%	1.2%	0.7%
	節足動物門	100.0%	0.0%	0.0%	4.6%	0.0%
	その他	0.0%	0.0%	29.2%	11.5%	0.0%
主な出現種と個体数 (個体／0.1m ²) ()内は組成比率 (%)	ヤト ^キ カリモ ^ト キ亜科 2(18.2)	イトコ ^キ カイ科 2(50.0)	ナナテイソメ科 8(36.4)	ムシモ ^ト キギン ^ン チャク科 14(23.7)	イロアセアシカ ^マ 1(11.1)	
	サンハ ^ツ ソコエビ ^ノ 属 2(18.2)	ナラウロコムシ科 1(25.0)	Aonides属 4(18.2)	メリタヨコエビ ^ノ 科 12(20.3)	サツマビ ^ナ 1(11.1)	
	ヒサシソコエビ ^ノ 科 2(18.2)	Poecilochaetus属 1(25.0)	キ ^ホ シムシ綱 3(13.6)	キ ^ホ シムシ綱 9(15.3)	ムシロカケ 1(11.1)	
	スナモグ ^リ 科 2(18.2)			Armandia属 7(11.9)	コ ^ク ラクミ ^ト リカ ^イ 科 1(11.1)	
					ミクニシホ ^リ サ ^ク ラ 1(11.1)	
					キ ^ホ シイソメ科 1(11.1)	
					Arabella属 1(11.1)	
					Caulleriella属 1(11.1)	
主な出現種と湿重量 (g／0.1m ²) ()内は組成比率 (%)	サンハ ^ツ ソコエビ ^ノ 属 0.01(25.0)	イトコ ^キ カイ科 0.02(50.0)	ナナテイソメ科 0.11(45.8)	ホソシ ^メ イナミカ ^イ 8.69(66.8)	ムシロカケ 2.32(50.4)	
	ヒサシソコエビ ^ノ 科 0.01(25.0)	ナラウロコムシ科 0.01(25.0)	キ ^ホ シムシ綱 0.06(25.0)	オイノカカ ^ミ 2.03(15.6)	サツマビ ^ナ 2.14(46.5)	
	ウシロマエソコエビ ^ノ 属 0.01(25.0)	Poecilochaetus属 0.01(25.0)	イトコ ^キ カイ科 0.03(12.5)	オイノカカ ^ミ 1.38(10.6)		
	スナモグ ^リ 科 0.01(25.0)					

注1：主な出現種は各調査地点での上位5種(ただし、組成比が10%以上)を示した。

表-6.2.24 (2) マクロベントスの調査結果概要 (冬季)

調査日：令和2年12月15,23日

調査法：スミ・マッキンタイ型採泥器による採泥

項目	調査地点	6	7	8	平均
種類数	軟体動物門	2	1	1	11
	環形動物門	9	6	7	26
	節足動物門	1	1	2	11
	その他	0	2	1	5
	合計	12	10	11	53
個体数 (個体／0.1㎡)	軟体動物門	2	3	1	2
	環形動物門	23	9	13	11
	節足動物門	1	1	2	3
	その他	0	3	1	5
	合計	26	16	17	21
個体数 組成比 (%)	軟体動物門	7.7%	18.8%	5.9%	8.5%
	環形動物門	88.5%	56.3%	76.5%	53.0%
	節足動物門	3.8%	6.3%	11.8%	16.5%
	その他	0.0%	18.8%	5.9%	22.0%
	合計				
湿重量 (g／0.1㎡)	軟体動物門	0.11	0.07	<0.01	1.94
	環形動物門	0.20	0.06	0.34	0.14
	節足動物門	0.15	0.04	0.04	0.11
	その他	0.00	0.01	<0.01	0.20
	合計	0.46	0.18	0.38	2.37
湿重量 組成比 (%)	軟体動物門	23.9%	38.9%	0.0%	81.8%
	環形動物門	43.5%	33.3%	89.5%	6.0%
	節足動物門	32.6%	22.2%	10.5%	4.6%
	その他	0.0%	5.6%	0.0%	8.4%
	合計				
主な出現種と個体数 (個体／0.1㎡) ()内は組成比率 (%)	<i>Cirriformia</i> 属 12(46.2)	サクラガイ属 3(18.8)	<i>Malacoceros</i> 属 4(23.5)	-	
	<i>Nephtys</i> 属 3(11.5)	<i>Glycera</i> 属 3(18.8)	イトコガイ科 3(17.6)		
	<i>Euthalenessa</i> 属 2(7.7)	紐形動物門 2(12.5)	ナリウロコムシ科 2(11.8)		
		イトコガイ科 2(12.5)			
主な出現種と湿重量 (g／0.1㎡) ()内は組成比率 (%)	イトカリ属 0.15(32.6)	サクラガイ属 0.07(38.9)	イトコガイ科 0.17(44.7)	ホソジイサガイ 1.09(45.9)	
	<i>Cirriformia</i> 属 0.11(23.9)	<i>Leptosquilla</i> schme 0.04(22.2)	<i>Malacoceros</i> 属 0.06(15.8)	ムシロタケ 0.29(12.2)	
	シブトヒサガラガイ 0.1(21.7)	イトコガイ科 0.03(16.7)	<i>Sigalion</i> 属 0.05(13.2)	サツマビナ 0.27(11.3)	
	<i>Euthalenessa</i> 属 0.06(13.0)		<i>Leptosquilla</i> schmelztzi 0.04(10.5)	オノカガミ 0.25(10.7)	

注1：主な出現種は各調査地点での上位5種(ただし、組成比が10%以上)を示した。

2：平均欄の種類数は総種類数を示した。

表-6.2.25 (1) マクロベントスの出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月8,9日

冬季：令和2年12月15,23日

調査法：ミス・マッケンタイヤー型採泥器による採泥

凡 例：○＝出現

No.	門	綱	目	科	学名	和名	調査季	
							夏季	冬季
1	刺胞動物	花虫	ハナギンチャク	ハナギンチャク	Cerianthidae	ハナギンチャク科	○	
2			イソギンチャク	ムシモトギンチャク	Edwardsiidae	ムシモトギンチャク科	○	○
3			—	—	Actinaria	イソギンチャク目		○
4	扁形動物	渦虫	多岐腸	—	Polycladida	多岐腸目		○
5	紐形動物	—	—	—	NEMERTINEA	紐形動物門	○	○
6	軟体動物	多板	新ヒザラガイ	サハハツヒザラガイ	<i>Parachiton communis</i>	シラフトヒザラガイ		○
7				—	Leptochitonidae	サハハツヒザラガイ科	○	
8				ウスヒザラガイ	Ischnochitonidae	ウスヒザラガイ科	○	○
9				クサズリガイ	Chitonidae	クサズリガイ科	○	
10				ケハタヒザラガイ	Acanthochitonidae	ケハタヒザラガイ科	○	
11			腹足	ニシキウスガイ	<i>Pseudostomatella decorata</i>	イロアセアシガイマ		○
12				オニツノガイ	Cerithiidae	オニツノガイ科	○	
13				タマガイ	<i>Natica gualteriana</i>	ホウシュノタマ	○	
14				アツキガイ	<i>Muricodrupa fiscella</i>	ヨウラクレイシダマシ	○	
15				ムシロガイ	<i>Niotha albescens</i>	アラムシロ	○	
16				マクラガイ	<i>Oliva annulata</i>	サツマヒナ		○
17				ツクシガイ	<i>Costellaria coronata</i>	カンムツクシ	○	
18				イモガイ	<i>Conus pulicarius</i>	ゴマフイモ	○	
19				タケノコガイ	<i>Decorihastula affinis</i>	ムシロタケ		○
20			頭楯	キセワカガイ	<i>Philine rubrata</i>	アキセワカ	○	
21				フドウガイ	Haminoeidae	フドウガイ科	○	
22			囊舌	コクラクミドリガイ	Elysiidae	コクラクミドリガイ科		○
23				ゾウケツノガイ	<i>Graptacme aciculum</i>	リュウキュウツノガイ	○	
24		二枚貝	イカガイ	イカガイ	<i>Musculista senhousia</i>	ホトギスカガイ		○
25			マルスタレガイ	ウロコガイ	Galeommatidae	ウロコガイ科	○	
26				サマルガイ	<i>Fragum unedo</i>	カラガイ	○	
27				—	<i>Fragum loochooanum</i>	オキナワヒシガイ	○	
28				ニッコウガイ	<i>Cadella semitorta</i>	サミノコサラ	○	
29					<i>Pinguitellina pinguis</i>	シバキヒメダラ	○	
30					<i>Pinguitellina</i> sp.	ウラキヒメダラ属	○	
31					<i>Jactellina compta</i>	ミナシホリサクラ	○	○
32					<i>Exotica tokubeii</i>	コムサクラ	○	
33					<i>Nitidotellina</i> sp.	サクラガイ属	○	○
34					<i>Macoma</i> sp.	シラトリガイ属	○	
35					Tellinidae	ニッコウガイ科	○	
36				マルスタレガイ	<i>Gafrarium pectinatum</i>	ホソシイナミガイ		○
37				—	<i>Bonartemis histrio histrio</i>	オノカガミ		○
38	環形動物	多毛	サシハコガイ	サシハコガイ	Phyllodocidae	サシハコガイ科	○	
39				ウロコムシ	Harmothoinae	マダウロコムシ亜科	○	
40				ナリウロコムシ	<i>Euthalenessa</i> sp.	<i>Euthalenessa</i> 属	○	○
41				—	<i>Sigalion</i> sp.	<i>Sigalion</i> 属	○	○
42				—	Sigalionidae	ナリウロコムシ科	○	○
43				オトヒメコガイ	<i>Oxydromus</i> sp.	<i>Oxydromus</i> 属		○
44				シリス	Syllidae	シリス科	○	○
45				コカイ	<i>Ceratonereis japonica</i>	キレコミカイ		○
46				—	<i>Leonnates</i> sp.	ハナクロコガイ属	○	
47				チロリ	<i>Glycera</i> sp.	<i>Glycera</i> 属	○	○
48				シロカネコガイ	<i>Micronephthys</i> sp.	<i>Micronephthys</i> 属	○	
49				—	<i>Nephtys</i> sp.	<i>Nephtys</i> 属	○	○
50			イソメ	ナナテイソメ	Onuphidae	ナナテイソメ科	○	○
51				イソメ	<i>Marphysa</i> sp.	<i>Marphysa</i> 属	○	
52				ギボシイソメ	Lumbrineridae	ギボシイソメ科		○
53				セクロイソメ	<i>Arabella</i> sp.	<i>Arabella</i> 属	○	○
54			ホコサキコカイ	ホコサキコカイ	<i>Leitoscoloplos</i> sp.	<i>Leitoscoloplos</i> 属	○	
55				—	<i>Naineris</i> sp.	<i>Naineris</i> 属	○	
56				—	<i>Scoloplos</i> sp.	<i>Scoloplos</i> 属		○
57			スビオ	スビオ	<i>Aonides</i> sp.	<i>Aonides</i> 属		○
58				—	<i>Malacoceros</i> sp.	<i>Malacoceros</i> 属	○	○
59				—	<i>Pseudopolydora</i> sp.	<i>Pseudopolydora</i> 属		○
60				—	<i>Spio</i> sp.	<i>Spio</i> 属		○

表-6.2.25 (2) マクロベントスの出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月8,9日

冬季：令和2年12月15,23日

調査法：スミス・マッケンタイヤ型採泥器による採泥

凡 例：○＝出現

No.	門	綱	目	科	学名	和名	調査季		
							夏季	冬季	
61	環形動物	多毛	スビ [○] オ	スビ [○] オ	Spionidae	スビ [○] オ科	○		
62				トックリコ [○] カイ	<i>Poecilochaetus</i> sp.	<i>Poecilochaetus</i> 属		○	
63				ツハ [○] サコ [○] カイ	Chaetopteridae	ツハ [○] サコ [○] カイ科	○		
64				ミス [○] ヒキコ [○] カイ	<i>Caulleriella</i> sp.	<i>Caulleriella</i> 属	○	○	
65					<i>Cirriformia</i> sp.	<i>Cirriformia</i> 属	○	○	
66					Cirratulidae	ミス [○] ヒキコ [○] カイ科	○		
67				イトコ [○] カイ	イトコ [○] カイ	Capitellidae	イトコ [○] カイ科	○	○
68					タケフシコ [○] カイ	Maldanidae	タケフシコ [○] カイ科	○	○
69				オフェリアコ [○] カイ	オフェリアコ [○] カイ	<i>Armandia</i> sp.	<i>Armandia</i> 属	○	○
70				チマキコ [○] カイ	チマキコ [○] カイ	<i>Myriochele</i> sp.	<i>Myriochele</i> 属		○
71				フサコ [○] カイ	フサコ [○] カイ	<i>Pista</i> sp.	<i>Pista</i> 属	○	○
72						Terebellidae	フサコ [○] カイ科	○	○
73					タマク [○] シフサコ [○] カイ	<i>Terebellides</i> sp.	<i>Terebellides</i> 属	○	○
74				ケヤリムシ	ケヤリムシ	<i>Chone</i> sp.	<i>Chone</i> 属	○	
75	節足動物	顎脚	ミオト [○] コーバ [○]	Cylindroleberididae	Cylindroleberididae	Cylindroleberididae科		○	
76		軟甲	口脚	ヒメシヤコ	Nannosquillidae	ヒメシヤコ科	○		
77				シヤコ	<i>Leptosquilla schmeltzii</i>	<i>Leptosquilla schmeltzii</i>	○	○	
78			等脚	スナホリムシ	<i>Metacirrolana</i> sp.	スナホリムシモト [○] キ属	○		
79		端脚		スカ [○] メソコエビ [○]	<i>Ampelisca</i> sp.	スカ [○] メソコエビ [○] 属	○		
80				ヒゲ [○] ナカ [○] ヨコエビ [○]	<i>Ampithoe</i> sp.	ヒゲ [○] ナカ [○] ヨコエビ [○] 属	○		
81				コンボ [○] ソコエビ [○]	<i>Lembos</i> sp.	コンビ [○] ソソコエビ [○] 属	○		
82				カマギリヨコエビ [○]	Siphonocetinae	ヤト [○] カリモト [○] キ亜科	○	○	
83				メリタヨコエビ [○]	Melitidae	メリタヨコエビ [○] 科	○	○	
84				トケ [○] ヨコエビ [○]	<i>Liljeborgia</i> sp.	トケ [○] ヨコエビ [○] 属	○		
85				グチハ [○] ソソコエビ [○]	<i>Synchelidium</i> sp.	サンハ [○] ツソコエビ [○] 属		○	
86				ヒサソコエビ [○]	<i>Harpiniopsis</i> sp.	スナキソコエビ [○] 属	○	○	
87					Phoxocephalidae	ヒサソコエビ [○] 科	○	○	
88					ウシヒゲ [○] ソコエビ [○]	<i>Eohaustorius</i> sp.	ウシロマエソコエビ [○] 属	○	○
89		十脚		サクラエビ [○]	<i>Sicyonella maldivensis</i>	<i>Sicyonella maldivensis</i>	○		
90				スナモク [○] リ	<i>Paratrypaea bouvieri</i>	フ [○] ヒ [○] エスナモク [○] リ	○		
91					Callianassidae	スナモク [○] リ科	○	○	
92				アナシ [○] ヤコ	<i>Upogebia sakaii</i>	コフ [○] シアナシ [○] ヤコ	○		
93				ヤト [○] カリ	<i>Dardanus</i> sp.	ヤト [○] カリ 属		○	
94				カラッパ [○]	<i>Calappa hepatica</i>	ソデ [○] カラッパ [○]	○		
95				ヒシカ [○] ニ	<i>Aulacolambrus diacanthus</i>	サンカクヒシカ [○] ニ	○		
96				ワタリカ [○] ニ	<i>Portunus emarginatus</i>	マルハチナカ [○] ヒメカ [○] サ [○] ミ	○		
97					<i>Thalamita integra</i>	ヒメフタバ [○] ヘ [○] ニツケカ [○] ニ	○		
98					<i>Thalamita</i> sp.	ヘ [○] ニツケカ [○] ニ 属	○		
99					Portunidae	ワタリカ [○] ニ科	○		
100					オウキ [○] カ [○] ニ	<i>Etisus</i> sp.	ヒツ [○] メカ [○] ニ 属	○	
101						Xanthidae	オウキ [○] カ [○] ニ科	○	
102					オサカ [○] ニ	<i>Macrophthalmus milloti</i>	ミナミナカ [○] オサカ [○] ニ	○	○
103						<i>Macrophthalmus</i> sp.	オサカ [○] ニ 属	○	
104	半索動物	ギ [○] ボ [○] シムシ	—	—	ENTEROPNEUSTA	ギ [○] ボ [○] シムシ綱	○	○	
出現種類数							82	53	

表－6. 2. 26 (1) マクロベントスの地点別出現状況（夏季）

調査日：夏季：令和2年7月8, 9日

調査法：スミス・マッケンタイヤー型採泥器による採泥

単 位：個体/0. 1㎡、g/0. 1㎡、+は0. 01g未満

No.	調査地点 和名	St. 1		St. 2		St. 3		St. 4		St. 5	
		個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	ハナギンチャク科							1	0. 01		
2	ムシモトギギンチャク科							2	0. 01		
3	紐形動物門			1	+					1	+
4	サメハダヒザラガイ科									2	0. 08
5	ウスヒザラガイ科					4	0. 03	8	0. 08		
6	クサスリガイ科										
7	ケハダヒザラガイ科										
8	オニノツノガイ科							1	0. 03		
9	ホウシュノタマ							1	0. 43		
10	ヨウラクレイシダマシ							1	1. 46		
11	アワムシロ									1	0. 37
12	カンムリウツシ									1	0. 95
13	コマフイモ									1	9. 85
14	アカセウタ					1	+				
15	ブトウガイ科									1	0. 02
16	リュウキュウツノガイ	2	0. 04								
17	ウロコガイ科							1	0. 02		
18	カララガイ										
19	オキナワヒサガイ										
20	ナミノサハラ	1	0. 03								
21	ミカキヒメサハラ									2	0. 22
22	ウツキヒメサハラ属			1	0. 01						
23	ミナシホリサハラ									1	0. 01
24	コメサハラ	3	0. 05								
25	サハラガイ属			4	0. 27						
26	シラトリガイ属			4	0. 19						
27	ニッコウガイ科										
28	サシバコガイ科	1	+								
29	マダラウロコムシ亜科							1	0. 01		
30	<i>Euthalenessa</i> 属									1	0. 05
31	<i>Sigalion</i> 属										
32	ハラウロコムシ科					1	0. 25				
33	シリス科					1	+				
34	ハナクロコガイ属										
35	<i>Glycera</i> 属					1	0. 02				
36	<i>Micronephtys</i> 属							2	0. 01		
37	<i>Nephtys</i> 属					1	0. 03	1	0. 01		
38	ナテイト科					44	0. 49				
39	<i>Marphysa</i> 属										
40	<i>Arabella</i> 属					1	0. 03	1	0. 01		
41	<i>Leitoscoloplos</i> 属							3	0. 03		
42	<i>Naineris</i> 属										
43	<i>Malacoceros</i> 属										
44	スピオ科										
45	ツバサコガイ科					6	0. 08				
46	<i>Cauleriella</i> 属										
47	<i>Cirriiformia</i> 属										
48	ミズヒキコガイ科										
49	イトコガイ科			5	0. 03	1	+				
50	タケツコガイ科					1	+				
51	<i>Armandia</i> 属							2	0. 01		
52	<i>Pista</i> 属										
53	フサコガイ科					1	0. 02			1	0. 01
54	<i>Terebellides</i> 属										
55	<i>Chone</i> 属			1	0. 01						
56	ヒメヤコ科										
57	<i>Leptosquilla schmeltzii</i>										
58	サホリムシトキ属							24	0. 05		
59	スカメソコヒ属	19	0. 06								
60	ヒゲナガソコヒ属					1	0. 01				

表－6. 2. 26 (2) マクロベントスの地点別出現状況（夏季）

調査日：夏季：令和2年7月8, 9日

調査法：スミス・マッキンタイヤ型採泥器による採泥

単 位：個体/0. 1m²、g/0. 1m²、+は0. 01g未満

No.	調査地点 和名	St. 1		St. 2		St. 3		St. 4		St. 5	
		個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
61	コンビ ^ニ ラソコエビ ^ノ 属										
62	イト ^ノ カリモト ^ノ キ亜科	8	0. 01								
63	メリタヨコエビ ^ノ 科							6	0. 02		
64	トク ^ノ ヨコエビ ^ノ 属	1	+								
65	スナキソコエビ ^ノ 属	1	+								
66	ヒサソコエビ ^ノ 科	7	0. 03								
67	ウシロマエソコエビ ^ノ 属	2	0. 01								
68	<i>Sicyonella maldivensis</i>										
69	ブ ^ノ ビ ^ノ エスナモク ^ノ リ										
70	スナモク ^ノ リ科	2	0. 04								
71	コブ ^ノ シアナシ ^ノ ヤコ										
72	ソテ ^ノ カラッパ	1	0. 22								
73	サシカキヒシガ ^ノ ニ										
74	マルハテナガ ^ノ ヒメガ ^ノ サ ^ノ ミ										
75	ヒメフタハ ^ノ ベ ^ノ ニツカ ^ノ ニ							1	0. 14		
76	ベ ^ノ ニツカ ^ノ ニ属					3	0. 04				
77	リタリガ ^ノ ニ科	1	+								
78	ヒク ^ノ メカ ^ノ ニ属					4	0. 08				
79	オウキ ^ノ ガ ^ノ ニ科					3	0. 01				
80	ミナミメカ ^ノ オサカ ^ノ ニ							6	2. 26		
81	オサカ ^ノ ニ属					2	0. 01	6	0. 11		
82	キ ^ノ ホ ^ノ シムシ綱					2	0. 04	4	0. 29		
種類数		13		6		18		19		10	
合 計		49	0. 49	16	0. 51	78	1. 14	72	4. 99	12	11. 56

表-6.2.26 (3) マクロベントスの地点別出現状況 (夏季)

調査日：夏季：令和2年7月8,9日

調査法：スミス・マッケンタイヤ型採泥器による採泥

単 位：個体/0.1m²、g/0.1m²、+は0.01g未満

No.	調査地点 和名	St. 6		St. 7		St. 8		合計	
		個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	ハナギンチャク科					1	0.02	2	0.03
2	ムシモトギギンチャク科	2	0.01					4	0.02
3	紐形動物門	3	0.03	4	0.02	1	0.01	10	0.06
4	サメハダヒサラガイ科	4	0.07					6	0.15
5	ウスヒサラガイ科							12	0.11
6	クサスリガイ科	1	0.05					1	0.05
7	ケハダヒサラガイ科	1	0.06					1	0.06
8	オノツノガイ科							1	0.03
9	ホウシュノタマ							1	0.43
10	ヨウラクレイシダマシ							1	1.46
11	アワムシロ							1	0.37
12	カンムリツクシ							1	0.95
13	コマフイモ							1	9.85
14	アカキセウタ							1	+
15	ブトウガイ科							1	0.02
16	リュウキュウツノガイ							2	0.04
17	ウロコガイ科							1	0.02
18	カワカガイ	1	3.33					1	3.33
19	オキナワヒシガイ	1	0.37					1	0.37
20	ナミノコサラ							1	0.03
21	ミカキヒメサラ							2	0.22
22	ウラキヒメサラ属							1	0.01
23	ミクニホリサクラ							1	0.01
24	コメサクラ							3	0.05
25	サクラガイ属					4	0.06	8	0.33
26	シラトリガイ属							4	0.19
27	ニッコウガイ科	1	+					1	+
28	サシハゴカイ科							1	+
29	マダラウロコムシ亜科							1	0.01
30	<i>Euthalenessa</i> 属							1	0.05
31	<i>Sigalion</i> 属					3	0.15	3	0.15
32	ナラウロコムシ科	1	0.14			1	0.05	3	0.44
33	シリス科							1	+
34	ハナクロコガイ属			1	+			1	+
35	<i>Glycera</i> 属			3	0.10			4	0.12
36	<i>Micronephthys</i> 属							2	0.01
37	<i>Nephtys</i> 属	3	0.03	2	0.02			7	0.09
38	ナナテヅメ科							44	0.49
39	<i>Marphysa</i> 属					1	0.15	1	0.15
40	<i>Arabella</i> 属							2	0.04
41	<i>Leitoscoloplos</i> 属	1	0.01					4	0.04
42	<i>Naineris</i> 属	1	0.01					1	0.01
43	<i>Malacoceros</i> 属					3	0.02	3	0.02
44	ズビオ科			1	0.01			1	0.01
45	ツバサゴカイ科							6	0.08
46	<i>Cauleriella</i> 属			1	+			1	+
47	<i>Cirriformia</i> 属	1	0.04					1	0.04
48	ミスヒキョガイ科	1	0.01	2	0.01			3	0.02
49	イトゴカイ科	1	0.03	3	0.08			10	0.14
50	タケフシゴカイ科	2	0.02					3	0.02
51	<i>Armandia</i> 属							2	0.01
52	<i>Pista</i> 属	3	0.01	1	0.01			4	0.02
53	フサゴカイ科			4	0.03			6	0.06
54	<i>Terebellides</i> 属					15	0.50	15	0.50
55	<i>Chone</i> 属							1	0.01
56	ヒメシヤコ科			1	0.02			1	0.02
57	<i>Leptosquilla schmeltzii</i>			3	0.01			3	0.01
58	スナホリムシモトギ属							24	0.05
59	スカメソコエビ属							19	0.06
60	ヒゲナガメソコエビ属							1	0.01

表－6.2.26 (4) マクロベントスの地点別出現状況（夏季）

調査日：夏季：令和2年7月8,9日

調査法：スミス・マッキンタイヤ型採泥器による採泥

単 位：個体/0.1m²、g/0.1m²、+は0.01g未満

No.	調査地点 和名	St. 6		St. 7		St. 8		合計	
		個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
61	コンビ [°] ラソコエビ [°] 属	2	+					2	+
62	ヤト [°] カリモト [°] キ亜科							8	0.01
63	メリタヨコエビ [°] 科							6	0.02
64	トケ [°] ヨコエビ [°] 属							1	+
65	スナキソコエビ [°] 属							1	+
66	ヒサソコエビ [°] 科							7	0.03
67	ウシロマエソコエビ [°] 属							2	0.01
68	<i>Sicyonella maldivensis</i>					1	0.05	1	0.05
69	ブ [°] ビ [°] エスナモク [°] リ			1	0.04			1	0.04
70	スナモク [°] リ科							2	0.04
71	コブ [°] シアナシ [°] ャコ			4	0.14			4	0.14
72	ソテ [°] カラッパ [°]							1	0.22
73	サンカケヒシカ [°] ニ	1	0.10					1	0.10
74	マルハテナカ [°] ヒメカ [°] サ [°] ミ	1	0.12					1	0.12
75	ヒメフタハ [°] ヘ [°] ニツケカ [°] ニ							1	0.14
76	ヘ [°] ニツケカ [°] ニ属							3	0.04
77	ワタリカ [°] ニ科							1	+
78	ヒツ [°] メカ [°] ニ属							4	0.08
79	オウキ [°] カ [°] ニ科	2	0.03					5	0.04
80	ミナミメナカ [°] オサカ [°] ニ							6	2.26
81	オサカ [°] ニ属	1	0.05	1	0.07			10	0.24
82	ギ [°] ホ [°] シムシ綱							6	0.33
種類数		22		15		9		82	
合 計		35	4.52	32	0.56	30	1.01	324	24.78

表-6.2.27 (1) マクロベントスの地点別出現状況 (冬季)

調査日：冬季：令和2年12月15, 23日

調査法：スミス・マッケンタイヤ型採泥器による採泥

単 位：個体/0.1m²、g/0.1m²、+は0.01g未満

No.	調査地点 和名	St. 1		St. 2		St. 3		St. 4		St. 5	
		個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	ムシトギキンチャク科							14	0.08		
2	イソキンチャク目					2	0.01	1	0.01		
3	多岐腸目										
4	紐形動物門							3	0.03		
5	シリブトヒサラガイ										
6	ウスヒサラガイ科							1	0.02		
7	イロアセリヤカマ									1	0.01
8	サツマビナ									1	2.14
9	ムシロタケ									1	2.32
10	コクラクミドリガイ科									1	0.09
11	ホトギスカガイ										
12	ミクニホリサクラ									1	0.01
13	サクラガイ属										
14	ホツシイナミガイ							1	8.69		
15	オイノカガミ							1	2.03		
16	<i>Euthalenessa</i> 属										
17	<i>Sigalion</i> 属										
18	ナラウロコムシ科			1	0.01						
19	<i>Oxydromus</i> 属							1	0.01		
20	シリス科							1	+		
21	キレコカイ							3	0.03		
22	<i>Glycera</i> 属					1	0.02				
23	<i>Nephtys</i> 属										
24	ナナテイル科					8	0.11				
25	ギボシイタ科									1	0.01
26	<i>Arabella</i> 属							2	0.03	1	0.01
27	<i>Scoloplos</i> 属	1	+								
28	<i>Aonides</i> 属					4	0.01				
29	<i>Malacoceros</i> 属										
30	<i>Pseudopolydora</i> 属										
31	<i>Spio</i> 属										
32	<i>Poecilochaetus</i> 属			1	0.01						
33	<i>Caulerella</i> 属									1	0.01
34	<i>Cirriiformia</i> 属										
35	イトガイ科			2	0.02	2	0.03	2	0.05		
36	タケツコカイ科					1	+				
37	<i>Armandia</i> 属							7	0.04	1	+
38	<i>Myriochele</i> 属										
39	<i>Pista</i> 属										
40	フサコカイ科					1	+				
41	<i>Terebellides</i> 属										
42	Cylindroleberididae科										
43	<i>Leptosquilla schmeltzii</i>										
44	イトカリモトキ亜科	2	+								
45	メリタコエビ科							12	0.03		
46	サンバツソコエビ属	2	0.01								
47	スナキソコエビ属	1	+								
48	ヒサソコエビ科	2	0.01								
49	ウシロマエソコエビ属	1	0.01								
50	スナモグリ科	2	0.01								
51	イトカリ属										
52	ミナミナカオサカニ							1	0.57		
53	ギボシムシ綱					3	0.06	9	1.38		
種類数		7		3		8		15		9	
合 計		11	0.04	4	0.04	22	0.24	59	13.00	9	4.60

表-6.2.27 (2) マクロベントスの地点別出現状況 (冬季)

調査日：冬季：令和2年12月15, 23日

調査法：スミス・マッキンタイヤー型採泥器による採泥

単 位：個体/0.1m²、g/0.1m²、+は0.01g未満

No.	調査地点 和名	St. 6		St. 7		St. 8		合計	
		個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	ムシトキセンチャク科					1	+	15	0.08
2	イソセンチャク目							3	0.02
3	多岐腸目			1	+			1	+
4	紐形動物門			2	0.01			5	0.04
5	シリブトヒサカイ	1	0.10					1	0.10
6	ウスヒサカイ科							1	0.02
7	イロアセアシヤカマ							1	0.01
8	サツヒナ							1	2.14
9	ムシロクダ							1	2.32
10	コクラクミドリカイ科							1	0.09
11	ホトキスカイ	1	0.01					1	0.01
12	ミクニホリサクラ							1	0.01
13	サクラカイ属			3	0.07	1	+	4	0.07
14	ホソシイナミカイ							1	8.69
15	オイノカミ							1	2.03
16	<i>Euthalenessa</i> 属	2	0.06					2	0.06
17	<i>Sigalion</i> 属					1	0.05	1	0.05
18	ノラリロコムシ科	1	0.01			2	0.03	4	0.05
19	<i>Oxydromus</i> 属							1	0.01
20	シリス科							1	+
21	キレコミカイ							3	0.03
22	<i>Glycera</i> 属			3	0.01	1	0.01	5	0.04
23	<i>Nephtys</i> 属	3	0.02	1	0.01			4	0.03
24	ナナイソメ科							8	0.11
25	キホシイソメ科							1	0.01
26	<i>Arabella</i> 属							3	0.04
27	<i>Scoloplos</i> 属							1	+
28	<i>Aonides</i> 属							4	0.01
29	<i>Malacoceros</i> 属			1	0.01	4	0.06	5	0.07
30	<i>Pseudopolydora</i> 属					1	+	1	+
31	<i>Spio</i> 属	1	+					1	+
32	<i>Poecilochaetus</i> 属			1	+			2	0.01
33	<i>Caulleriella</i> 属							1	0.01
34	<i>Cirriformia</i> 属	12	0.11					12	0.11
35	イトカイ科	1	+	2	0.03	3	0.17	12	0.30
36	クダシカイ科							1	+
37	<i>Arandia</i> 属	1	+	1	+			10	0.04
38	<i>Myriochele</i> 属	1	+					1	+
39	<i>Pista</i> 属	1	+					1	+
40	フサコカイ科							1	+
41	<i>Terebellides</i> 属					1	0.02	1	0.02
42	Cylindroleberididae科					1	+	1	+
43	<i>Leptosquilla schmelzii</i>			1	0.04	1	0.04	2	0.08
44	ヤトカリモトキ皿科							2	+
45	メリタコエビ科							12	0.03
46	サンバツソコエビ属							2	0.01
47	スナキソコエビ属							1	+
48	ヒサソコエビ科							2	0.01
49	ウシロマエソコエビ属							1	0.01
50	スナモクリ科							2	0.01
51	ヤトカリ属	1	0.15					1	0.15
52	ミナミナガナガコ							1	0.57
53	キホシムシ綱							12	1.44
種類数		12		10		11		53	
合 計		26	0.46	16	0.18	17	0.38	164	18.94

3) 確認された重要な種

重要な種及び確認地点を表－6.2.28 に示す。

令和2年度調査において、重要な種は8種が確認された。^{シキユオネラ マルディウエンシス}*Sicyonella maldivensis*は工事前に確認されていなかったが、新たに確認された。引き続き出現状況を確認していくこととする。

表－6.2.28 確認された重要な種及び確認地点（マクロベントス）

No.	和名	環境省 RL 2020	環境省 海洋生物 RL 2017	水産庁 DB	沖縄県 RDB 2017	WWF	確認地点・調査時期							
							St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8
1	ヨウラクインダ ^{マシ}				NT					夏季				
2	カリカ ^イ	NT			NT							夏季		
3	オキナビスカ ^イ	NT										夏季		
4	オノカ ^ミ	NT			NT					冬季				
5	ミクニボ ^{リサ^{クラ}}	NT			NT						夏季・冬季			
6	<i>Sicyonella maldivensis</i>		DD											夏季
7	フ ^ビ エスナモク ^リ		DD										夏季	
8	コブ ^{シアナシ^{ヤコ}}		VU										夏季	

注：重要な種の選定基準は、表－ 6.2.5 と同様とした。

(7) 底生動物（メガロベントス）

1) 調査概要

礁池・礁縁域では、5m×5m のコドラートを設置し、ダイバーによる潜水目視観察により、底生動物（メガロベントス）の種類及び出現状況（CR 法）を記録した。調査は「海洋調査技術マニュアル」（（社）海洋調査協会）等に基づいて行った。干潟域においても、調査員が目視観察により、同様に調査を実施した。

なお、メガロベントスの生息環境である砂の堆積状況等を把握するため、一部の調査地点で鉄筋杭を設置し、海底からの高さを計測し、砂面変動を把握した。

調査地点は、人が比較的入りにくい礁池・礁縁域の B4、干潟域の B9, B10 とした。

2) 調査結果

メガロベントスの調査結果概要は表－6. 2. 29 に、出現種一覧は表－6. 2. 30 に、地点別出現状況は表－6. 2. 31～表－ 6. 2. 32 に、調査地点概況は表－6. 2. 33 に示すとおりである。

また、B4, B9, B10 における鉄筋杭の高さの変動は図－ 6. 2. 10 に示すとおりである。

ア) 夏季

(a) 種構成

夏季調査では、B1～B15 の全 15 地点を通じて軟体動物門 116 種類、節足動物門 77 種類、棘皮動物門 13 種類、脊索動物門 11 種類、その他 31 種類、計 248 種類が確認された。

(b) 礁池・礁縁域

地点別には、礁池・礁縁域（B1～B6、B15）では 7～55 種類の範囲にあり、瀬長島北西側礁縁部の B3 で 55 種類と最も多かった。一方、瀬長島北側深場の B5 では 7 種類と最も少なかった。

(c) 干潟域

干潟域（B7～B14）では、18～53 種類の範囲にあり、瀬長島南側の B12 では 53 種類と最も多く、B14 で 18 種類と最も少なかった。

イ) 冬季

(a) 種構成


冬季調査では、B1～15 の全 15 地点を通じて軟体動物門 98 種類、節足動物門 73 種類、棘皮動物門 18 種類、脊索動物門 13 種類、その他 31 種類、計 233 種類が確認された。

(b) 礁池・礁縁域

地点別には、礁池・礁縁域 (B1～6、B15) では 2～65 種類の範囲にあり、瀬長島北西側礁縁部の B3 で 65 種類と最も多かった。一方、瀬長島北側深場の B5 では 2 種類と最も少なかった。

(c) 干潟域

干潟域 (B7～B14) では、12～55 種類の範囲にあり、瀬長島南側の B12 では 55 種類と最も多く、B14 では 12 種類と最も少なかった。



図一 6.2.9 事後調査地点（海域生物・海域生態系、海域生物②）

表-6.2.29 (1) メガロベントスの調査結果概要 (夏季)

調査日：令和2年7月10, 11, 20, 21, 22日

項目/ 調査地点		磯池・礁緑域			
		B1	B2	B3	B4
出現 種類数	軟体動物門	18	19	24	13
	節足動物門	10	14	7	13
	棘皮動物門	1	1	9	1
	脊索動物門	4	2	8	2
	その他	5	8	7	9
合計		38	44	55	38
主な出現種		-	キホ ⁺ シムシ綱	ムカデ ⁺ カ ⁺ イ科	-

項目/ 調査地点		磯池・礁緑域		干潟域	
		B5	B6	B7	B8
出現 種類数	軟体動物門	3	12	16	20
	節足動物門	1	20	10	13
	棘皮動物門	1	3	0	0
	脊索動物門	0	3	0	1
	その他	2	9	5	9
合計		7	47	31	43
主な出現種		-	リュウキュウムカデ ⁺ カ ⁺ イ	イシタ ⁺ タミアマオブ ⁺ ネ マルアマオブ ⁺ ネ ゴ ⁺ マフニナ クチバ ⁺ カ ⁺ イ	テッポウエビ ⁺ 属 ミナミナガ ⁺ オサカ ⁺ ニ

項目/ 調査地点		干潟域			
		B9	B10	B11	B12
出現 種類数	軟体動物門	6	5	3	29
	節足動物門	13	13	10	16
	棘皮動物門	0	0	0	0
	脊索動物門	0	0	0	3
	その他	2	4	6	5
合計		21	22	19	53
主な出現種		ミナミナガ ⁺ オサカ ⁺ ニ	コ ⁺ カイ科	タマキカ ⁺ イ リュウキュウコメツキカ ⁺ ニ フタハオサカ ⁺ ニ	カンキ ⁺ ク カヤノミカニモリ シマハ ⁺ ツコウハ ⁺ イ ツマキヨコハ ⁺ サミ クテジ ⁺ マヨコハ ⁺ サミ

項目/ 調査地点		干潟域		磯池・礁緑域	合計
		B13	B14	B15	
出現 種類数	軟体動物門	7	8	12	116
	節足動物門	11	8	12	77
	棘皮動物門	0	0	1	13
	脊索動物門	0	0	3	11
	その他	2	2	8	31
合計		20	18	36	248
主な出現種		マルアマオブ ⁺ ネ リュウキュウミニナ フトハナタリ ツメナカ ⁺ ヨコハ ⁺ サミ ツノメチコ ⁺ カ ⁺ ニ オキナワハクセンシオマネキ ヒメシオマネキ	タマキカ ⁺ イ	ヒメクワノミカニモリ 端脚目	

注1: 主な出現種はB7, B12で50個体以上(cc, c), その他の地点は20個体以上(cc, c, +)確認された種を示す。

注2: 主な出現種の欄の-は20個体以上(cc, c, +)の種が確認されなかったことを示す。

表－6. 2. 29 (2) メガロベントスの調査結果概要 (冬季)

調査日：令和2年12月7, 8日(干潟) 9, 10, 11日(海域)

項目/ 調査地点		礁池・礁緑域			
		B1	B2	B3	B4
出現 種類数	軟体動物門	16	10	27	10
	節足動物門	12	18	10	13
	棘皮動物門	1	3	11	1
	脊索動物門	6	2	10	3
	その他	7	8	7	7
合計		42	41	65	34
主な出現種		ムカデカギ科	ギョホシムシ綱	ムカデカギ科	－

項目/ 調査地点		礁池・礁緑域		干潟域	
		B5	B6	B7	B8
出現 種類数	軟体動物門	2	14	18	15
	節足動物門		23	10	14
	棘皮動物門		4	2	1
	脊索動物門		4		
	その他	0	11	5	11
合計		2	56	35	41
主な出現種		－	リュウキュウムカデカギ	イシタミアマオブネ マルアマオブネ コマフニナ クチハカギ	－

項目/ 調査地点		干潟域			
		B9	B10	B11	B12
出現 種類数	軟体動物門	7	3	1	24
	節足動物門	11	13	7	20
	棘皮動物門				
	脊索動物門				3
	その他	2	4	5	8
合計		20	20	13	55
主な出現種		ミナミナガオサカニ	－	タママカギ	カンギク カヤノミカニモリ シマハッコウハ ツマキヨコハサミ タテシマヨコハサミ

項目/ 調査地点		干潟域		礁池・礁緑域	合計
		B13	B14	B15	
出現 種類数	軟体動物門	6	6	10	98
	節足動物門	11	4	15	73
	棘皮動物門			1	18
	脊索動物門			3	13
	その他	2	2	9	31
合計		19	12	38	233
主な出現種		マルアマオブネ リュウキュウムニナ フトヘナタリ ツメナカヨコハサミ ツノメチコカニ オキナワクセンシオマネキ ヒメシオマネキ	タママカギ	端脚目	

注1: 主な出現種はB7, B12で50個体以上(cc, c), その他の地点は20個体以上(cc, c, +) 確認された種を示す。

2: 主な出現種の欄の－は20個体以上(cc, c, +) の種が確認されなかったことを示す。

表-6.2.30 (1) メガロベントスの出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月10, 11, 20, 21, 22日

冬季：令和2年12月7, 8日(干潟) 9, 10, 11日(海域)

凡 例：○=出現

No.	門	綱	目	科	学名	和名	調査季	
							夏季	冬季
1	肉質鞭毛虫	顆粒性網状根足虫	有孔虫	アカスナゴ	<i>Miniacina miniacea</i>	モミシノスナゴ	○	○
2	海綿動物	普通海綿	—	—	DEMOSPONGIAE	普通海綿綱	○	○
3	刺胞動物	ヒトコ虫	花クラゲ	ハネウミヒトコ	<i>Halocordyle disticha</i>	ハネウミヒトコ	○	○
4				エダウミヒトコ	<i>Myrionema amboinense</i>	ミナエダウミヒトコ	○	○
5		鉢虫	根口クラゲ	サカサクラゲ	<i>Cassiopea ornata</i>	サカサクラゲ	○	
6		花虫	ウミトサカ	ウミトサカ	<i>Sinularia</i> sp.	カタトサカ属	○	○
7			スナギンチャク	スナギンチャク	<i>Palythoa yongei</i>	タチワスナギンチャク		○
8			イソギンチャク	ムシモトギギンチャク	Edwardsiidae	ムシモトギギンチャク科	○	○
9				オヨギイソギンチャク	<i>Boloceroide mcmurrici</i>	オヨギイソギンチャク	○	
10				ウメボシイソギンチャク	Actiniidae	ウメボシイソギンチャク科	○	○
11				ハタゴイソギンチャク	<i>Radianthus lobatus</i>	チクビイソギンチャク	○	○
12					<i>Stichodactyla</i> sp. M	マメハタゴイソギンチャク	○	○
13	扁形動物	渦虫	多岐腸	—	Polycladida	多岐腸目	○	○
14	紐形動物	—	—	—	NEMERTINEA	紐形動物門	○	○
15	外肛動物	—	—	—	ECTOPROCTA	外肛動物門	○	○
16	軟体動物	多板	新ヒサラガイ	サメハタヒサラガイ	<i>Parachiton communis</i>	シリフヒサラガイ		○
17				ウスヒサラガイ	<i>Ischnochiton comptus</i>	ウスヒサラガイ	○	○
18		腹足	カサガイ	ユキナカサガイ	<i>Patelloida striata</i>	リュウキュウアサガイ	○	○
19					<i>Patelloida ryukyuensis</i>	リュウキュウシボリガイ	○	○
20					<i>Patelloida lentiginosa</i>	タイワンシボリガイ	○	○
21			古腹足	ニシキウス	<i>Trochus maculatus</i>	ニシキウス		○
22					<i>Trochus rota</i>	ウスイチモンシ		○
23					<i>Eurytrochus cognatus</i>	クルマチクサ	○	○
24					<i>Monodonta labio</i>	オキナワイシダタミ	○	○
25					<i>Iwakawatrochus urbanus</i>	イワカリチクサ	○	○
26					<i>Stomatella varia</i>	ヒメアワビ	○	○
27					<i>Stomatella planulata</i>	ヒメアワビ	○	
28					<i>Stomatia phymotis</i>	フルヤガイ		○
29				ササエ	<i>Liotina peronii</i>	リュウキュウヒメカタヘ	○	○
30					<i>Turbo stenogyus</i>	コシタカササエ	○	○
31					<i>Turbo coronatus coronatus</i>	カンキク	○	○
32			アオアサネガイ	アオアサネガイ	<i>Nerita helicinaoides</i>	イシダタミアオアサネ	○	○
33					<i>Nerita plicata</i>	キバアサネガイ	○	○
34					<i>Nerita squamulata</i>	マルアオアサネ	○	○
35					<i>Nerita albicilla</i>	アオアサネガイ	○	
36					<i>Nerita polita</i>	ニシキアオアサネ	○	○
37					<i>Smaragdia paulucciana</i>	キンランカノコ	○	
38					<i>Smaragdia rangiana</i>	クサイロカノコ	○	
39			盤足	オニツノガイ	<i>Cerithium echinatum</i>	メオニツノガイ	○	○
40					<i>Cerithium zonatum</i>	ヒメクワノミカニモリ	○	○
41					<i>Clypeomorus bifasciata</i>	カヤノミカニモリ	○	○
42					<i>Clypeomorus batillariaeformis</i>	ウミニカニモリ	○	
43					Cerithiidae	オニツノガイ科	○	○
44				コマフニナ	<i>Planaxis sulcatus</i>	コマフニナ	○	○
45				ウミニナ	<i>Batillaria flectosiphonata</i>	リュウキュウウミニナ	○	○
46				フトヘナタリ	<i>Cerithidea moerchii</i>	フトヘナタリ	○	○
47				グテホラ	<i>Strombus mutabilis</i>	ムカシタモト	○	
48					<i>Strombus luhuanus</i>	マカキガイ	○	
49				ムカデガイ	<i>Petalocochus keenae</i>	リュウキュウムカデガイ	○	○
50					<i>Dendropoma maximum</i>	フタモチヘビガイ	○	○
51					Vermetidae	ムカデガイ科	○	○
52				タカラガイ	<i>Cypraea ovum ovum</i>	ナツメダカラ		○
53					<i>Cypraea annulus</i>	ハナビラダカラ	○	
54					<i>Cypraea moneta</i>	キイロダカラ	○	○
55				タマガイ	<i>Natica gualteriana</i>	ホウジュノタマ	○	○
56					Naticidae	タマガイ科	○	
57			翼舌	クリイロケシカニモリ	<i>Notoseila morishimai</i>	ケシカニモリ	○	○
58				ミツチキリオレ	Triphoridae	ミツチキリオレ科	○	○
59			新腹足	アツキガイ	<i>Cronia margariticola</i>	ウレインダマシ	○	○
60					<i>Muricodrupa fusca</i>	レインダマシモトキ	○	

表-6.2.30 (2) メガロベントスの出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月10, 11, 20, 21, 22日

冬季：令和2年12月7, 8日(干潟) 9, 10, 11日(海域)

凡 例：○=出現

No.	門	綱	目	科	学名	和名	調査季	
							夏季	冬季
61	軟体動物	腹足	新腹足	アッキカ ^イ	<i>Muricodrupa</i> sp.	コウレイシタ ^{マシ}	○	○
62					<i>Drupella conus</i>	シロレイシタ ^{マシ}		○
63					<i>Morula granulata</i>	レイシタ ^{マシ}	○	
64					<i>Morula rumphiusi</i>	カタハリレイシタ ^{マシ}	○	○
65					<i>Thais muricata</i>	ウニレイシタ ^{マシ}	○	○
66					<i>Thais squamosa</i>	コイワニシ	○	○
67				オニコフ ^{シカ} イ	<i>Vasum turbinellum</i>	コオニコフ ^シ		○
68					<i>Euplica scripta</i>	フトコロカ ^イ	○	○
69					<i>Pyrene flava</i>	ムシエビ	○	○
70					<i>Pyrene testudinaria tylerae</i>	マツムシ	○	○
71				ムシロカ ^イ	Columbellidae	フトコロカ ^イ 科	○	
72					<i>Nassarius coronatus</i>	イホ ^{ヨフ} バ ^イ	○	
73					<i>Niotha albescens</i>	アワムシロ	○	
74					<i>Niotha nodifer</i>	ヒメオリレムシロ	○	○
75					<i>Niotha semisulcata</i>	アワムシロ	○	○
76				エゾ ^バ イ	<i>Telasco limnaeiformis</i>	ヨフバ ^イ モト ^キ	○	
77					<i>Enzinopsis lineata</i>	ノシメナ	○	
78					<i>Engina mendicaria</i>	ノシカ ^イ	○	○
79					<i>Cantharus fumosus</i>	ホラタ ^{マシ}		○
80				イトマキボ ^ラ	<i>Japeuthria cingulata</i>	シマベ ^{ツコウ} バ ^イ	○	○
81					<i>Pleuroploca trapezium trapezium</i>	イトマキボ ^ラ		○
82				マクラカ ^イ	<i>Oliva annulata</i>	サツマヒ ^ナ	○	
83					<i>Imbricaria vanikorensis</i>	チョウチンフデ ^{マシ}	○	
84					<i>Costellaria exasperata</i>	ハマヅ ^ト	○	○
85				イモカ ^イ	<i>Conus litteratus</i>	アンボ ^{ンク} ロキ ^メ	○	
86					<i>Conus characteristicus</i>	カラクサイモ	○	
87					<i>Conus quercinus</i>	ロウソクカ ^イ	○	
88					<i>Conus fulgetrum</i>	サヤカ ^{タイ} モ	○	
89					<i>Conus coronatus</i>	ジュ ^{ユス} カ ^カ サヤカ ^{タイ} モ	○	
90					<i>Conus arenatus</i>	コモンイモ		○
91					<i>Conus flavidus</i>	キヌカツキ ^イ モ		○
92					<i>Conus lividus</i>	イホ ^シ マイモ		○
93					<i>Conus pennaceus</i>	アジ ^ロ イモ	○	
94				異旋	トウカ ^{タカ} イ	オオクチケレ		○
95				囊舌	チト ^リ ミト ^リ カ ^イ	チト ^リ ミト ^リ カ ^イ	○	○
96					コ ^{クラ} クミト ^リ カ ^イ	タヌ ^シ ミト ^リ カ ^イ	○	○
97			裸鰓	イロウミウシ	<i>Ceratosoma sinuata</i>	ミアミウミウシ	○	
98				イホ ^ウ ミウシ	<i>Phyllidiella pustulosa</i>	コイホ ^ウ ミウシ	○	○
99				ヨツシ ^ミ ウミウシ	<i>Pteraeolidia ianthina</i>	ムカデ ^ミ ウミウシ		○
100				-	Aeolidacea	ミノウミウシ亜目	○	
101			収柄眼	イゾアワモチ	Onchidiidae	イゾアワモチ科	○	○
102		掘足	ゾウケ ^ツ ノカ ^イ	ゾウケ ^ツ ノカ ^イ	Dentaliidae	ゾウケ ^ツ ノカ ^イ 科	○	
103		二枚貝	フネカ ^イ	フネカ ^イ	<i>Barbatia lima</i>	エカ ^イ	○	○
104					<i>Barbatia virescens</i>	カリカ ^ネ エカ ^イ	○	○
105					<i>Barbatia fusca</i>	ベ ^ニ エカ ^イ		○
106				タマキカ ^イ	<i>Glycymeris reevei</i>	ソメワケ ^リ		○
107			イカ ^イ	イカ ^イ	<i>Septifer bilocularis</i>	クシ ^{ヤク} カ ^イ	○	
108					<i>Hormomya mutabilis</i>	ヒバ ^リ カ ^イ モト ^キ	○	○
109					<i>Modiolus auriculatus</i>	リュウキュウヒバ ^リ カ ^イ	○	○
110			ウケ ^イ スカ ^イ	ウケ ^イ スカ ^イ	<i>Pinctada maculata</i>	ミト ^リ アオリ	○	○
111					<i>Isognomon acutirostris</i>	ヘリトリアオリ	○	○
112				マクカ ^イ	<i>Isognomon ephippium</i>	マクカ ^イ	○	○
113					<i>Pinna muricata</i>	イワカワハコ ^ロ モ	○	
114			カキ	ネズ ^ミ ノテ	<i>Plicatula australis</i>	カスリイシカ ^キ モト ^キ	○	○
115					<i>Ostrea subucula</i>	チャワンカ ^キ	○	○
116					<i>Saccostrea mordax</i>	オハク ^ロ カ ^キ	○	○
117					<i>Dendrostrea frons</i>	ワニカ ^イ	○	○
118					Ostreidae	イタホ ^カ キ科	○	○
119			マルスタ ^レ カ ^イ	ウキカ ^イ	<i>Anodontia edentula</i>	カブ ^ラ ウキカ ^イ	○	
120				フタバ ^シ ラカ ^イ	Ungulinidae	フタバ ^シ ラカ ^イ 科	○	

表-6.2.30 (3) メガロベントスの出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月10, 11, 20, 21, 22日

冬季：令和2年12月7, 8日(干潟) 9, 10, 11日(海域)

凡 例：○=出現

No.	門	綱	目	科	学名	和名	調査季		
							夏季	冬季	
121	軟体動物	二枚貝	マルスタレガイ	ウロコガイ	<i>Ehippodonta gigas</i>	オオツウウロコガイ		○	
122					<i>Lepirotides layardi</i>	ミナミウロコガイ	○		
123					Galeommatidae	ウロコガイ科	○	○	
124				サトルガイ	<i>Fragum unedo</i>	カワラガイ	○	○	
125					<i>Fragum lochooanum</i>	オキナワヒシガイ	○		
126					<i>Fragum mundum</i>	クサビヒシガイ		○	
127					<i>Fulvia australis</i>	ホタンガイ	○	○	
128				シヤコガイ	<i>Tridacna crocea</i>	ヒメシヤコガイ		○	
129				ハカガイ	<i>Mactra cuneata</i>	タママキガイ	○	○	
130					<i>Mactra maculata</i>	リュウキュウハカガイ	○		
131					<i>Mactra</i> sp.	オトメタママキ		○	
132					<i>Meropesta nicobarica</i>	ユキガイ	○		
133				チドリマスオ	<i>Atactodea striata</i>	イソハマケリ	○	○	
134					<i>Coecella chinensis</i>	クチハカガイ	○	○	
135				ニッコウガイ	<i>Tellinella staurella</i>	ヒメニッコウガイ	○		
136					<i>Serratina capsoides</i>	スノメイチョウシタリ	○		
137					<i>Quidnipagus palatam</i>	リュウキュウシタリ	○	○	
138					Tellinidae	ニッコウガイ科	○	○	
139				アサシガイ	<i>Semele carnicolor</i>	サメザラモドキ	○	○	
140				シオササナミ	<i>Psammoteaea elongata</i>	マスカガイ	○	○	
141					<i>Asaphis violascens</i>	リュウキュウマスオ	○	○	
142					<i>Soletellina petalina</i>	アシベマスオ	○		
143				ハナクモリ	<i>Glaucanome chinensis</i>	ハナクモリ	○	○	
144				マルスタレガイ	<i>Gafrarium tumidum</i>	アラスジケマンガイ		○	
145					<i>Gafrarium pectinatum</i>	ホソシイナミガイ	○	○	
146					<i>Gafrarium dispar</i>	イナミガイ	○		
147					<i>Bonartemis histrio histrio</i>	オイノカガミ	○	○	
148					<i>Tapes belcheri</i>	ヒメリュウキュウアサリ	○	○	
149					<i>Ruditapes variegatus</i>	ヒメアサリ	○		
150					<i>Katelysia hiantina</i>	ヤエヤマスタレ	○	○	
151					<i>Irus macrophyllus</i>	ハネマツカセ	○	○	
152					<i>Cyclina</i> sp.	ダテオキシジミ		○	
153					オオノガイ	ツクエガイ	Gastrochaenidae	ツクエガイ科	○
154	星口動物	スジホシムシ	スジホシムシ	<i>Siphonosoma</i> sp.	スジホシムシモドキ属	○	○		
155		—	—	—	SIPUNCULA	星口動物門	○	○	
156	ユムシ動物	—	キタユムシ	<i>Listriolobus riukuensis</i>	タテジマユムシ		○	○	
157		—	—	—	ECHIURA	ユムシ動物門	○	○	
158	環形動物	多毛	サンバコガイ	ウロコムシ	Polynoidae	ウロコムシ科	○	○	
159				コガイ	<i>Ceratonereis erythraeensis</i>	コケコガイ	○	○	
160					Nereididae	コケカイ科	○	○	
161				チロリ	<i>Glycera</i> sp.	Glycera属	○	○	
162			ウミケムシ	ウミケムシ	Amphinomidae	ウミケムシ科	○	○	
163			イソメ	ギボシイソメ	Lumbrineridae	ギボシイソメ科	○	○	
164			イトコガイ	イトコガイ	Capitellidae	イトコガイ科	○	○	
165				タケフシコガイ	Maldanidae	タケフシコガイ科	○	○	
166			ケヤリムシ	ケヤリムシ	<i>Hypsicomus phaeotaenia</i>	ナリクテケヤリ	○	○	
167					Sabellidae	ケヤリムシ科	○	○	
168				カンザシコガイ	Spirorbinae	ウスマキコガイ亜科	○	○	
169					Serpulidae	カンザシコガイ科	○	○	
170				—	—	POLYCHAETA	多毛綱	○	○
171	節足動物	クモ	クモ	ウシオクモ	<i>Desis japonica</i>	ヤマトウシオクモ		○	
172		顎脚	有柄	ヒメホシガイ	<i>Octolasmis unguisiformis</i>	メナカオサガニハサミエホシ		○	
173		軟甲	口脚	フトエビシヤコ	<i>Gonodactylellus viridis</i>	コトケフトエビシヤコ	○	○	
174				Gonodactylidae		フトエビシヤコ科	○	○	
175		端脚	—	—	Amphipoda	端脚目	○	○	
176		十脚	クルマエビ		<i>Melicertus latisulcatus</i>	フトミゾエビ		○	
177			テナカエビ		<i>Periclimenella spinifera</i>	エンマカクレエビ	○	○	
178					<i>Periclimenes</i> sp.	ホンカクレエビ属	○	○	
179				テッポウウエビ		<i>Alpheus lobidens</i>	イソテッポウウエビ	○	○
180						<i>Alpheus</i> sp.	テッポウウエビ属	○	○

表-6.2.30 (4) メガロベントスの出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月10, 11, 20, 21, 22日

冬季：令和2年12月7, 8日(干潟) 9, 10, 11日(海域)

凡 例：○=出現

No.	門	綱	目	科	学名	和名	調査季	
							夏季	冬季
181	節足動物	軟甲	十脚	モエビ [°]	<i>Saron marmoratus</i>	フシウデ [°] サンコ [°] モエビ [°]	○	○
182					Hippolytidae	モエビ [°] 科	○	○
183				アナエビ [°]	Axiidae	アナエビ [°] 科	○	○
184				ハサミシヤコエビ [°]	<i>Laomedia astacina</i>	ハサミシヤコエビ [°]		○
185				スナモク [°] リ	<i>Paratrypaea bouvieri</i>	ブ [°] ヒ [°] エスナモク [°] リ	○	○
186					Callianassidae	スナモク [°] リ科	○	○
187				ヤト [°] カリ	<i>Calcinus laevimanus</i>	スベ [°] スベ [°] サンコ [°] ヤト [°] カリ	○	○
188					<i>Calcinus latens</i>	ツマシ [°] ロサンコ [°] ヤト [°] カリ	○	○
189					<i>Clibanarius englaucus</i>	ツマキヨコハ [°] サミ	○	○
190					<i>Clibanarius humilis</i>	マダ [°] ラヨコハ [°] サミ	○	○
191					<i>Clibanarius longitarsus</i>	ツメナカ [°] ヨコハ [°] サミ	○	○
192					<i>Clibanarius rhabdodactylus</i>	シマヨコハ [°] サミ	○	
193					<i>Clibanarius striolatus</i>	タデシ [°] マヨコハ [°] サミ	○	○
194					<i>Clibanarius</i> sp.	ヨコハ [°] サミ属	○	○
195					<i>Diogenes avarus</i>	マルテツノヤト [°] カリ	○	
196					<i>Diogenes leptocerus</i>	アンハ [°] ルツノヤト [°] カリ	○	○
197					<i>Diogenes pallescens</i>	<i>Diogenes pallescens</i>	○	○
198				オカヤト [°] カリ	<i>Coenobita rugosus</i>	ナキオカヤト [°] カリ	○	
199				ホンヤト [°] カリ	<i>Pagurixus haigae</i>	<i>Pagurixus haigae</i>	○	○
200					<i>Pagurus angustus</i>	キカホンヤト [°] カリ	○	○
201					<i>Pagurus minutus</i>	ユビ [°] ナカ [°] ホンヤト [°] カリ	○	○
202					Paguridae	ホンヤト [°] カリ科	○	○
203				-	Paguroidea	ホンヤト [°] カリ上科	○	
204				コシオリエビ [°]	<i>Galathea mauritiana</i>	ホクロコシオリエビ [°]	○	○
205					Galatheidae	コシオリエビ [°] 科	○	○
206				カニタ [°] マシ	<i>Petrolisthes hastatus</i>	ミナミカニタ [°] マシ	○	○
207				カラッパ [°]	<i>Calappa hepatica</i>	ツデ [°] カラッパ [°]	○	
208				キンセンカ [°] ニ	<i>Ashtoret lunaris</i>	コモンカ [°] ニ	○	
209				モカ [°] ニ	<i>Huenia heraldica</i>	コノハカ [°] ニ	○	○
210					<i>Menaethius monoceros</i>	イッカクカ [°] ニ	○	○
211				ヤワラカ [°] ニ	<i>Neorhynchoplax okinawaensis</i>	オキナワヤワラカ [°] ニ	○	
212				ワタリカ [°] ニ	<i>Cycloachelous granulatus</i>	サメハタ [°] ヒメカ [°] サ [°] ミ	○	○
213					<i>Cycloachelous</i> sp.	サメハタ [°] ヒメカ [°] サ [°] ミ属	○	○
214					<i>Scylla olivacea</i>	アカデノコキ [°] リカ [°] サ [°] ミ	○	
215					<i>Thalamita admete</i>	フタバ [°] ベ [°] ニツケモト [°] キ	○	○
216					<i>Thalamita danae</i>	ミナミベ [°] ニツケモト [°] キ	○	○
217					<i>Thalamita integra</i>	ヒメフタバ [°] ベ [°] ニツケカ [°] ニ	○	○
218					<i>Thalamita stephensoni</i>	ステフェンソンベ [°] ニツケカ [°] ニ		○
219					<i>Thalamita</i> sp.	ベ [°] ニツケカ [°] ニ属	○	○
220					<i>Epixanthus frontalis</i>	セビ [°] ロオウキ [°] カ [°] ニ	○	○
221					<i>Actumnus</i> sp.	イホ [°] テカ [°] ニ属	○	○
222					<i>Pilumnus</i> sp.	ケブ [°] カカ [°] ニ属	○	○
223				オウキ [°] カ [°] ニ	<i>Chlorodiella barbata</i>	ケブサテナカ [°] オウキ [°] カ [°] ニ	○	○
224					<i>Chlorodiella nigra</i>	クロテナカ [°] オウキ [°] カ [°] ニ		○
225					<i>Chlorodiella</i> sp.	テナカ [°] オウキ [°] カ [°] ニ属	○	○
226					<i>Phymodius monticulosus</i>	ヒツ [°] メオウキ [°] カ [°] ニモト [°] キ	○	○
227					<i>Etisus demani</i>	テ [°] マンヒツ [°] メカ [°] ニ	○	○
228					<i>Etisus electra</i>	ヒメヒツ [°] メカ [°] ニ	○	○
229					<i>Etisus laevimanus</i>	ヒツ [°] メカ [°] ニ	○	○
230					<i>Etisus</i> sp.	ヒツ [°] メカ [°] ニ属	○	○
231					<i>Leptodius exaratus</i>	オウキ [°] カ [°] ニ	○	○
232					<i>Leptodius gracilis</i>	コオウキ [°] カ [°] ニ	○	○
233					Xanthidae	オウキ [°] カ [°] ニ科	○	○
234				サンコ [°] カ [°] ニ	Trapeziidae	サンコ [°] カ [°] ニ科	○	○
235				イワカ [°] ニ	<i>Metopograpsus thukuhar</i>	ハシリイワカ [°] ニモト [°] キ	○	○
236					Grapsidae	イワカ [°] ニ科	○	○
237				モクス [°] カ [°] ニ	<i>Helice formosensis</i>	タイワンアシハラカ [°] ニ	○	○
238					<i>Gaetice unguatus</i>	オキナワヒライイワカ [°] ニ	○	○
239					<i>Thalassograpsus harpax</i>	ミナミヒライイワカ [°] ニ	○	○
240					<i>Pseudograpsus elongatus</i>	コウナカ [°] イワカ [°] ニモト [°] キ	○	○

表-6.2.30 (5) メガロベントスの出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月10, 11, 20, 21, 22日

冬季：令和2年12月7, 8日(干潟) 9, 10, 11日(海域)

凡 例：○=出現

No.	門	綱	目	科	学名	和名	調査季		
							夏季	冬季	
241	節足動物	軟甲	十脚	ミナミメツキカニ	<i>Mictyris brevidactylus</i>	ミナミメツキカニ	○	○	
242				コメツキカニ	<i>Scopimera ryukyuensis</i>	リュウキュウコメツキカニ	○	○	
243					<i>Tmethypocoelis choreutes</i>	ツノメチコカニ	○	○	
244				スナカニ	<i>Ocypode cordimana</i>	ミナミスナカニ	○		
245					<i>Uca dussumieri</i>	ヤエヤマシオマネキ	○		
246					<i>Uca perplexa</i>	オキナワハクセンシオマネキ	○	○	
247					<i>Uca tetragonon</i>	ルリマダラシオマネキ		○	
248					<i>Uca vocans</i>	ヒメシオマネキ	○	○	
249				オサカニ	<i>Chaenostoma boscii</i>	ヒメカクオサカニ	○	○	
250					<i>Macrophthalmus convexus</i>	フタハオサカニ	○	○	
251					<i>Macrophthalmus milloti</i>	ミナミメナカオサカニ	○	○	
252					<i>Macrophthalmus serenei</i>	メナカオサカニ	○		
253					<i>Macrophthalmus banzai</i>	ヒメヤマトオサカニ	○	○	
254					Macrophthalmidae	オサカニ科	○	○	
255	半索動物	ギボシムシ	—	—	ENTEROPNEUSTA	ギボシムシ綱	○	○	
256	棘皮動物	ウミユリ	ウミシダ	—	Comatulida	ウミシダ目	○	○	
257			ヒトデ	アカヒトデ	アカヒトデ	<i>Fromia indica</i>	アミシユスヘリヒトデ	○	○
258						<i>Linckia laevigata</i>	アオヒトデ	○	○
259			クモヒトデ	クモヒトデ	スナクモヒトデ	Amphiuridae	スナクモヒトデ科	○	○
260				フサクモヒトデ	<i>Ophiocoma erinaceus</i>	クロクモヒトデ	○	○	
261					<i>Ophiocoma pica</i>	ホウシヤクモヒトデ		○	
262					<i>Ophiomastix janualis</i>	オニクモヒトデ		○	
263			—	—	OPHIUROIDEA	クモヒトデ綱	○	○	
264			ウニ	ホンウニ	サンショウウニ	Temnopleuridae	サンショウウニ科		○
265					ナカウニ	<i>Echinometra mathaei</i>	ホンナカウニ	○	○
266						<i>Echinometra</i> sp. A	ツマシロナカウニ	○	○
267						<i>Echinometra</i> sp. C	リュウキュウナカウニ	○	○
268						<i>Echinostrephus molaris</i>	タワシウニ	○	○
269				タコノマクラ	カシハシ	<i>Peronella</i> sp.	ヨツアナカシハシ属		○
270		ナマコ	楯手	クロナマコ	<i>Bohadschia vitiensis</i>	チヌナマコ		○	
271					<i>Holothuria atra</i>	クロナマコ	○		
272					<i>Holothuria scabra</i>	ハネジナマコ	○		
273					<i>Holothuria leucospilota</i>	ニセクロナマコ	○	○	
274					<i>Holothuria hilla</i>	リュウキュウフジナマコ		○	
275			無足	クルマナマコ	<i>Polycheira rufescens</i>	ムラサキクルマナマコ		○	
276	脊索動物	ホヤ	マメホヤ	ウスホヤ	<i>Didemnum molle</i>	チャツホホヤ	○	○	
277					<i>Trididemnum paracyclops</i>	ミドリミスジウスホヤ	○	○	
278					Didemnidae	ウスホヤ科	○	○	
279				ヘンゲホヤ	<i>Clavelina cyclus</i>	ワモンツツホヤ	○	○	
280					<i>Eudistoma gilboviride</i>	ファイリカイメンホヤ	○	○	
281					Polycitoridae	ヘンゲホヤ科	○	○	
282				ナツメホヤ	Asciidiidae	ナツメホヤ科	○	○	
283			マホヤ	イタホヤ	Botryllidae	イタホヤ科	○	○	
284				シロホヤ	<i>Polycarpa cryptocarpa cryptocarpa</i>	ミナミクロホヤ		○	
285					Styelidae	シロホヤ科	○	○	
286				マホヤ	<i>Herdmania</i> sp.	ヘニホヤ属	○	○	
287					<i>Pyura curvigona</i>	ミナミカラスホヤ		○	
288					Pyuridae	マホヤ科	○	○	
出現種類数							248	233	

表－6. 2. 31 (1) メガロベントスの地点別出現状況 (夏季)

調査日：令和2年7月10, 11, 20, 21, 22日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+=21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

No.	和名	調査地点														
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
1	モミジスナコ	R	R	R			R									
2	普通海綿綱	R	R	R	R		R		R				R			R
3	ハネミヒト						R									
4	ミナミエタウミヒト	R		R			R									
5	サカサクラゲ					r										
6	カクサカ属			R												
7	ムシモトキギンチャク科															r
8	オヨギイソギンチャク					r										
9	ウメボシイソギンチャク科				rr											rr
10	チクビイソギンチャク			R												
11	マメハタコイソギンチャク						rr									
12	多岐腸目			rr	rr							rr				
13	紐形動物門							rr	rr		rr	rr				
14	外肛動物門		R				R									
15	ウスビサ		rr	rr	rr				rr				+			r
16	リュウキュウアオガイ												+			
17	リュウキュウシボリガイ												rr			
18	タイワンシボリガイ												r			
19	クルマチクサ		r	rr												
20	オキナワイシクダミ							+					+			
21	イワカリチクサ		rr													
22	ヒメアワヒ			rr												
23	ヒラヒメアワヒ		rr													
24	リュウキュウヒメカタヘ		rr													rr
25	コシタカササエ			rr												
26	カンギク												cc			
27	イシタミミアオフネ							cc								
28	キハアマガイ							rr								
29	マルアマオブネ							cc		r	rr		r	+		
30	アマオブネ												+			
31	ニシキアマオブネ							rr								
32	キンランカノコ		rr													
33	クサイロカノコ		rr													
34	メオニツノガイ			rr												
35	ヒメクワノミカニモリ						rr						rr			+
36	カヤノミカニモリ							r					cc			
37	ウミミナカニモリ							rr					+			
38	オニツノガイ科			rr												
39	コマフニナ							cc								
40	リュウキュウウミミナ													cc		
41	フトヘナタリ													cc		
42	ムカシタモト	rr														
43	マカキガイ	r														
44	リュウキュウムカデガイ						c									
45	フタモチヘビガイ			rr												
46	ムカデガイ科	r		+	r				rr		rr					
47	ハナヒラダカラ								rr							
48	キイロダカラ		r													
49	ホウシュノタマ		rr						rr		rr					rr
50	タマガイ科		rr													
51	クシカニモリ		rr				rr									
52	ミツクチキリオリ科			rr												
53	ウネレイシダマシ			rr	rr											rr
54	レイシダマシモドキ												rr			
55	コウレイシダマシ				r											rr
56	レイシダマシ								rr							
57	カクハレイシダマシ															rr
58	ウネレイシダマシ												rr			
59	コイワニシ												r			
60	フトコロガイ	rr	rr				r									

表－6. 2. 31 (2) メガロベントスの地点別出現状況（夏季）

調査日：令和2年7月10, 11, 20, 21, 22日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

No.	和名	調査地点														
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
61	ムシエビ			rr			rr									
62	マツムシ			rr												
63	フトコロカ ^イ 科		rr													
64	イホ ^イ ヨフハ ^イ	rr										rr				
65	アラムシロ				rr											
66	ヒメオリレムシロ	rr				r										
67	アツムシロ									rr						
68	ヨフハ ^イ モト ^キ		rr													
69	ノシメナ			rr												
70	ノシカ ^イ				r								rr			
71	シマヘ ^イ ツコウハ ^イ												cc			
72	サツマヒ ^ナ			rr												
73	チョウチンフデ			rr												
74	ハマヅ ^ト	rr														
75	アンホ ^ン クロサ ^メ		rr													
76	カラクサ ^イ モ			rr												
77	ロウソクカ ^イ	rr														
78	サヤカ ^イ タイモ			rr												
79	シ ^ュ ス ^カ カサヤカ ^イ タイモ								rr							
80	アジ ^ロ イモ						rr									
81	チト ^リ ミト ^リ カ ^イ				rr											
82	タス ^シ ミト ^リ カ ^イ						rr									
83	ミアミウミウシ	rr														
84	コイホ ^ウ ミウシ			rr												
85	ミノウミウシ亜目	rr														
86	イソアワモチ科								rr					rr		
87	ゾ ^ウ ケ ^ツ ノカ ^イ 科					rr										
88	エカ ^イ				rr								rr			
89	カリカ ^ネ エカ ^イ				rr			rr	rr				+			
90	クジ ^ヤ カ ^イ															rr
91	ヒハ ^リ カ ^イ モト ^キ							+								
92	リュウキュウヒハ ^リ カ ^イ								rr							
93	ミト ^リ リアオリ	rr	rr	rr	rr				rr				r			rr
94	ヘリトリアオリ							+					+			
95	マクカ ^イ						rr									
96	イワカワハコ ^ロ モ		rr													
97	カスリイサ ^キ モト ^キ								rr							
98	チャワンカ ^キ			rr												
99	オハク ^ロ カ ^キ							+					+			
100	ワニカ ^イ	rr														
101	イタホ ^カ キ科	rr			r		rr	+	rr				rr			rr
102	カブ ^ラ ツキカ ^イ								rr							
103	フタハ ^シ ラカ ^イ 科														rr	
104	ミナミウロコカ ^イ												rr			
105	ウロコカ ^イ 科	rr											+	rr		
106	カワラカ ^イ								rr						r	
107	オキナワヒシカ ^イ	rr														
108	ホ ^ン タンカ ^イ	rr														
109	タママキカ ^イ	rr							r	rr	rr	+			c	
110	リュウキュウハ ^カ カ ^イ						rr									
111	ユキカ ^イ														rr	
112	イソハマク ^リ							+			rr					
113	クチハ ^カ イ							cc								
114	ヒメニッコウカ ^イ			rr												
115	ヌノメイチョウシラトリ													rr		
116	リュウキュウシラトリ									rr			r			
117	ニッコウカ ^イ 科		rr	rr											rr	
118	サメサ ^ラ モト ^キ								rr				rr			
119	マスオカ ^イ							rr								
120	リュウキュウマスオ												r			

表-6.2.31 (3) メガロベントスの地点別出現状況 (夏季)

調査日：令和2年7月10, 11, 20, 21, 22日

凡 例：rr=1~5個体；r=6~20個体

+=21~50個体；c=51~99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

No.	和名	調査地点														
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
121	アシマスオ									rr					rr	
122	ハナクモリ													rr		
123	ホソジイナミカイ				rr								r			rr
124	イナミカイ			rr												
125	オイノカミ	r	rr		rr	rr			rr						rr	
126	ヒメユキウサリ						rr		rr							
127	ヒメアサリ												rr			
128	ヤエヤマスダレ								rr	rr		rr			rr	rr
129	ハネマツカゼ						rr		rr							
130	ツクエカイ科			rr												
131	スジホシモドキ属							r								
132	星口動物門		rr						rr							
133	ユミシ動物門									rr			rr			
134	ウロコムシ科	rr			rr		rr				rr					
135	コクカイ							rr	rr		r			rr		
136	コカイ科	rr	rr					rr			c	rr			r	rr
137	Glycera 属											rr				
138	ウミケムシ科		rr						rr							
139	ギホシイソム科											rr				rr
140	イトコカイ科								rr							
141	タケフシコカイ科		rr													
142	ナリクラケヤリ				r											
143	ケヤリムシ科				rr		rr									
144	ウスマキコカイ蛭科				r				r				rr			r
145	カンサシコカイ科				rr		rr		r				+			rr
146	多毛綱			rr	rr			rr	rr	rr		rr	rr	rr	rr	
147	コトケフトコビシヤコ				rr											
148	フトビシヤコ科															r
149	端脚目		r		rr				rr							+
150	エンマクレエビ						rr									
151	ホンカクレエビ属		rr													
152	イソテッポウエビ								rr	rr			r	rr		
153	テッポウエビ属	rr	rr		rr				+	rr			+	rr		
154	フシウデサンコモエビ						rr									
155	モエビ科								rr							
156	アナエビ科		rr				rr									
157	ブビエスナモグリ									rr	rr	rr			rr	
158	スナモグリ科									rr	rr	rr				
159	スヘスヘサンコヤトカリ												r			
160	ツマシロサンコヤトカリ	rr			rr		rr		rr							
161	ツマキヨハサミ												cc			
162	マダラヨコハサミ							+					r			
163	ツメカヨコハサミ										rr		r	+		
164	シマヨコハサミ							rr								
165	タデシマヨコハサミ							rr			rr	rr	cc			rr
166	ヨコハサミ属			rr			rr				rr		rr			
167	マルテツノヤトカリ									r						
168	アンハルツノヤトカリ									r						
169	<i>Diogenes pallescens</i>															rr
170	ナキオカヤトカリ							rr								
171	<i>Pagurixus haigae</i>	rr					rr									
172	キカイホヤトカリ										rr					
173	エビナカホヤトカリ									r						
174	ホヤトカリ科				rr					rr	rr					
175	ホヤトカリ上科						r									
176	ホクロコシオリエビ						r									
177	コシオリエビ科	rr	rr	rr			rr									
178	ミナミカニダマシ												r			
179	ゾデカラッパ														rr	
180	コモンカニ														rr	

表－6. 2. 31 (4) メガロベントスの地点別出現状況（夏季）

調査日：令和2年7月10, 11, 20, 21, 22日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

No.	和名	調査地点														
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
181	コノハカ ^ニ			rr												
182	イツカカ ^ニ			rr												
183	オキナワヤウカ ^ニ												rr			
184	サメハタ ^{ヒメカ^ニサ^ニミ}								rr						rr	
185	サメハタ ^{ヒメカ^ニサ^ニミ属}														rr	
186	アカテノキ ^{リカ^ニサ^ニミ}													rr		
187	フタバ ^{ベ^ニツケモト^ニキ}	rr	rr		rr		rr		rr						rr	r
188	ミナミ ^{ベ^ニツケモト^ニキ}					rr				rr	rr	rr	rr		rr	
189	ヒメフタバ ^{ベ^ニツケカ^ニ}		rr						rr			rr				rr
190	ベ ^ニ ツケカ ^ニ 属		rr													
191	セビ ^{ロウキ^ニカ^ニ}							rr								
192	イボ ^{テカ^ニ属}								rr							
193	ケフ ^{カ^ニ属}	r			rr		rr									
194	ケフサテナ ^{ガ^ニオウキ^ニカ^ニ}	rr					rr									
195	テナカ ^{オウキ^ニカ^ニ属}						rr									
196	ヒツ ^{メオウキ^ニカ^ニモト^ニキ}	rr														
197	デ ^{マンヒツ^{メカ^ニ}}		rr		rr		rr		rr							
198	ヒメヒツ ^{メカ^ニ}		rr		r		rr		rr							r
199	ヒツ ^{メカ^ニ}				rr		rr						r			
200	ヒツ ^{メカ^ニ属}	rr	rr	rr			rr									rr
201	オウキ ^{カ^ニ}		rr					rr					+			rr
202	コオウキ ^{カ^ニ}		rr		rr		rr	rr					rr			
203	オウキ ^{カ^ニ科}	rr	r	rr	rr						rr					rr
204	サンコ ^{カ^ニ科}			rr			rr									
205	ハシリイワカ ^{ニモト^ニキ}							rr								
206	イワカ ^{ニ科}							rr								
207	タイワンアシハラカ ^ニ													rr		
208	オキナワヒライワカ ^ニ												r			
209	ミナミヒライワカ ^ニ												r			
210	コウナカ ^{イワカ^ニモト^ニキ}							rr								
211	ミナミコメツキカ ^ニ										r	r				
212	リュウキュウコメツキカ ^ニ								rr	rr	+			rr		
213	ツノメチコ ^{カ^ニ}													cc		
214	ミナミスナカ ^ニ											rr				
215	ヤエヤマシオマネキ													rr		
216	オキナワハセンシオマネキ													+		
217	ヒメシオマネキ							rr						+		
218	ヒメカクオサカ ^ニ								rr	rr						
219	フタバオサカ ^ニ											+				
220	ミナミメナカ ^{オサカ^ニ}								+	cc	r				r	
221	メナカ ^{オサカ^ニ}				r		rr									rr
222	ヒメヤマトオサカ ^ニ													rr		
223	オサカ ^{ニ科}										rr	rr				rr
224	ギ ^{ホ^ニシムシ綱}		+													rr
225	ウミシタ ^目			rr												
226	アミメジ ^{ユズ^{ヘ^ニリヒトテ}}			rr												
227	アオヒトテ			rr												
228	スナクモヒトテ ^科						rr									
229	クロクモヒトテ			r												
230	クモヒトテ ^綱		rr	rr			rr									rr
231	ホシナカ ^{ウニ}			r												
232	ツマジ ^{ロナカ^{ウニ}}			r												
233	リュウキュウナカ ^{ウニ}			rr												
234	タワシウニ			rr												
235	クロナマコ	rr														
236	ハネジ ^{ナマコ}					rr										
237	ニセクロナマコ				rr		rr									
238	チャツホ ^{ホ^ニヤ}			R												
239	ミト ^{リミスシ^{ウスホ^ニヤ}}			R												
240	ウスホ ^{ニヤ科}	R	R	R	R		R						R			R

表ー6.2.31 (5) メガロベントスの地点別出現状況（夏季）

調査日：令和2年7月10, 11, 20, 21, 22日

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

No.	和名	調査地点														
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
241	ワモンツボヤ			rr												
242	フイリカイメンボヤ			R			R									
243	ヘンゲボヤ科		R													
244	ナツメボヤ科	rr		r									rr			r
245	イタボヤ科						R						R			
246	シロボヤ科	rr		rr												rr
247	ヘニボヤ属			rr	rr				rr							
248	マボヤ科	rr														
出現種類数		38	44	55	38	7	47	31	43	21	22	19	53	20	18	36

表－ 6. 2. 32 (1) メガロベントスの地点別出現状況（冬季）

調査日：令和2年12月7, 8日（干潟）9, 10, 11日（海域）

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

No.	和名	調査地点														
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
1	モシコ	R	R	R			R									
2	普通海綿綱	R	R	R	R		R		R				R			R
3	ハネミヒトラ						R									
4	ミナミエタウミヒトラ	R		R			R									
5	カタサカ属			R												
6	タチワスギンチャク						r									
7	ムシモトギギンチャク科															r
8	ウメボシイソギンチャク科	rr			rr											rr
9	チクヒイソギンチャク			R												
10	マハタコイソギンチャク						rr									
11	多岐腸目	rr		rr									rr			
12	紐形動物門							rr	rr		rr	rr	rr			
13	外肛動物門		R				R									
14	シリブトヒサウガイ		rr													
15	ウスヒサウガイ						rr		rr				+			rr
16	リュウキュウアカガイ												+			
17	リュウキュウホリガイ												rr			
18	タイワンシホリガイ												rr			
19	ニシキウス			rr												
20	ウスイチモンシ			rr												
21	クルマチグサ		r	rr												
22	オキナワシダタミ							rr								
23	イワカワチグサ		rr													
24	ヒメアワビ			rr												
25	フルヤガイ															rr
26	リュウキュウヒメカタハ		rr													
27	コシタカササエ			rr												
28	カンキク												c			
29	イシタタミアマオブネ							c								
30	キハアマガイ							rr								
31	マルアマオブネ							cc		rr	rr		r	+		
32	ニシキアマオブネ							rr								
33	メオニツノガイ			rr												
34	ヒメクワノミカニモリ			rr			rr						r			
35	カヤノミカニモリ							r					c			
36	オニツノガイ科			rr												
37	コマフニナ							cc								
38	リュウキュウミニナ													cc		
39	フトヘナタリ													c		
40	リュウキュウカタガイ						c									
41	フタモチヘビガイ			rr												
42	ムカデガイ科	+		+	r				rr		rr					
43	ナツメタカラ						rr									
44	キイロタカラ	rr	r		rr											
45	ホウシュノタマ		rr													rr
46	ケンカニモリ						rr									
47	ミツクチキリオレ科	rr		rr												
48	ウネレイシダマシ				rr			rr								rr
49	コウレイシダマシ				r											rr
50	シロレイシダマシ			rr												
51	カタハリレイシダマシ															rr
52	ウネレイシダマシ												rr			
53	コイワニシ												r			
54	コオニコフシ			rr												
55	フトコロガイ	r	rr				r									
56	ムシエビ			rr			rr									
57	マツムシ			rr												
58	ヒメオリイムシロ	rr				r									rr	
59	アツムシロ									rr						
60	ノシガイ				r											

表－ 6. 2. 32 (2) メガロベントスの地点別出現状況（冬季）

調査日：令和2年12月7, 8日（干潟）9, 10, 11日（海域）

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

No.	和名	調査地点														
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
61	ホラダマシ			rr												
62	シマヘッコウハクイ												c			
63	イトマキボウ					rr										
64	ハマヅト	rr														
65	コモンイモ		rr													
66	キヌカツギイモ			rr			rr									
67	イモシマイモ			rr												
68	オオクサキレ		rr													
69	チトリスミドリカクイ			rr												
70	タスシミドリカクイ						rr									
71	コイボウミウシ			rr												
72	ムカデミノウミウシ	rr		rr			rr									
73	イソワカモチ科							rr	rr							
74	エカクイ				rr								rr			
75	カリカクネカクイ				r			rr	rr				+			
76	ベニエカクイ	rr														
77	ソメワケケリ	rr														
78	ヒバカリイモトキ							+								
79	リュウキュウヒバカリカクイ								rr							
80	ミドリリアオリ	rr	rr	rr					rr				rr			rr
81	ヘリリアオリ							+		rr			+			
82	マカクイ						rr									
83	カスリイシカクモトキ								rr							
84	チャワンカクキ			rr												
85	オハクワロカクキ							+					+			
86	ワニカクイ	rr														
87	イタボカクキ科	rr			r		rr	+	rr				rr			rr
88	オオツヤウロコカクイ												rr			
89	ウロコカクイ科	rr							rr				rr	rr		
90	カリラカクイ	rr							rr						r	
91	クサヒビシカクイ			rr												
92	ホタンカクイ	rr														
93	ヒメシヤコカクイ			rr												
94	タマカクイ								rr	rr	r	+			+	
95	オトメタママキ														rr	
96	イソハマケリ							r								
97	クチバカクイ							cc								
98	リュウキュウシブトリ									rr			r			
99	ニッコウカクイ科			rr												
100	サメサラムトキ								rr				rr			
101	マスオカクイ							rr								
102	リュウキュウマスオ							rr					r			
103	ハナクモリ													rr		
104	アラスシケマンカクイ												rr			
105	ホソスシイナミカクイ				rr								r			rr
106	オイノカクミ	rr					rr		rr	rr					r	
107	ヒメリュウキュウアサリ				rr											
108	ヤエヤマタレ								rr	rr					rr	rr
109	ハネマツカセ						rr		rr							
110	ダテオキシシミ													rr		
111	ツクエカクイ科			rr												
112	スジホシモトキ属							r								
113	星口動物門		rr						rr							
114	タデシマユムシ												rr			
115	ユムシ動物門								rr	rr	rr		rr			rr
116	ウロコムシ科	rr			rr		rr		rr							
117	コケコカイ							rr	rr		r			rr		
118	コカイ科	rr	rr					rr			r	rr			r	rr
119	<i>Glycera</i> 属											rr				
120	ウミケムシ科		rr						rr							

表ー 6.2.32 (3) メガロベントスの地点別出現状況 (冬季)

調査日：令和2年12月7,8日(干潟) 9,10,11日(海域)

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

No.	和名	調査地点														
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
121	ギボシイメ科											rr				rr
122	イトゴカイ科								rr							
123	タケフシコカイ科		rr													
124	ナリクサヤリ				r											rr
125	ケヤリムシ科				rr											
126	ウスマキコカイ亜科				r		rr		r				rr			r
127	カンザシコカイ科				rr		rr		r				+			
128	多毛綱			rr			rr	rr	rr	rr		rr	rr	rr	rr	
129	ヤマトウシオクモ													rr		
130	メナガオサカニハサミエボシ										rr					
131	コトケフトエビシヤコ				rr		rr									
132	フトエビシヤコ科				rr											rr
133	端脚目		r	rr	rr				rr				r			+
134	フトミシエビ									r						
135	エンマカクレエビ		rr				rr									
136	ホンカクレエビ属		rr													
137	イソテッポウエビ								rr	rr			r	rr		
138	テッポウエビ属	rr							rr	rr	rr		+	rr		
139	フシウチサンゴモエビ		rr				rr									
140	モエビ科								rr				rr			
141	アナエビ科		rr				rr									
142	ハサミシヤコエビ													rr		
143	フビエスナモグリ										rr	rr			rr	
144	スナモグリ科										rr	rr			rr	
145	スヘスヘサンゴヤトカリ												r			
146	ツマジロサンゴヤトカリ	rr	rr	rr	rr		rr		rr							r
147	ツマキヨコハサミ												cc			
148	マダラヨコハサミ							+	rr				r			
149	ツメナカヨコハサミ										rr	rr	r	+		
150	タテジマヨコハサミ							rr	rr		rr		cc			rr
151	ヨコハサミ属			rr			rr				rr		rr			
152	アンバルトツノヤトカリ									r						
153	<i>Diogenes pallescens</i>			rr	rr											rr
154	<i>Pagurixus haigae</i>	rr					rr									
155	キカイホシヤトカリ												rr			
156	ユビナカホシヤトカリ								r				rr			
157	ホシヤトカリ科				rr		r			rr	rr					
158	ホクロコシオリエビ						r									
159	コシオリエビ科	rr	rr	rr			rr									
160	ミナミカニダマシ												r			
161	コノハカニ			rr												
162	イッカクカニ			rr												
163	サメハカヒメカサミ									rr						
164	サメハカヒメカサミ属	rr													rr	
165	フタバヘニツケモドキ	rr	rr		rr		rr		rr							r
166	ミナミヘニツケモドキ									rr	rr		rr			rr
167	ヒメフタバヘニツケカニ		rr						rr				rr			rr
168	ステフェンソンヘニツケカニ		rr				rr		rr							
169	ヘニツケカニ属	rr	rr													
170	セビロウキカニ							rr								
171	イボテカニ属		rr				rr									
172	ケブカカニ属	r			rr		rr									
173	ケブサデナカオウキカニ	r					rr									
174	クロデナカオウキカニ						rr									
175	テナカオウキカニ属						rr									
176	ヒツメオウキカニモドキ	rr														
177	デマンヒツメカニ		rr		rr		rr		rr							
178	ヒメヒツメカニ		rr		r		rr		rr							r
179	ヒツメカニ				rr		rr						r			
180	ヒツメカニ属	rr	rr	rr			rr									rr

表－ 6. 2. 32 (4) メガロベントスの地点別出現状況（冬季）

調査日：令和2年12月7, 8日(干潟) 9, 10, 11日(海域)

凡 例：rr=1～5個体；r=6～20個体

+ =21～50個体；c=51～99個体

cc=100個体以上；R=被度5%未満

No.	和名	調査地点														
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
181	オウギ ^カ ニ		rr					rr					+			rr
182	コオウギ ^カ ニ		rr		rr		rr	rr					rr			rr
183	オウギ ^カ ニ科	rr	r	rr	rr			rr			rr					rr
184	サソコ ^カ ニ科			rr			rr									
185	ハシリイワ ^カ ニモト ^キ							rr								
186	イワ ^カ ニ科							rr								
187	タイワンアシハラ ^カ ニ													rr		
188	オキナリヒライソ ^カ ニ										rr		r			
189	ミナミヒライソモト ^キ												rr			
190	コウナカ ^カ ニイワ ^カ ニモト ^キ										rr					
191	ミナミコメツ ^カ ニ										r	rr				
192	リュウキュウコメツ ^カ ニ									rr		rr		rr		
193	ツノメチコ ^カ ニ													c		
194	オキナリハクセンシオマネ ^キ							rr						+		
195	ルリマダ ^ラ シオマネ ^キ							rr								
196	ヒメシオマネ ^キ													+		
197	ヒメカクオサ ^カ ニ								rr	rr						
198	フタハオサ ^カ ニ											rr				
199	ミナミメナ ^カ オサ ^カ ニ								r	+					rr	rr
200	ヒメヤマトオサ ^カ ニ													rr		
201	オサ ^カ ニ科											rr				rr
202	ギ ^ホ シムシ綱		+													r
203	ウミシタ ^目			rr												
204	アミメシ ^{ユス} ヘ ^リ ヒト ^デ			rr												
205	アヒト ^デ			rr												
206	スナクモヒト ^デ 科						rr									
207	クロクモヒト ^デ			r												
208	ホウシャクモヒト ^デ			rr												rr
209	オニクモヒト ^デ			rr												
210	クモヒト ^デ 綱		rr	rr			rr									
211	サンショウウ ^ニ 科							rr								
212	ホシナ ^カ ウニ			r												
213	ツマシ ^ロ ナ ^カ ウニ			r			rr									
214	リュウキュウナ ^カ ウニ			rr												
215	タリシ ^{ウニ}			rr												
216	ヨツアナカシハ ^ン 属	rr														
217	チス ^ナ マコ		rr													
218	ニセクロナマコ		rr		rr		rr									
219	リュウキュウア ^シ ナマコ								rr							
220	ムラサキクルマナマコ							rr								
221	チャツホ ^ボ ヤ			R												
222	ミト ^{リス} シ ^{ウス} ホ ^ヤ			R												
223	ウスホ ^ヤ 科	R	R	R	R		R						R			R
224	ワモンツツホ ^ヤ			rr												
225	フイリカイメンホ ^ヤ			R	R		R									
226	ヘンゲ ^ホ ヤ科		R	R			R									
227	ナツメホ ^ヤ 科	rr		r									rr			r
228	イタホ ^ヤ 科						R						R			
229	ミナミクロホ ^ヤ	rr														
230	シロホ ^ヤ 科	rr		rr												rr
231	ヘ ^ニ ホ ^ヤ 属	rr		rr	rr											
232	ミナミカラスホ ^ヤ			rr												
233	マホ ^ヤ 科	rr														
出現種類数		42	41	65	34	2	56	35	41	20	20	13	55	19	12	38

表-6.2.33 (1) メガロベントスの調査地点概観

礁池・礁縁域			
	B1	B2	B3
地点 写真			
底質 概況	砂泥質	砂礫質の藻場	砂礫質及びサンゴ類


礁池・礁縁域			
	B4	B5	B6
地点 写真			
底質 概況	砂礫質	砂泥質	砂礫質

干潟域			
	B7	B8	B9
地点 写真			
底質 概況	礫質及び転石	砂礫質	砂礫質

表-6.2.33 (2) メガロベントスの調査地点概観

干潟域			
	B10	B11	B12
地点 写真			
底質 概況	砂礫質	砂質	転石及び砂礫質

干潟域			礁池・礁縁域
	B13	B14	B15
地点 写真			
底質 概況	泥質	砂質	砂礫質



注：B10 は平成 26 年度春季に消失したため、同年夏季から新たに設置した。

図－ 6.2.10 鉄筋杭の高さの変動（B4, B9, B10）

3) 確認された重要な種

重要な種及び確認地点を表－ 6.2.34 に示す。

令和 2 年度調査において、重要な種は 33 種が確認された。ヌノメイチョウシラトリ、メナガオサガニハサミエボシ、アカテノコギリガザミ、ミナミヒライソモドキは工事前に確認されていなかったが、新たに確認された。引き続き出現状況を確認していくこととする。

表－ 6.2.34 確認された重要な種及び確認地点（メガロベントス）

No.	和名	環境省 RL 2020	環境省 海洋生物 RL 2017	水産庁 DB	沖縄県 RDB 2017	WWF	確認地点・調査時期															
							B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	
1	クサイルカノコ	NT				危険		夏季														
2	ギンランカノコ	NT				危険		夏季														
3	カヤノミナエリ	NT				危険							夏季・冬季				夏季・冬季					
4	フトヘナタリ	NT				危険												夏季・冬季				
5	ヒメシリイルムシロ	NT			NT	危険	夏季・冬季				夏季・冬季										冬季	
6	カブツササキガイ				NT	危険								夏季								
7	オキナグワロコガイ	VU			VU														冬季			
8	シメジロココガイ	NT			NT													夏季				
9	カワラガイ	NT			NT		冬季								夏季・冬季						夏季・冬季	
10	オキナグワシロガイ	NT					夏季															
11	ヒメシヤコ			減少					冬季													
12	オイノカミ	NT			NT		夏季・冬季	夏季		夏季	夏季	冬季		夏季・冬季	冬季						夏季・冬季	
13	ダテオキシジミ	CR			NT														冬季			
14	ハナクモリ	VU			VU	危険													夏季・冬季			
15	ヒメニッコウガイ					危険			夏季													
16	ヌノイチョウシテトリ	NT				絶滅寸前													夏季			
17	マヌカガイ	NT				危険							夏季・冬季									
18	アソベ・マヌカ	DD														夏季					夏季	
19	ユキガイ	NT			NT	危険															夏季	
20	イノハマグリ	NT		減少									夏季・冬季			夏季						
21	クチバシガイ	NT			NT								夏季・冬季									
22	メカガオサガニ・ニハサミエボシ		CR		DD												冬季					
23	アヒエ・スナモグリ		DD																		夏季・冬季	
24	マルテツノヤドリ				NT											夏季	夏季・冬季	夏季・冬季				夏季・冬季
25	カバヤシヤドリ		DD		VU												夏季			冬季		
26	アカテノコギリガザミ		DD	減少	NT															夏季		
27	オキナグワヒメガイ	NT															冬季		夏季・冬季			
28	シメジロイモトギ		NT																夏季・冬季			
29	ヒメカクオサガニ		NT											夏季・冬季	夏季・冬季				夏季・冬季			
30	ヒメヤマトオサガニ		NT																	夏季・冬季		
31	メカガオサガニ				NT				夏季		夏季											夏季
32	ヤエヤマオサガニ					稀少														夏季		
33	ヤマトウシロガモ	DD			CR															冬季		

注：重要な種の選定基準は、表－ 6.2.5 と同様とした。

(8) サンゴ類（定点調査）

1) 調査概要

5m×5m のコドラートを設置し、各コドラートにおいて、潜水目視観察により、ソフトコーラルを含むサンゴ類の種類、被度、群体数、最大径（卓状ミドリイシの最大径）、死サンゴの被度を記録した。また、サンゴ類の生息環境を把握するため、各地点の地形（底質の概観、砂の堆積厚）、水深、白化、病気、海藻類の付着、浮泥の堆積状況、サンゴ類の攪乱及び幼群体の加入状況、食害生物を記録した。

2) 調査結果

各地点のサンゴ類生息状況は表－ 6.2.35 に、サンゴ類の分布状況は図－ 6.2.14 に、出現種一覧は表－ 6.2.36 に示すとおりである。

なお、St. C4 は、平成 26 年春季調査時に汚濁防止膜内に位置したため、汚濁防止膜外の近傍域に地点を移動した。

(ア) 夏季

夏季における St. C1～C4 の被度は、それぞれ 55%、35%、10%、20%であり、出現種類数はそれぞれ 73 種類、63 種類、47 種類、86 種類であった。

主な出現種は、St. C1 でハナヤサイサンゴ、St. C2 でアオサンゴ、St. C3、St. C4 ではハマサンゴ属(塊状)であった。

また、サンゴ類の変動に影響を与える目立った白化ならびにサンゴ食害生物のオニヒトデやサンゴ食巻貝類の大発生はみられなかった。

St. C1 では、サンゴ食巻貝による食害、サンゴ類の破損等が確認されたが影響は限定的であった。

St. C2 では、被度が令和元年度冬季の 40%から 35%に減少した。St. C2 の主要種であるアオサンゴの生存被度が 35%から 30%に減少したことによる。サンゴ類の死亡被度は 5%であった。死亡したアオサンゴに海藻類が付着しているのが確認された。

St. C3 では、令和元年度冬季調査と同様に、ハマサンゴ属(塊状)の群体の一部に病気が確認されたが 1%未満と僅かであった。

St. C4 では、特に変化はみられなかった。

	
St. C1 サンゴ食害貝類の食害により死亡したサンゴ	St. C1 サンゴ食害貝類
	
St. C2 死亡したアオサンゴに海藻類が繁茂	St. C3 ハマサンゴ属(塊状)の色素形成応答

図ー 6.2.11 サンゴ類の状況

(イ) 冬季

冬季における St. C1～C4 の被度は、それぞれ 50%、40%、10%、20%であり、出現種類数はそれぞれ 70 種類、63 種類、49 種類、86 種類であった。

主な出現種は、St. C1 でハナヤサイサンゴ、St. C2 でアオサンゴ、St. C3、St. C4 ではハマサンゴ属(塊状)であった。


また、サンゴ類の変動に影響を与える目立った白化ならびにサンゴ食害生物のオニヒトデやサンゴ食巻貝類の大発生はみられなかった。

St. C1 では、被度が夏季の 55%から 50%に減少した。St. C1 の主要種であるハナヤサイサンゴの生存被度が 45%から 40%に減少したことによる。サンゴ類の死亡被度は 5%であった。台風が原因として考えられるサンゴ類の損壊が多く確認され、底質ごとサンゴ類の消失が確認された。


St. C2 では、夏季に 35%に減少した被度が 40%に増加した。夏季に減少したアオサンゴの被度は 30%と変化はなく、アオサンゴの死亡は確認されなかった。被度の増加はサンゴ類の成長によるものであると考えられた。また、台風の波浪で移動した礫・転石によるサンゴ類の破損等が確認されたが影響は限定的であった。

St. C3 では、ハマサンゴ属(塊状)の群体の一部がピンク色を呈する色素形成応答とみられる症状が夏季と同様に確認されたが、1%未満と僅かであった。

St. C4 では、被度に変化は見られなかったが、卓状を形成しつつあるミドリイシ属が確認されるなど、サンゴ類の成長が確認された。



図ー 6.2.12 サンゴ礁の状況



図一 6.2.13 事後調査地点（海域生物・海域生態系、海域生物③）

表ー 6.2.35 (1) 各地点のサンゴ類生息状況 (C1)

調査地点		C1	
調査日		令和2年7月22日	令和3年1月11日
調査項目			
水深		4.4m	4.4m
底質概観		岩盤	岩盤
サンゴ類	被度	55%	50%
	死亡被度	5%未満	5%
	出現種数	73	70
	群体系数	617	582
	主な出現種	ハナサヤサンゴ 45%	ハナサヤサンゴ 40%
	成育型	特定類優占型	特定類優占型
	サンゴ加入度	5群体系以上	5群体系以上
	卓状ミドリイシ類の最大径	15.5cm	17.0cm
	病気	なし	なし
	白化段階	I (1%未満)	I (1%未満)
被度		5%	5%
ソフトコーラル	主な出現種	ウネケ属 5%未満 カトサカ属 5%未満 ウミノ属 5%未満	ウネケ属 5%未満 カトサカ属 5%未満 ウミノ属 5%未満
	オニヒトデの個体系数	なし	なし
食害の状況	サンゴ食巻貝類	I (食痕は目立たない)	I (食痕は目立たない)
	堆積状況	I (海底面をはたいても濁らない)	I (海底面をはたいても濁らない)
浮泥	堆積厚	1mm未満	1mm未満
	堆積厚	1mm未満	1mm未満
備考	サンゴへの海藻類の付着	なし	なし
	油等の影響	なし	なし
特記事項		ウミノ食巻貝による食害は限定的である。ウミノの折れ等破損が散見。	ウミノの折れ等破損が多くみられた。2群体系、6群体系では底質ごとウミノの消失が確認された。

注：水深是那覇港湾験潮所基準面上(+)1.34mを基準とした。

表ー 6.2.35 (2) 各地点のサンゴ類生息状況 (C2)

調査地点		C2	
調査日		令和2年7月22日	令和3年1月26日
調査項目			
水深		10.0m	10.0m
底質概観		岩盤	岩盤
サンゴ類	被度	35%	40%
	死亡被度	5%	5%未満
	出現種数	63	63
	群体系数	-	-
	主な出現種	アオサンゴ 30%	アオサンゴ 30%
	成育型	特定類優占型	特定類優占型
	サンゴ加入度	5群体系未満	5群体系未満
	卓状ミドリイシ類の最大径	10.0cm	14.0cm
	病気	なし	なし
	白化段階	I (1%未満)	0 (1%未満)
被度		10%	10%
ソフトコーラル	主な出現種	ウネケ属 10% カトサカ属 5%未満 ウミノ属 5%未満	ウネケ属 10% カトサカ属 5%未満 ウミノ属 5%未満
	オニヒトデの個体系数	なし	なし
食害の状況	サンゴ食巻貝類	I (食痕は目立たない)	I (食痕は目立たない)
	堆積状況	I (海底面をはたいても濁らない)	I (海底面をはたいても濁らない)
浮泥	堆積厚	1mm未満	1mm未満
	堆積厚	1mm未満	1mm未満
備考	サンゴへの海藻類の付着	あり (微小好藻類や死亡群体系にウミノが密生している。)	あり (死亡群体系や礫化した箇所に藻類が密生している。生存部にも藍藻綱の付着を確認。)
	油等の影響	なし	なし
特記事項		岩盤や岩盤上藻類生育。	流入した礫・転石が原因と考えられるウミノの折れ等破損が散見された。

注：水深是那覇港湾験潮所基準面上(+)1.34mを基準とした。

表－ 6.2.35 (3) 各地点のサンゴ類生息状況 (C3)

調査地点		C3			
		調査日			
調査項目		令和2年7月21日		令和3年1月11日	
水深		1.6m		1.6m	
底質概観		岩盤		岩盤	
サンゴ類	被度	10%		10%	
	死亡被度	5%未満		5%未満	
	出現種数	47		49	
	群体系数	168		676	
	主な出現種	ハマサンゴ 属(塊状) 10%		ハマサンゴ 属(塊状) 10%	
	成育型	特定類優占型		特定類優占型	
	サンゴ加入度	5群体系未満		5群体系未満	
	卓状ミドリイシ類の最大径	12、15cm		17.5、22.0cm	
	病気	1%未満		1%未満	
	白化段階	I (1%未満)		0 (1%未満)	
ソフトコーラル	被度	5%未満		5%未満	
	主な出現種	ウネケ属 5%未満 カトサカ属 5%未満 ウミキノ属 1%未満	ウネケ属 5%未満 カトサカ属 5%未満 ウミキノ属 1%未満	ウネケ属 5%未満 カトサカ属 5%未満 ウミキノ属 1%未満	ウネケ属 5%未満 カトサカ属 5%未満 ウミキノ属 1%未満
食害の状況	オニヒトデの個体系数	なし		なし	
	サンゴ食巻貝類	I (食痕は目立たない)		I (食痕は目立たない)	
浮泥	堆積状況	I (海底面をはたいても濁らない)		I (海底面をはたいても濁らない)	
	堆積厚	1mm未満		1mm未満	
備考	サンゴへの海藻類の付着	ハマサンゴ 属(塊状)の死滅部に藍藻類の付着あり		なし	
	油等の影響	なし		なし	
特記事項		ハマサンゴ 属にヒンクスボットあり		ハマサンゴ 属にヒンクスボットあり (魚類によるものと思われる食痕あり。)	


注：水深は那覇港湾験潮所基準面上(+)1.34mを基準とした。

表－ 6.2.35 (4) 各地点のサンゴ類生息状況 (C4)


調査地点		C4			
		調査日			
調査項目		令和2年7月21日		令和3年1月26日	
水深		4.5m		4.5m	
底質概観		岩盤		岩盤	
サンゴ類	被度	20%		20%	
	死亡被度	5%未満		5%未満	
	出現種数	86		86	
	群体系数	591		621	
	主な出現種	ハマサンゴ 属(塊状) 10%		ハマサンゴ 属(塊状) 10%	
	成育型	多種混成型		多種混成型	
	サンゴ加入度	5群体系以上		5群体系未満	
	卓状ミドリイシ類の最大径	なし		なし	
	病気	なし		なし	
	白化段階	I (1%未満)		0 (1%未満)	
ソフトコーラル	被度	5%未満		5%未満	
	主な出現種	ウネケ属 1%未満 カトサカ属 1%未満 ウミキノ属 1%未満	ウネケ属 1%未満 カトサカ属 1%未満 ウミキノ属 1%未満	ウネケ属 1%未満 カトサカ属 1%未満 ウミキノ属 1%未満	ウネケ属 1%未満 カトサカ属 1%未満 ウミキノ属 1%未満
食害の状況	オニヒトデの個体系数	なし		なし	
	サンゴ食巻貝類	I (食痕は目立たない)		I (食痕は目立たない)	
浮泥	堆積状況	I (海底面をはたいても濁らない)		I (海底面をはたいても濁らない)	
	堆積厚	1mm未満		1mm未満	
備考	サンゴへの海藻類の付着	なし		なし	
	油等の影響	なし		なし	
特記事項		なし		卓状を形成しつつあるミドリイシ属あり	

注：水深は那覇港湾験潮所基準面上(+)1.34mを基準とした。

【夏季：令和2年7月】



【冬季：令和3年1月】




《凡例》


(サンゴ類)			(ソフトコーラル類)	
ハナヤサイサンゴ属	キッカサンゴ属	ナガレサンゴ属	ノウトサカ属	死サンゴ 白化サンゴ
コモンサンゴ属	ハナガタサンゴ属	マルキクメイシ属	ウネタケ属	
ミドリイシ属	ダイノウサンゴ属	ルリサンゴ属	ウミキノコ属	
ハマサンゴ属	イボサンゴ属	トゲキクメイシ属	カタトサカ属	
アミメサンゴ属	サザナミサンゴ属	リュウキュウキッカサンゴ属	チヂミトサカ科	
ヤスリサンゴ属	キクメイシ属	アオサンゴ属		
シコロサンゴ属	カメノコキクメイシ属	アナサンゴモドキ属		
リュウモンサンゴ属	コカメノコキクメイシ属			
アザミサンゴ属	ノウサンゴ属			

図ー 6.2.14 (1) サンゴ類の分布状況 (C1：5m×5m コドラート)

【夏季：令和2年7月】



【冬季：令和3年1月】




《凡例》


(サンゴ類)			(ソフトコーラル類)	
ハナヤサイサンゴ属	トゲクサベライシ属	カメノコキクメイシ属	ノウトサカ属	死サンゴ 白化サンゴ 破片化散在
トゲサンゴ属	キュウリイシ属	コカメノコキクメイシ属	ウネタケ属	
コモンサンゴ属	アザミサンゴ属	ノウサンゴ属	ウミキノコ属	
ミドリイシ属	キツカサンゴ属	マルキクメイシ属	カタトサカ属	
ハマサンゴ属	スジウミバラ属	トゲキクメイシ属	チヂミトサカ科	
ハナガササンゴ属	ハナガタサンゴ属	リュウキュウキツカサンゴ属	ウミトサカ科	
ヤスリサンゴ属	ダイノウサンゴ属	アオサンゴ属	その他	
シコロサンゴ属	イボサンゴ属	アナサンゴモドキ属		
リュウモンサンゴ属	サザナミサンゴ属			
クサベライシ属	キクメイシ属			

図一 6.2.14 (2) サンゴ類の分布状況 (C2：5m×5m コドラート)

【夏季：令和2年7月】



【冬季：令和3年1月】




《凡例》

(サンゴ類)		(ソフトコーラル類)	
ハナヤサイサンゴ属	キクメイシ属	ノウトサカ属	死サンゴ 白化サンゴ
コモンサンゴ属	カメノコキメイシ属	ウネタケ属	
ミドリイシ属	コカメノコキメイシ属	ウミキノコ属	
アナサンゴ属	ノウサンゴ属	カタトサカ属	
ハマサンゴ属	マルキクメイシ属	チヂミトサカ科	
シコロサンゴ属	ルリサンゴ属		
アザミサンゴ属	トゲキクメイシ属		
キッカサンゴ属	アオサンゴ属		
サザナミサンゴ属	アナサンゴモドキ属		


図一 6.2.14 (3) サンゴ類の分布状況 (C3：5m×5m コドラート)

【夏季：令和2年7月】



【冬季：令和3年1月】

ミドリイシ属
が卓状に発達



《凡例》

(サンゴ類)			(ソフトコーラル類)	
ハナヤサイサンゴ属	スジウミバラ属	ナガレサンゴ属	ノウトサカ属	死サンゴ 白化サンゴ
コモンサンゴ属	ハナガタサンゴ属	マルキクメイシ属	ウネタケ属	
ミドリイシ属	ダイノウサンゴ属	ルリサンゴ属	ウミキノコ属	
アナサンゴ属	イボサンゴ属	トゲキクメイシ属	カタトサカ属	
ハマサンゴ属	サザナミサンゴ属	リュウキュウキッカサンゴ属	チヂミトサカ科	
アミメサンゴ属	タハネサンゴ属	スリパチサンゴ属		
リュウモンサンゴ属	キクメイシ属	アナサンゴモドキ属		
クサビライシ属	カメノコキクメイシ属			
アザミサンゴ属	コカメノコキクメイシ属			
キッカサンゴ属	ノウサンゴ属			

図ー 6.2.14 (4) サンゴ類の分布状況 (C4：5m×5m コドラート)

表－ 6.2.36 (1) 出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月21,22日
冬季：令和3年1月11,26日

No.	科 名	学 名	調査地点	St.C1		St.C2		St.C3		St.C4	
			調査時期	R2.7	R3.1	R2.7	R3.1	R2.7	R3.1	R2.7	R3.1
			全体被度	55	50	35	40	10	10	20	20
			和名 / 死亡被度	+	5	5	+	+	+	+	+
1	ムカシサンゴ [*]	<i>Stylocoeniella guentheri</i>	ムカシサンゴ [*]					+	+	+	+
2	ハナヤサイサンゴ [*]	<i>Pocillopora damicornis</i>	ハナヤサイサンゴ [*]	45	40	+	+				
3		<i>Pocillopora verrucosa</i>	イボ [*] ハダ [*] ハナヤサイサンゴ [*]	+	+	+	+			+	+
4		<i>Pocillopora eydouxi</i>	ヘラシ [*] カハナヤサイサンゴ [*]	+	+						+
5		<i>Pocillopora</i> sp.	ハナヤサイサンゴ [*] 属					+	+	+	+
6		<i>Seriatopora caliendrum</i>	フトゲ [*] サンゴ [*]			+	+				
7	ミドリイシ	<i>Montipora tuberculosa</i>	ヒメイボ [*] コモンサンゴ [*]	+	+						
8		<i>Montipora foveolata</i>	オオクボ [*] ミコモンサンゴ [*]	+	+						
9		<i>Montipora informis</i>	ノコモンサンゴ [*]	+	+			+	+		
10		<i>Montipora</i> sp.	コモンサンゴ [*] 属(被覆状)	+	+	+	+	+	+	+	+
11		<i>Montipora</i> sp.	コモンサンゴ [*] 属(樹枝状)					+	+		
12		<i>Acropora humilis</i>	ツツコビミドリイシ					+	+	+	+
13		<i>Acropora gemmifera</i>	オヤコビミドリイシ	+	+			+	+	+	+
14		<i>Acropora monticulosa</i>	サンカクミドリイシ	+	+						
15		<i>Acropora digitifera</i>	ココビミドリイシ	+	+						
16		<i>Acropora verweyi</i>	<i>Acropora verweyi</i>	+	+						
17		<i>Acropora nobilis</i>	トゲ [*] スキミドリイシ	+						+	+
18		<i>Acropora austera</i>	コイボミドリイシ				+				
19		<i>Acropora tenuis</i>	ウスエダ [*] ミドリイシ			+	+		+	+	+
20		<i>Acropora cytherea</i>	ハナハチミドリイシ			+			+		
21		<i>Acropora hyacinthus</i>	クシハダ [*] ミドリイシ	+	+	+	+	+	+	+	+
22		<i>Acropora litistella</i>	キクハナガサミドリイシ	+	+						
23		<i>Acropora subulata</i>	<i>Acropora subulata</i>	+	+						
24		<i>Acropora nana</i>	スケ [*] ミドリイシ	+	+						
25		<i>Acropora nasuta</i>	ハナガサミドリイシ	+	+	+	+	+	+	+	+
26		<i>Acropora valida</i>	ホソエダ [*] ミドリイシ	+						+	+
27		<i>Acropora secale</i>	トゲ [*] ホソエダ [*] ミドリイシ	+	+			+	+		
28		<i>Acropora florida</i>	サボテンミドリイシ	+	+					+	+
29		<i>Acropora</i> sp.	ミドリイシ [*] 属(樹枝状)	+	+	+	+	+	+	+	+
30		<i>Astreopora myriophthalma</i>	アナサンゴ [*]					+	+	+	+
31	ハマサンゴ [*]	<i>Porites lobata</i>	フカイナハマサンゴ [*]							+	+
32		<i>Porites cylindrica</i>	ユビ [*] エダ [*] ハマサンゴ [*]			+	+			+	+
33		<i>Porites lichen</i>	ヘ [*] ニハマサンゴ [*]			+	+			+	+
34		<i>Porites rus</i>	バラオハマサンゴ [*]					+	+		
35		<i>Porites</i> sp.	ハマサンゴ [*] 属(被覆状)	+	+			+	+	+	+
36		<i>Porites</i> sp.	ハマサンゴ [*] 属(塊状)	+	+	+	+	10	10	10	10
37		<i>Goniopora stutchburyi</i>	コハナガササンゴ [*]				+				
38	ヤスリサンゴ [*]	<i>Psammocora contigua</i>	ヤッコアミメサンゴ [*]	+	+						
39		<i>Psammocora digitata</i>	ヤスリアミメサンゴ [*]	+	+						
40		<i>Psammocora halmiana</i>	トゲ [*] アミメサンゴ [*]							+	+
41		<i>Psammocora profundacella</i>	アミメサンゴ [*]	+	+	+	+		+	+	+
42		<i>Coscinaraea columna</i>	ヤスリサンゴ [*]	+	+	+	+				
43	ヒラフキサンゴ [*]	<i>Pavona explanulata</i>	ヒラシコロサンゴ [*]			+	+				
44		<i>Pavona varians</i>	シワシコロサンゴ [*]	+	+	+	+			+	+
45		<i>Pavona venosa</i>	シコロキクメイシ	+	+			+	+		
46		<i>Coeloseris mayeri</i>	ヨロンキクメイシ							+	+
47		<i>Pachyseris rugosa</i>	シワリュウモンサンゴ [*]	+	+	+	+			+	+
48		<i>Pachyseris speciosa</i>	リュウモンサンゴ [*]			+	+				
49	クサビライシ	<i>Fungia fungites</i>	シタザ [*] ラクサビライシ			+	+				
50		<i>Fungia valida</i>	ノコギリクサビライシ			+	+				
51		<i>Fungia repanda</i>	マルクサビライシ								
52		<i>Fungia concinna</i>	ヒラタクサビライシ			+	+				
53		<i>Fungia granulosa</i>	ナミクサビライシ							+	+
54		<i>Fungia scutaria</i>	クサビライシ			+	+				
55		<i>Fungia paumotensis</i>	ゾウライシ			+	+				
56		<i>Fungia</i> sp.	クサビライシ [*] 属			+	+			+	+
57		<i>Ctenactis echinata</i>	トゲ [*] クサビライシ			+	+				
58		<i>Herpolitha limax</i>	キュウライシ			+	+				
59		<i>Lithophyllon lobata</i>	ミナミカワラサンゴ [*]			+	+			+	+
60	ヒワガライシ	<i>Galaxea fascicularis</i>	アザ [*] ミサンゴ [*]	+	+	+	+	+	+	+	+
61	ウミバラ	<i>Echinophyllia aspera</i>	キッカサンゴ [*]	+	+	+	+			+	+
62		<i>Echinophyllia orpheensis</i>	アハレキッカサンゴ [*]			+	+	+	+	+	+
63		<i>Echinophyllia echinata</i>	ヒラキッカサンゴ [*]			+	+				
64		<i>Oxypora lacera</i>	アナキッカサンゴ [*]			+	+				
65		<i>Mycedium elephantotus</i>	ウスカミサンゴ [*]			+	+				
66		<i>Pectinia lactuca</i>	スジ [*] ウミバラ			+	+				
67		<i>Pectinia paeonia</i>	レースウミバラ			+	+			+	+
68		<i>Pectinia</i> sp.	スジ [*] ウミバラ [*] 属	+		+					

注：「+」は、5%未満であることを示す。

表－ 6.2.36 (2) 出現種一覧

調査日：夏季：令和2年7月21,22日
冬季：令和3年1月11,26日

No.	科 名	学 名	調査地点	St.C1		St.C2		St.C3		St.C4	
			調査時期	R2.7	R3.1	R2.7	R3.1	R2.7	R3.1	R2.7	R3.1
			全体被度	55	50	35	40	10	10	20	20
			和名 / 死亡被度	+	5	5	+	+	+	+	+
69	オオトゲサンゴ	<i>Acanthastrea echinata</i>	ヒメオオトゲキクメイシ							+	+
70		<i>Acanthastrea</i> sp.	オオトゲキクメイシ属							+	+
71		<i>Lobophyllia hemprichii</i>	オオハナガタサンゴ	+	+	+	+			+	+
72		<i>Lobophyllia corymbosa</i>	マルハナガタサンゴ			+	+			+	+
73		<i>Lobophyllia</i> sp.	ハナガタサンゴ属	+	+	+	+	+	+	+	+
74		<i>Symphyllia recta</i>	ホソダイノウサンゴ	+	+	+	+			+	+
75		<i>Symphyllia radians</i>	ダイノウサンゴ							+	+
76		<i>Symphyllia valenciennesi</i>	ハナガタサンゴ			+	+			+	+
77		<i>Mussidae</i>	オオトゲサンゴ科								+
78	ササナミサンゴ	<i>Hydnophora rigida</i>	エダイイボサンゴ	+	+						
79		<i>Hydnophora exesa</i>	トゲイボサンゴ	+	+	+	+			+	+
80		<i>Hydnophora microconos</i>	リュウキュウイボサンゴ	+	+					+	+
81		<i>Merulina ampliata</i>	ササナミサンゴ	+	+	+	+	+	+	+	+
82		<i>Merulina scabricula</i>	ウスササナミサンゴ			+	+			+	+
83	キクメイシ	<i>Caulastrea furcata</i>	ネシレタバネサンゴ							+	+
84		<i>Favia stelligera</i>	ホシキクメイシ	+	+			+	+	+	+
85		<i>Favia pallida</i>	ウスチャキクメイシ	+	+	+	+	+	+	+	+
86		<i>Favia speciosa</i>	キクメイシ							+	+
87		<i>Favia fava</i>	スホミキクメイシ	+	+	+	+	+	+	+	+
88		<i>Favia matthaei</i>	アラキクメイシ	+	+			+	+	+	+
89		<i>Favia rotundata</i>	アツキクメイシ	+	+					+	+
90		<i>Favia lizardensis</i>	リザードキクメイシ							+	+
91		<i>Favia veroni</i>	アハレキクメイシ					+	+	+	+
92		<i>Favia</i> sp.	キクメイシ属	+	+	+	+	+	+	+	+
93		<i>Favites abdita</i>	カメノコキクメイシ	+	+			+	+	+	+
94		<i>Favites halicora</i>	マルカメノコキクメイシ	+	+	+	+	+	+	+	+
95		<i>Favites flexuosa</i>	オオカメノコキクメイシ							+	+
96		<i>Favites pentagona</i>	ゴカクキクメイシ	+	+			+	+	+	+
97		<i>Favites stylifera</i>	<i>Favites stylifera</i>	+	+			+	+	+	+
98		<i>Favites russelli</i>	シモフリカメノコキクメイシ			+	+	+	+	+	+
99		<i>Favites</i> sp.	カメノコキクメイシ属	+	+	+	+			+	+
100		<i>Goniastrea retiformis</i>	コモンキクメイシ	+	+			+	+	+	+
101		<i>Goniastrea edwardsi</i>	ヒラカメノコキクメイシ	+	+			+	+	+	+
102		<i>Goniastrea favulus</i>	ヒメウネカメノコキクメイシ							+	+
103		<i>Goniastrea pectinata</i>	コカメノコキクメイシ	+	+	+	+	+	+	+	+
104		<i>Platygyra daedalea</i>	ヒラノウサンゴ	+	+			+		+	+
105		<i>Platygyra lamellina</i>	ノウサンゴ	+	+					+	+
106		<i>Platygyra sinensis</i>	シナノウサンゴ	+	+			+	+		
107		<i>Platygyra pini</i>	ヒメノウサンゴ	+	+	+	+	+	+	+	+
108		<i>Platygyra contorta</i>	ミタレノウサンゴ			+	+	+	+	+	+
109		<i>Platygyra</i> sp.	ノウサンゴ属	+	+	+	+			+	+
110		<i>Leptoria phrygia</i>	ナガレサンゴ	+	+					+	+
111		<i>Montastrea curta</i>	マルキクメイシ	+	+	+	+	+	+	+	+
112		<i>Montastrea annuligera</i>	ルリマルキクメイシ			+	+			+	+
113		<i>Montastrea magnistellata</i>	オオマルキクメイシ					+	+		
114		<i>Montastrea valenciennesi</i>	タカキクメイシ	+	+					+	+
115		<i>Leptastrea purpurea</i>	ルリサンゴ	+	+			+	+	+	+
116		<i>Leptastrea transversa</i>	アラルリサンゴ					+	+	+	+
117		<i>Leptastrea pruinosa</i>	トゲルリサンゴ								
118		<i>Leptastrea bewickensis</i>	ヒメルリサンゴ	+	+						
119		<i>Cyphastrea agassizi</i>	アラトゲキクメイシ	+	+						
120		<i>Cyphastrea serailia</i>	フカトゲキクメイシ					+	+	+	+
121		<i>Cyphastrea chalicidicum</i>	コトゲキクメイシ	+	+		+	+	+	+	+
122		<i>Cyphastrea microphthalma</i>	トゲキクメイシ	+	+					+	+
123		<i>Echinopora lamellosa</i>	リュウキュウキッカサンゴ	+	+	+	+			+	+
124		<i>Echinopora gemmacea</i>	オオリュウキュウキッカサンゴ	+	+					+	
125	チョウジカイ	<i>Euphyllia glabrescens</i>	ハナサンゴ			+	+				
126		<i>Euphyllia ancora</i>	ナガレハナサンゴ			+					
127	キシサンゴ	<i>Turbinaria frondens</i>	ウネリスリハチサンゴ							+	+
128		<i>Turbinaria reniformis</i>	ヨコミズスリハチサンゴ							+	+
129		<i>Turbinaria</i> sp.	ズリハチサンゴ属							+	+
130	アオサンゴ	<i>Helipora coerulea</i>	アオサンゴ	+	+	30	30	+	+		
131	アナサンゴモドキ	<i>Millepora platyphylla</i>	イタアナサンゴモドキ			+	+	+	+	+	+
132		<i>Millepora exaesa</i>	カンボクアナサンゴモドキ	+	+	+	+	+	+		
133		<i>Millepora intricata</i>	ホソエタアナサンゴモドキ	+	+	+	+				
134		<i>Millepora</i> sp.	アナサンゴモドキ属	+	+					+	+
	16科	出現種類数	134種類	73	70	63	63	47	49	86	86

注：「+」は、5%未満であることを示す。

3) 重要な種

令和 2 年度調査において、定点調査で確認された重要な種は表ー 6.2.37 に示すとおりである。

令和 2 年度に確認された重要な種は、ムカシサンゴ、クシハダミドリイシ、クサビライシ、アオサンゴの 4 種であった。このうちムカシサンゴ、アオサンゴは、全調査期間で継続して確認された。

なお、オオサザナミサンゴは平成 28 年度まで確認されていたが、平成 29 年度以降確認されていない。確認されていたオオサザナミサンゴは、St. C1 の小型群体であり、平成 28 年度夏季には大規模な白化現象が確認されていることから、このことによって死亡した可能性が考えられる。

表ー 6.2.37 確認された重要な種及び確認地点（サンゴ類）

No.	和名	環境省 海洋生物 RL	水産庁 DB	確認地点・調査時期			
				St. C1	St. C2	St. C3	St. C4
1	ムカシサンゴ		減少傾向			夏・冬	夏・冬
2	クシハダミドリイシ		減少傾向	夏・冬	夏・冬	夏・冬	夏・冬
3	クサビライシ		減少傾向		夏・冬		
4	アオサンゴ		減少	夏・冬	冬	夏・冬	

以下の①、②のいずれかに該当しているものを「重要な種」として選定した。

- ①環境省海洋生物 RL:「環境省海洋生物レッドリスト 2017 の公表について(平成 29 年 3 月 21 日記者発表、環境省)」に記載されている種及び亜種
- ・絶滅危惧Ⅰ類 : 絶滅の危機に瀕している種。
 - ・絶滅危惧ⅠA 類 : 絶滅の危機に瀕している種のうち、ごく近い将来における野生での絶滅の可能性が極めて高いもの。
 - ・絶滅危惧ⅠB 類 : 絶滅の危機に瀕している種のうち、A 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。
 - ・絶滅危惧Ⅱ類 : 絶滅の危険が増大している種。
 - ・準絶滅危惧 : 存続基盤が脆弱な種。現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種。
 - ・情報不足 : 評価するだけの情報が不足している種。
 - ・地域個体群 : 地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれが高い個体群。
- ②水産庁 DB : 「日本の希少な野生水生生物に関するデータブック」(水産庁, 平成 12 年)
- ・絶滅危惧種 : 絶滅の危機に瀕している種・亜種。
 - ・危急種 : 絶滅の危険が増大している種・亜種。
 - ・希少種 : 存続基盤が脆弱な種・亜種。
 - ・減少種 : 明らかに減少しているもの。
 - ・減少傾向 : 長期的に見て減少しつつあるもの。

(9) サンゴ類（分布調査）

1) 調査概要


サンゴ類の分布状況は、箱メガネを用いた船の上からの目視観察、マンタ法、スポットチェック法に準じた手法により把握した。また、スポットチェック法に準じた手法では、代表点として15地点を設定（図－ 6.2.20 に示す St. A～Q、ただし、St. C, H はなし）し、各地点の地形（水深、底質の概観、構造形態等（成育型））、浮泥の堆積状況、白化段階、病気の状況、食害生物の状況、ソフトコーラルの状況及び幼群体の加入状況等を記録した。

これらの結果を基に、航空写真や既存調査結果等を踏まえ分布図を作成し、サンゴ類の分布概要を把握した。調査は「沖縄の港湾におけるサンゴ礁調査の手引き」（沖縄総合事務局）等に基づき実施した。

2) 調査結果

サンゴ類の分布面積の経年変化は表－ 6.2.38 に、調査海域におけるサンゴ類の分布状況は図－ 6.2.20 に、サンゴ類の出現状況及び地点状況は表－ 6.2.39～表－ 6.2.40 に示すとおりである。

本海域においてサンゴ類は、礁縁部や沖の離礁を中心に分布域がみられ、礁池内では少なかった。礁縁部や沖の離礁における比較的被度の高い被度 10%以上 30%未満の分布域は、主にミドリイシ属（コリンボース状・テーブル状）、ハナヤサイサンゴ属、アオサンゴ等の群集であった。また、礁池内における被度 10%以上 30%未満の分布域は、主にハマサンゴ属（塊状）やコモンサンゴ属（枝状）等の群集であった。



図－ 6.2.15 (1) 主な出現種（礁縁部・沖の離礁）



図一 6.2.15 (2) 主な出現種（礁池内）

(ア) 夏季



令和２年度夏季調査では、サンゴ類の分布面積は合計 538.6ha であり、令和元年度冬季調査から 1.1ha 増加した。被度 10%未満の区域が 491.5ha と最も広く、被度 10%以上 30%未満の区域が 46.9ha であった。また、被度 30%以上 50%未満の区域が新たに 0.2ha 確認された。

サンゴ類の分布状況を見ると、ミドリイシ属（コリンボース状・テーブル状）が成長し、被度が増加した箇所、コモンサンゴ属（枝状）が増加した箇所、サンゴが分布していなかったが新たに確認された箇所等がみられた。

令和２年度夏季調査前には台風は接近しておらず、サンゴ類の目立った白化ならびに食害生物のオニヒトデやサンゴ食巻貝類の大発生もみられなかった。



図一 6.2.16 分布域の増加がみられた地点におけるサンゴ類の分布状況
(St.A 周辺)




図一 6.2.17 被度の増加がみられた地点におけるサンゴ類の分布状況
(左:St.E 周辺 右:St.M 周辺)

(イ) 冬季


令和2年度冬季調査では、サンゴ類の分布面積は合計550.3haであり、令和2年度夏季調査から11.7ha増加した。被度10%未満の区域が491.7haと最も広く、被度10%以上30%未満の区域が58.2ha、被度30%以上50%未満の区域が0.4haであった。

サンゴ類の分布状況をみると、ミドリイシ属（コリンボース状・テーブル状）が成長し、被度が増加した箇所、コモンサンゴ属（枝状）が増加した箇所等がみられた。

サンゴ類の台風による大規模な損壊、目立った白化ならびに食害生物のオニヒトデやサンゴ食巻貝類の大発生はみられなかった。



図一 6.2.18 被度の増加がみられた地点におけるサンゴ類の分布状況
(左:St.E 南側周辺 右:St.G 南側周辺)




図一 6.2.19 被度の増加がみられた主な地点におけるサンゴ類の分布状況
(左:瀬長島北側周辺 右:St.M 周辺)

表ー 6.2.38 サンゴ類の分布面積の経年変化


単位：ha

区域	被度	過年度調査		環境影響評価時の現地調査				事前調査	
		H13年度	H18年度	H22年度	H23年度			H25年度	
		H14.2	H19.1	H23.3	H23.6	H23.8	H23.11	H25.9	H26.1
		冬季	冬季	冬季	春季	夏季	秋季	夏季	冬季
改変なし	10%未満	435.9	461.0	524.8	524.8	526.0	526.0	529.8	529.8
	10%以上～30%未満	51.1	14.2	24.0	24.0	22.8	22.8	21.5	21.5
	30%以上～50%未満	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合計	487.0	478.3	548.8	548.8	548.8	548.8	551.3	551.3
区域	被度	事後調査							
		H26年度				H27年度			
		H26.5	H26.7-8	H26.10-11	H27.1-2	H27.5	H27.7-8	H27.11	H28.1-2
		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
改変なし	10%未満	533.9	535.7	513.9	513.9	513.9	510.2	515.1	514.9
	10%以上～30%未満	23.1	23.1	23.2	23.2	23.2	26.9	22.0	22.2
	30%以上～50%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合計	557.0	558.8	537.1	537.1	537.1	537.1	537.1	537.1
区域	被度	事後調査							
		H28年度				H29年度			
		H28.5	H28.7	H28.11	H29.1	H29.5	H29.7	H29.10	H30.1-2
		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
改変なし	10%未満	514.3	513.7	513.7	513.7	512.2	512.2	511.8	511.8
	10%以上～30%未満	22.8	23.4	23.4	23.4	24.9	24.9	25.3	25.3
	30%以上～50%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合計	537.1	537.1	537.1	537.1	537.1	537.1	537.1	537.1
区域	被度	事後調査							
		H30年度				R元年度			
		H30.4-5	H30.7-8	H30.10-11	H31.1	H31.4-R1.5	R1.7-8	R1.10	R2.1-2
		春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季
改変なし	10%未満	511.3	509.4	505.9	505.6	503.3	502.3	499.8	496.3
	10%以上～30%未満	26.0	27.9	31.4	31.7	34.2	35.2	37.7	41.2
	30%以上～50%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合計	537.3	537.3	537.3	537.3	537.5	537.5	537.5	537.5
区域	被度	事後調査							
		R2年度							
		R2.7	R3.1-2						
		夏季	冬季						
改変なし	10%未満	491.5	491.7						
	10%以上～30%未満	46.9	58.2						
	30%以上～50%未満	0.2	0.4						
	合計	538.6	550.3						



注：赤丸内は前回調査と比べて被度の増加箇所を示す。

図－ 6.2.20 (1) サンゴ類の分布状況（夏季）



注：赤丸内は前回調査と比べて被度の増加箇所を示す。

図－ 6.2.20 (2) サンゴ類の分布状況（冬季）

表ー 6. 2. 39 (1) サンゴ類の出現状況及び地点状況 (夏季)

調査地点	St. A	St. B	St. D
調査日	7月30日	7月29日	7月27日
水深	5. 6m	1. 5m	4. 8m
底質概観	岩盤	岩盤	岩盤
浮泥堆積状況	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)
サンゴ類被度	30%	25%	30%
主な出現種	ハヤサイヤンゴ属 : 25% ミドリイシ属 (コリンボース状) : 5% ノオサンゴ属 : 5%未満 コモサンゴ属 (被覆状) : 5%未満	ミドリイシ属 (コリンボース状) : 15% ハヤサイヤンゴ属 : 5% ミドリイシ属 (テプフル状) : 5%未満 カモノコキメシ属 : 5%未満	アオサンゴ : 30% キクメシ属 : 5%未満 ミドリイシ属 (テプフル) : 5%未満 カモノコキメシ属 : 5%未満
成育型	特定類優占型: ハヤサイヤンゴ属	特定類優占型: ミドリイシ属	特定類優占型: アオサンゴ
白化段階	I (なし)	I (1%未満)	I (なし)
種サンゴ (5cm未満群体の加入度)	5群体未満	5群体未満	5群体以上
卓状ミドリイシ類のサイズ 上位5群体 (cm)	120, 110, 90, 90, 80	140, 140, 100, 90, 80	25, 25, 20, 20, 20
ソフトコーラル被度	5%未満	5%未満	5%未満
主な出現種	ウミキノ属 : 5%未満 ウネケ属 : 5%未満 カトサカ属 : 5%未満	ウネケ属 : 5%未満 カトサカ属 : 5%未満	ウミキノ属 : 5%未満 ウネケ属 : 5%未満 カトサカ属 : 5%未満
オヒトデ	なし	なし	なし
サンゴ食巻貝類	I (食痕は目立たない)	I (食痕は目立たない)	I (食痕は目立たない)
特記事項	局所的ではあるが、サンゴ被度が増加傾向。	周辺及び北側に点在する離礁にかけて約20cm前後のハヤサイヤンゴ属、ミドリイシ属が増加傾向。	ミドリイシ属の小型群体 (15～20cm) が増加傾向。浅所 (水深5m未満) でのアオサンゴへのフナ藻類の付着が目立つ (約60%)。

注: 水深是那覇港湾験潮所基準面上 (+) 1. 34mを基準とした。

表ー 6. 2. 39 (2) サンゴ類の出現状況及び地点状況 (夏季)

調査地点	St. E	St. F	St. G
調査日	7月28日	7月28日	7月28日
水深	1. 9m	1. 7m	2. 2m
底質概観	岩盤	岩盤	岩盤
浮泥堆積状況	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)
サンゴ類被度	15%	20%	10%
主な出現種	ハヤサイヤンゴ属 : 15% ミドリイシ属 (テプフル状) : 5%未満 カモノコキメシ属 : 5%未満	ミドリイシ属 (テプフル状) : 15% ハヤサイヤンゴ属 : 5%未満 ミドリイシ属 (コリンボース状) : 5%未満 カモノコキメシ属 : 5%未満	ハマサンゴ属 (塊状) : 10% ミドリイシ属 (テプフル状) : 5%未満 キクメシ属 : 5%未満 ミドリイシ属 (樹枝状) : 5%未満
成育型	特定類優占型: ハヤサイヤンゴ属	特定類優占型: ミドリイシ属 (テプフル状)	特定類優占型: ハマサンゴ属 (塊状)
白化段階	I (なし)	I (1%未満)	I (なし)
種サンゴ (5cm未満群体の加入度)	5群体以上	5群体未満	5群体未満
卓状ミドリイシ類のサイズ 上位5群体 (cm)	100, 60, 60, 60, 50	100, 100, 100, 80, 80	35, 25, 25
ソフトコーラル被度	5%未満	1%未満	1%未満
主な出現種	カトサカ属 : 5%未満	カトサカ属 : 1%未満	カトサカ属 : 1%未満 ウミキノ属 : 1%未満 ノオサカ属 : 1%未満
オヒトデ	なし	なし	なし
サンゴ食巻貝類	I (食痕は目立たない)	I (食痕は目立たない)	I (なし)
特記事項	20cm程度の小型群体 (ハヤサイヤンゴ属・ミドリイシ属) が多く分布。 ハヤサイヤンゴ属が増加傾向 (10～15cmの群体)。	地点から南側一帯の礁斜面に20～70cm程度のミドリイシ属が多く分布し、水深10mまで一様に増加。	ハマサンゴ属 (塊状) 上部に擦れあり。 局所的に被度20～30%あり。 ミドリイシ属 (テプフル状) の出現が散見される。

注: 水深是那覇港湾験潮所基準面上 (+) 1. 34mを基準とした。

表ー 6. 2. 39 (3) サンゴ類の出現状況及び地点状況（夏季）

調査地点	St. I	St. J	St. K
調査日	7月27日	7月31日	7月29日
水深	1. 4m	1. 4m	2. 2m
底質概観	サンゴ礫、砂	岩盤	礫、砂
浮泥堆積状況	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)
サンゴ類被度	0%	25%	55%
主な出現種	なし	ミドリイシ属（テープル状）：20% ハヤサイサンゴ属：5%未満 ミドリイシ属（コリンボース状）：5%未満 ノウサンゴ属：5%未満	モンサンゴ属（樹枝状）：50% チヂミサコモンサンゴ：5%未満 クサビライシ属：5%未満 ミドリイシ属：5%未満
成育型	なし	特定類優占型：ミドリイシ属（テープル状）	特定類優占型：モンサンゴ属（樹枝状）
白化段階	I（なし）	I（1%未満）	I（なし）
稚サンゴ (5cm未満群体の加入度)	なし	5群体未満	なし
卓状ミドリイシ類のサイズ 上位5群体（cm）	なし	100, 100, 90, 90, 80	なし
ソフトコーラル被度	0%	1%未満	5%未満
主な出現種	なし	カトサカ属：1%未満	ウミキノコ属：5%未満 カトサカ属：5%未満
オヒトデ	なし	なし	なし
サンゴ食巻貝類	I（なし）	I（食痕は目立たない）	I（食痕は目立たない）
特記事項	特になし。	リーフ縁辺部にミドリイシ属の小型群体が多数加入。 局所的にサンゴ被度が増加傾向。	特になし。

注：水深是那覇港湾験潮所基準面上(+)1. 34mを基準とした。

表ー 6. 2. 39 (4) サンゴ類の出現状況及び地点状況（夏季）

調査地点	St. L	St. M	St. N
調査日	7月30日	7月31日	7月31日
水深	3. 3m	2. 1m	1. 8m
底質概観	岩盤	岩盤、小礫	岩盤
浮泥堆積状況	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)
サンゴ類被度	5%	15%	10%
主な出現種	ハマサンゴ属（塊状）：5%未満 ウスチヤキメイト属：5%未満 ノウサンゴ属：1%未満 コカミノキキメイト属：1%未満	モンサンゴ属（樹枝状）：10% ミドリイシ属（樹枝状）：5%未満 キタメイト属：5%未満 ハマサンゴ属（塊状）：5%未満	ミドリイシ属（コリンボース状）：5% ハヤサイサンゴ属：5%未満 コカミノキキメイト属：1%未満 ミドリイシ属（テープル状）：1%未満
成育型	多種混成型	特定類優占型：モンサンゴ属（樹枝状）	多種混成型
白化段階	I（なし）	I（なし）	I（1%未満）
稚サンゴ (5cm未満群体の加入度)	5群体以上	5群体未満	5群体未満
卓状ミドリイシ類のサイズ 上位5群体（cm）	なし	40, 30, 20, 20, 20	60, 50, 50, 50, 40
ソフトコーラル被度	1%未満	1%未満	1%未満
主な出現種	カトサカ属：1%未満 ウネケ属：1%未満	カトサカ属：1%未満	カトサカ属：1%未満
オヒトデ	なし	なし	なし
サンゴ食巻貝類	I（なし）	I（食痕は目立たない）	I（なし）
特記事項	特になし。	アンカーによるサンゴの折れ等破損が散見。	ミドリイシ属の小型群体（20cm前後）が増加傾向。

注：水深是那覇港湾験潮所基準面上(+)1. 34mを基準とした。

表ー 6.2.39 (5) サンゴ類の出現状況及び地点状況（夏季）

調査地点	St. O	St. P	St. Q
調査日	7月29日	7月29日	7月31日
水深	11.8m	2.1m	1.0m
底質概観	岩盤	岩盤	岩盤、礫、砂
浮泥堆積状況	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)
サンゴ類被度	10%	10%	5%未満
主な出現種	ミドリイシ属（テーブル状）：5%未満 ハナヤシサンゴ属：5%未満 キクメイシ属：5%未満 コカミノキクメイシ属：5%未満	ミドリイシ属（テーブル状）：5% ミドリイシ属（コリンボース状）：5%未満 コカミノキクメイシ属：5%未満 キクメイシ属：5%未満	モモンサコ属（樹枝状）：5%未満 モモンサコ属（被覆状）：5%未満 コカミノキクメイシ属：5%未満 ミドリイシ属（コリンボース状）：5%未満
成育型	多種混成型	特定類優占型：ミドリイシ属	多種混成型
白化段階	I（なし）	I（なし）	I（なし）
稚サンゴ (5cm未満群体の加入度)	5群体未満	5群体未満	5群体未満
卓状ミドリイシ類のサイズ 上位5群体（cm）	120, 60, 40, 30, 20	50, 40, 40, 40, 40	なし
ソフトコーラル被度	5%	5%未満	0%
主な出現種	カトサカ属：5% ウミキノ属：5%未満 ウネケ属：5%未満	ウミキノ属：5%未満 カトサカ属：5%未満 ウネケ属：5%未満	なし
オヒトデ	なし	なし	なし
サンゴ食巻貝類	I（食痕は目立たない）	I（なし）	I（なし）
特記事項	特になし。	ミドリイシ属の小型群体（30～40cm）が増加傾向。ミドリイシ属（テーブル状）の生育が良好で被度が増加。	特になし。

注：水深是那覇港湾験潮所基準面上(+)1.34mを基準とした。

表ー 6.2.40 (1) サンゴ類の出現状況及び地点状況（冬季）

調査地点	St. A	St. B	St. D
調査日	2月1日	2月1日	1月31日
水深	5.5m	0.6m	2.5m
底質概観	岩盤	岩盤	岩盤
浮泥堆積状況	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)
サンゴ類被度	30%	20%	30%
主な出現種	ハナヤシサンゴ属：25% ミドリイシ属（コリンボース状）：5% ナガサンゴ属：5%未満 モモンサコ属（被覆状）：5%未満	ミドリイシ属（コリンボース状）：15% ハナヤシサンゴ属：5%未満 ミドリイシ属（テーブル状）：5%未満 コカミノキクメイシ属：5%未満	アオサンゴ：30% キクメイシ属：5%未満 ミドリイシ属（テーブル）：5%未満 コカミノキクメイシ属：5%未満
成育型	特定類優占型：ハナヤシサンゴ属	特定類優占型：ミドリイシ属	特定類優占型：アオサンゴ
白化段階	I（なし）	I（1%未満）	I（なし）
稚サンゴ (5cm未満群体の加入度)	5群体未満	5群体未満	5群体以上
卓状ミドリイシ類のサイズ 上位5群体（cm）	120, 120, 90, 90, 80	140, 140, 100, 90, 80	30, 25, 25, 25, 20
ソフトコーラル被度	5%未満	5%未満	5%未満
主な出現種	ウミキノ属：5%未満 ウネケ属：5%未満 カトサカ属：5%未満	ウネケ属：5%未満 カトサカ属：5%未満	ウミキノ属：5%未満 ウネケ属：5%未満 カトサカ属：5%未満
オヒトデ	なし	なし	なし
サンゴ食巻貝類	I（食痕は目立たない）	I（食痕は目立たない）	I（食痕は目立たない）
特記事項	枝状群体の先端部に折れ等の欠損が散見された。	群体先端部に折れ等の欠損や部分死した箇所に藻類が付着した群体が散見された。周辺部でも同様の傾向。	ミドリイシ属の小型群体(15～20cm)が増加傾向。

注：水深是那覇港湾験潮所基準面上(+)1.34mを基準とした。

表ー 6. 2. 40 (2) サンゴ類の出現状況及び地点状況 (冬季)

調査地点	St. E	St. F	St. G
調査日	1月25日	1月25日	1月25日
水深	0. 4m	0. 3m	0. 4m
底質概観	岩盤	岩盤	岩盤
浮泥堆積状況	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)
サコノ類被度	20%	20%	10%
主な出現種	ハヤサヤンゴノ属 : 15% ミドリイシ属 (テプノル状) : 5%未満 コメノコキメシ属 : 5%未満 ミドリイシ属 (コリンボノース状) : 5%未満	ミドリイシ属 (テプノル状) : 15% ハヤサヤンゴノ属 : 5%未満 ミドリイシ属 (コリンボノース状) : 5%未満 コメノコキメシ属 : 5%未満	ハマサコノ属 (塊状) : 10% ミドリイシ属 (テプノル状) : 5%未満 キタメシ属 : 5%未満 ミドリイシ属 (樹枝状) : 5%未満
成育型	特定類優占型: ハヤサヤンゴノ属	特定類優占型: ミドリイシ属 (テプノル状)	特定類優占型: ハマサコノ属 (塊状)
白化段階	I (なし)	I (1%未満)	I (なし)
種サコノ (5cm未満群体の加入度)	5群体未満	5群体未満	5群体未満
卓状ミドリイシ類のサイズ 上位5群体 (cm)	100, 60, 60, 60, 50	110, 100, 100, 90, 80	50, 45, 30, 30, 30
ソフトコーラル被度	5%未満	1%未満	1%未満
主な出現種	カトサカ属 : 5%未満	カトサカ属 : 1%未満	カトサカ属 : 1%未満 ウミキノコ属 : 1%未満 ノコサカ属 : 1%未満
オヒトデ	なし	なし	なし
サコノ食巻貝類	I (食痕は目立たない)	I (食痕は目立たない)	I (なし)
特記事項	20cm程度の小型群体(ハヤサヤンゴノ属、ミドリイシ属)が多く分布。ハヤサヤンゴノ属が増加傾向(20～30cmの群体)。	地点から南側一帯の礁斜面に20～70cm程度のミドリイシ属が多く分布し(最大被度40%)、水深10m位まで一様に増加。	ハマサコノ属(塊状)上部に擦れあり。局所的に被度20～30%あり。ミドリイシ属(テプノル状)の出現が散見される。

注: 水深是那覇港湾験潮所基準面上(+)1. 34mを基準とした。

表ー 6. 2. 40 (3) サンゴ類の出現状況及び地点状況 (冬季)

調査地点	St. I	St. J	St. K
調査日	2月1日	1月22日	2月4日
水深	0. 7m	0. 8m	0. 9m
底質概観	サコノ礫、砂	岩盤	礫、砂
浮泥堆積状況	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)
サコノ類被度	0%	25%	55%
主な出現種	なし	ミドリイシ属 (テプノル状) : 20% ハヤサヤンゴノ属 : 5%未満 ミドリイシ属 (コリンボノース状) : 5%未満 ノコサコノ属 : 5%未満	コンサコノ属 (樹枝状) : 50% チビミリスコノ属 : 5%未満 クサビライシ属 : 5%未満 ミドリイシ属 : 5%未満
成育型	なし	特定類優占型: ミドリイシ属 (テプノル状)	特定類優占型: コンサコノ属 (樹枝状)
白化段階	I (なし)	I (1%未満)	I (なし)
種サコノ (5cm未満群体の加入度)	なし	5群体未満	なし
卓状ミドリイシ類のサイズ 上位5群体 (cm)	なし	100, 100, 90, 90, 90	なし
ソフトコーラル被度	0%	1%未満	5%未満
主な出現種	なし	カトサカ属 : 1%未満	ウミキノコ属 : 5%未満 カトサカ属 : 5%未満
オヒトデ	なし	なし	なし
サコノ食巻貝類	I (なし)	I (食痕は目立たない)	II (ミドリイシ属で散見される)
特記事項	海草藻場。	リーフ辺縁部にミドリイシ属は直径10～20cmで、生育状況は良好。リーフ上にも5cm前後の小型群体が多く確認された。	波浪等の外部要因によると思われる折れ等の欠損が広範囲で確認され、特に分布範囲の北側縁辺で顕著であった。

注: 水深是那覇港湾験潮所基準面上(+)1. 34mを基準とした。

表－ 6. 2. 40（4） サンゴ類の出現状況及び地点状況（冬季）

調査地点	St. L	St. M	St. N
調査日	1月25日	1月22日	1月22日
水深	3. 7m	1. 1m	0. 8m
底質概観	岩盤	岩盤、小礫	岩盤
浮泥堆積状況	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)
サンゴ類被度	5%	15%	15%
主な出現種	ハマサンゴ属（塊状）： 5%未満 ウスチャキメイシ属： 5%未満 ノコサンゴ属： 1%未満 コカメノコキメイシ属： 1%未満	コモンサンゴ属（樹枝状）： 10% ミドリイシ属（樹枝状）： 5%未満 キクメイシ属： 5%未満 ハマサンゴ属（塊状）： 5%未満	ミドリイシ属（コリンボース状）： 5% ミドリイシ属（テフノル状）： 5% ハヤサイサンゴ属： 5%未満 コカメノコキメイシ属： 1%未満
成育型	多種混成型	特定類優占型:コモンサンゴ属(樹枝状)	多種混成型
白化段階	I（なし）	I（なし）	I（1%未満）
稚サンゴ (5cm未満群体の加入度)	5群体未満	5群体未満	5群体未満
卓状ミドリイシ類のサイズ 上位5群体（cm）	15, 15, 15, 20, 20	40, 40, 30, 30, 20	60, 50, 50, 50
ソフトコーラル被度	1%未満	1%未満	1%未満
主な出現種	カトサカ属： 1%未満 ウネタケ属： 1%未満	カトサカ属： 1%未満	カトサカ属： 1%未満
オヒビテ	なし	なし	なし
サンゴ食巻貝類	I（なし）	I（食痕は目立たない）	I（なし）
特記事項	ミドリイシ属（テフノル状）及びミドリイシ属（コリンボース状）が増加傾向。	アンカーによるサンゴの折れ等破損が散見。 地点周辺にコモンサンゴ属（樹枝状）（被度20～30%）が局所的にみられる。	ミドリイシ属の小型群体（20cm前後）が増加傾向。コカメノコキメイシの成長が著しい。リーフの縁辺には局所的にサンゴ類被度25%の箇所を確認。

注：水深是那覇港湾験潮所基準面上(+)1. 34mを基準とした。

表－ 6. 2. 40（5） サンゴ類の出現状況及び地点状況（冬季）

調査地点	St. O	St. P	St. Q
調査日	2月1日	2月4日	1月22日
水深	11. 2m	0. 8m	0. 4m
底質概観	岩盤	岩盤	岩盤、礫、砂
浮泥堆積状況	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)	なし (海底面をはたいても濁らない)
サンゴ類被度	10%	15%	5%未満
主な出現種	ミドリイシ属（テフノル状）： 5%未満 ハヤサイサンゴ属： 5%未満 キクメイシ属： 5%未満 コカメノコキメイシ属： 5%未満	ミドリイシ属（テフノル状）： 10% ミドリイシ属（コリンボース状）： 5%未満 コカメノコキメイシ属： 5%未満 キクメイシ属： 5%未満	コモンサンゴ属（樹枝状）： 5%未満 コモンサンゴ属（被覆状）： 5%未満 コカメノコキメイシ属： 5%未満 ミドリイシ属（コリンボース状）： 5%未満
成育型	多種混成型	特定類優占型：ミドリイシ属（テフノル状）	多種混成型
白化段階	I（なし）	I（なし）	I（なし）
稚サンゴ (5cm未満群体の加入度)	5群体未満	5群体未満	5群体未満
卓状ミドリイシ類のサイズ 上位5群体（cm）	110, 80, 40, 30, 20	60, 50, 40, 40, 40	なし
ソフトコーラル被度	5%	5%未満	0%
主な出現種	カトサカ属： 5% ウミキノコ属： 5%未満 ウネタケ属： 5%未満	ウミキノコ属： 5%未満 カトサカ属： 5%未満 ウネタケ属： 5%未満	なし
オヒビテ	なし	なし	なし
サンゴ食巻貝類	I（食痕は目立たない）	I（なし）	I（なし）
特記事項	特になし。	ミドリイシ属の小型群体（30～40cm）が増加傾向。ミドリイシ属（テフノル状）の生育が良好で被度が増加。一方で、死亡もしくは部分死の個体も散見される。	特になし。

注：水深是那覇港湾験潮所基準面上(+)1. 34mを基準とした。

(10) 海草藻場（海藻草類）

1) 調査概要

5m×5m のコドラートを設置し、潜水目視観察により、海草藻場の主な出現種や被度を記録した。また、生育環境を把握するため、各地点の地形（水深、底質の概観等）、浮泥の堆積状況等を記録した。

なお、St. S1 の海草が平成 26 年度秋季以降に消失したため、その近傍にある北側藻場内の中央部に St. S1 の代替地点となる St. S7 を設置した。St. S1 については、今後も直ちに藻場が復元する可能性が低いことから、第 6 回那覇空港滑走路増設事業環境監視委員会に諮り、調査の中止を決定した。

2) 調査結果

各地点の海藻草類調査結果は表－ 6.2.41 に、海草藻場の分布状況は図－ 6.2.27 に、出現種一覧は表－ 6.2.42 に示すとおりである。

(ア) 夏季

ア) 藻場の被度

改変区域西側の 3 地点 (St. S2, S5, S7) について、夏季における藻場被度は、St. S2、S5 は 5%未満、St. S7 の被度は 20%であった。

閉鎖性海域に設定された 3 地点 (St. S3, S4, S6) のうち、St. S3、S4 の藻場被度は 5%未満であった。St. S6 では調査枠内に海草はみられなかったが、近傍にリュウキュウスガモの小群落が確認された。

イ) 構成種

St. S6 を除く 5 地点の構成種数は 3～4 種であった。St. S6 では海草は確認されなかった。

St. S3 では当該海域における主要な藻場構成種であるリュウキュウスガモがみられず、ウミジグサ、マツバウミジグサ、ウミヒルモの小型海草で構成されていた。

ウ) 生育環境

いずれの地点においても底質は礫交じりの砂であった。St. S4 では他地点と比較して礫が少なかった。

改変区域西側の 3 地点 (St. S2, S5, S7) では浮泥の堆積はみられなかった。

閉鎖性海域の 3 地点 (St. S3, S4, S6) の浮泥の堆積割合は 5%未満であった。

閉鎖性海域においては、伊良波排水路等陸域からの流入や深場の砂泥底からの巻き上げにより生じた砂泥が、波浪等の外力が小さいため滞留・堆積しやすいと考えられる。

浮泥の堆積は過年度調査時にも確認されているが、堆積割合や堆積厚が著しく大きい場合には海草や他の生物への影響も懸念されるため、状況を注視する。

エ) その他の状況

海草のない St. S6 を除く 5 地点で葉枯れがみられた (図ー 6. 2. 22)。葉枯れ割合は、St. S2 で 10%、St. S3 で 5%未満、St. S4 で 5%未満、St. S5 で 20%、St. S7 で 10%であった。

St. S6 と St. S7 を除く地点で葉上に藻類の付着が確認された。藻類の付着割合は St. S2 で 20%、St. S3 で 60%、St. S4 で 80%、St. S5 で 5%未満であった。

埋在生物の生息孔および塚の数は、閉鎖性海域の 3 地点 (St. S3, S4, S6) で改変区域西側の 3 地点 (St. S2, S5, S7) と比較して多かった。生息孔の周辺では地下茎の露出がみられ、塚に埋没した海草も確認された (図ー 6. 2. 24)。こうした埋在生物の活動が、長期的な被度低下の一因となっている可能性が考えられる。

(イ) 冬季

ア) 藻場の被度

改変区域西側の 3 地点 (St. S2, S5, S7) について、冬季における藻場被度は、St. S2、S5 は 5%未満、St. S7 の被度は 20%であった。

閉鎖性海域に設定された 3 地点 (St. S3, S4, S6) のうち、St. S3、S4 の藻場被度は 5%未満であった。St. S6 では調査枠内に海草はみられなかったが、近傍にリュウキュウスガモの小群落が確認された。

イ) 構成種

St. S6 を除く 5 地点の構成種数は 3~5 種であった。St. S6 では海草は確認されなかった。

St. S3 では当該海域における主要な藻場構成種であるリュウキュウスガモがみられず、ウミジグサ、マツバウミジグサ、ウミヒルモの小型海草で構成されていた。

ウ) 生育環境

いずれの地点においても底質は礫交じりの砂であった。St. S3、S4 では他地点と比較して礫が少なかった。

改変区域西側の 3 地点 (St. S2, S5, S7) では浮泥の堆積はみられなかった。

閉鎖性海域の 3 地点 (St. S3, S4, S6) の浮泥の堆積割合は 5%未満であった。

閉鎖性海域においては、伊良波排水路等陸域からの流入や深場の砂泥底からの巻き上げにより生じた砂泥が、波浪等の外力が小さいため滞留・堆積しやすいと考えられる。

浮泥の堆積は過年度調査時にも確認されているが、堆積割合や堆積厚が著しく大きい場合には海草や他の生物への影響も懸念されるため、状況を注視する。

St. S5 では、礫が多くみられ、マツバウミジグサの地下茎露出が確認された。物理的な影響による海底攪乱が生じたと推定され、台風接近時や冬季の季節風の吹き付けによる高波浪による影響と考えられる。


エ) その他の状況

海草のない St. S6 を除く 5 地点で葉枯れがみられた。


葉枯れ割合は、St. S2 で 20%、St. S3 で 10%、St. S4 で 30%、St. S5 で 40%、St. S7 で 20%であった。

St. S6 を除く地点で葉上に藻類の付着が確認された。藻類の付着割合は St. S2 で 30%、St. S3 で 20%、St. S4 で 50%、St. S5 で 10%、St. S7 で 25%であった。



埋在生物の生息孔および塚の数は、閉鎖性海域の 3 地点 (St. S3, S4, S6) で改変区域西側の 3 地点 (St. S2, S5, S7) と比較して多かった。冬季にこれらの生息孔において、ヤビーポンプ (砂質底に突き刺し吸引することで、スナモグリ類やアナジャコ類等の埋在生物を採取する筒状の調査機器 ; 図一 6.2.25) を使用して、スナモグリ類が確認された (図一 6.2.25)。こうした埋在生物の活動が、長期的な被度低下の一因となっている可能性が考えられる。



図一 6.2.21 礫の堆積 (左) とマツバウミジグサの地下茎露出 (右) の状況




図一 6.2.22 葉枯れの状況




図ー 6. 2. 23 葉上への微小藻類付着や浮泥堆積状況



図ー 6. 2. 24 埋在生物の生息孔



図ー 6. 2. 25 ヤビーポンプによる埋在生物の確認



図一 6.2.26 事後調査地点（海域生物・海域生態系、海域生物④）

表－ 6.2.41 (1) 各地点の海藻草類の調査結果 (St. S2)

調査地点		S2	
項目	調査時期	令和2年	令和3年
		7月	2月
水深		0.5m	0.5m
底質概観		岩盤、礫、砂	岩盤、礫、砂
海草藻場	海草藻場被度	5%未満	5%未満
	構成種数	3	3
	海藻草類出現種数	31	31
	出現種	リュウキュウスカモ 5%未満 ウミヒルモ 5%未満 マツバウミシグサ 5%未満	リュウキュウスカモ 5%未満 ウミヒルモ 5%未満 マツバウミシグサ 5%未満
浮泥	堆積割合	0%	0%
	堆積厚	－	－
砂面変動		+9cm	+8cm
食害生物の状況		なし	なし
葉上の藍藻類、 珪藻類等の付着	割合	20%	30%
葉枯れ割合		10%	20%
底生生物 の生息孔	山型	なし	なし
	すり鉢型	なし	なし

注1：水深は那覇港湾験潮所基準面上(+)1.34mを基準とし、基準面より高い場所はマイナス表記した。

2：砂面変動は平成26年5月に杭を設置、平成26年7月より堆積厚を計測。値は、設置時からの変動で示す。

表－ 6.2.41 (2) 各地点の海藻草類の調査結果 (St. S3)

調査地点		S3	
項目	調査時期	令和2年	令和3年
		7月	1月
水深		1.5m	1.5m
底質概観		砂、礫	砂
海草藻場	海草藻場被度	5%未満	5%未満
	構成種数	3	3
	海藻草類出現種数	11	13
	出現種	ウミシグサ 5%未満 マツバウミシグサ 5%未満 ウミヒルモ 5%未満	ウミシグサ 5%未満 マツバウミシグサ 5%未満 ウミヒルモ 5%未満
浮泥	堆積割合	5%未満	5%未満
	堆積厚	1mm未満	1mm未満
砂面変動		-6cm	-8cm
食害生物の状況		なし	なし
葉上の藍藻類、 珪藻類等の付着	割合	60%	20%
葉枯れ割合		5%未満	10%
底生生物 の生息孔	山型	13	23
	すり鉢型	20	14

注1：水深は那覇港湾験潮所基準面上(+)1.34mを基準とし、基準面より高い場所はマイナス表記した。

2：砂面変動は平成26年5月に杭を設置、平成26年7月より堆積厚を計測。値は、設置時からの変動で示す。

表－ 6.2.41 (3) 各地点の海藻草類の調査結果 (St. S4)

調査地点		S4	
項目	調査時期	令和2年	令和3年
		7月	1月
水深		1.6m	1.6m
底質概観		砂	砂
海草藻場	海草藻場被度	5%未満	5%未満
	構成種数	3	3
	海藻草類出現種数	18	15
	出現種	リュウキュウスカモ 5%未満	リュウキュウスカモ 5%未満
		ウミシグサ 5%未満	ウミシグサ 5%未満
		ウミヒルモ 5%未満	ウミヒルモ 5%未満
浮泥	堆積割合	5%未満	5%未満
	堆積厚	1mm未満	1mm未満
砂面変動		+4cm	+6cm
食害生物の状況		なし	なし
葉上の藍藻類、珪藻類等の付着	割合	80%	50%
葉枯れ割合		5%未満	30%
底生生物の生息孔	山型	31	20
	すり鉢型	21	18

注1：水深は那覇港湾験潮所基準面上(+)1.34mを基準とし、基準面より高い場所はマイナス表記した。

2：砂面変動は平成26年5月に杭を設置、平成26年7月より堆積厚を計測。値は、設置時からの変動で示す。

表－ 6.2.41 (4) 各地点の海藻草類の調査結果 (St. S5)

調査地点		S5	
項目	調査時期	令和2年	令和3年
		7月	2月
水深		0.7m	0.7m
底質概観		砂、礫	砂、礫
海草藻場	海草藻場被度	5%未満	5%未満
	構成種数	3	3
	海藻草類出現種数	8	13
	出現種	リュウキュウスカモ 5%未満	リュウキュウスカモ 5%未満
		マツバウミシグサ 5%未満	マツバウミシグサ 5%未満
		ウミヒルモ 5%未満	ウミヒルモ 5%未満
浮泥	堆積割合	0%	0%
	堆積厚	－	－
砂面変動		－6cm	+1cm
食害生物の状況		なし	なし
葉上の藍藻類、珪藻類等の付着	割合	5%未満	10%
葉枯れ割合		20%	40%
底生生物の生息孔	山型	なし	なし
	すり鉢型	なし	なし

注1：水深は那覇港湾験潮所基準面上(+)1.34mを基準とし、基準面より高い場所はマイナス表記した。

2：砂面変動は平成26年5月に杭を設置、平成26年7月より堆積厚を計測。値は、設置時からの変動で示す。

表－ 6.2.41 (5) 各地点の海藻草類の調査結果 (St. S6)

調査地点		S6	
項目 \ 調査時期		令和2年	令和3年
		7月	1月
水深		1.8m	1.8m
底質概観		砂、礫	砂、礫
海草藻場	海草藻場被度	0%（なし）	0%（なし）
	構成種数	0	0
	海藻草類出現種数	26	31
	出現種	なし	なし
浮泥	堆積割合	5%未満	5%未満
	堆積厚	1mm未満	1mm未満
砂面変動		+8cm	+8cm
食害生物の状況		なし	なし
葉上の藍藻類、珪藻類等の付着	割合	なし	なし
葉枯れ割合		なし	なし
底生生物の生息孔	山型	19	20
	すり鉢型	なし	1

注1：水深は那覇港湾験潮所基準面上(+)1.34mを基準とし、基準面より高い場所はマイナス表記した。


2：砂面変動は平成26年5月に杭を設置、平成26年7月より堆積厚を計測。値は、設置時からの変動で示す。

表－ 6.2.41 (6) 各地点の海藻草類の調査結果 (St. S7)


調査地点		S7			
項目 \ 調査時期		令和2年		令和3年	
		7月		2月	
水深		0.7m		0.7m	
底質概観		砂、礫		砂、礫	
海草藻場	海草藻場被度	20%		20%	
	構成種数	4		5	
	海藻草類出現種数	11		22	
	出現種	リュウキュウスガモ	15%	リュウキュウスガモ	15%
		ホウハアモ	5%未満	ホウハアモ	5%未満
		ウミシグサ	5%未満	ウミシグサ	5%未満
マツバウミシグサ		5%未満	マツバウミシグサ	5%未満	
	ウミヒルモ	5%未満			
浮泥	堆積割合	0%		0%	
	堆積厚	－		－	
砂面変動		+4cm		+9cm	
食害生物の状況		なし		なし	
葉上の藍藻類、珪藻類等の付着	割合	なし		25%	
葉枯れ割合		10%		20%	
底生生物の生息孔	山型	なし		なし	
	すり鉢型	なし		3	

注1：水深は那覇港湾験潮所基準面上(+)1.34mを基準とし、基準面より高い場所はマイナス表記した。


2：砂面変動は平成26年5月に杭を設置、平成26年7月より堆積厚を計測。値は、設置時からの変動で示す。




図一 6. 2. 27 (1) 海草藻場の分布状況 (St. S2 : 5m×5m コドラート)




図一 6. 2. 27 (2) 海草藻場の分布状況 (St. S3 : 5m×5m コドラート)




図一 6. 2. 27 (3) 海草藻場の分布状況 (St. S4 : 5m×5m コドラート)



図一 6.2.27 (4) 海草藻場の分布状況 (St. S5 : 5m×5m コドラート)



図一 6.2.27 (5) 海草藻場の分布状況 (St. S6 : 5m×5m コドラート)



図一 6.2.27 (6) 海草藻場の分布状況 (St. S7 : 5m×5m コドラート)

表－ 6.2.42 (1) 出現種一覧 (St. S2～S4)

No.	綱	目	科	調査地点	St. S2		St. S3		St. S4	
				和名	R2. 7	R3. 1-2	R2. 7	R3. 1-2	R2. 7	R3. 1-2
1	藍藻	－	－	藍藻綱	+	+	+	+	+	+
2	紅藻	ウミゾウメン	コナハダ	コナハダ属	+	+				
3		サンゴモ	ハハリデウム	サヒヅ科(無節サンゴモ類)	+	+				
4		スキノリ	イハラノリ	イハラノリ	+	+	+	+	+	+
5			イワノカワ	イワノカワ科	+	+				
6		オコノリ	オコノリ	オコノリ属	+		+		+	+
7		マサコシハナリ	フシツナギ	カイメンソウ					+	+
8		イゲス	イゲス	イゲス属	+					
9				ウヅケヅサ	+	+	+	+	+	+
10				ランケリア	+	+		+		+
11				イゲス科				+	+	+
12			フシマツモ	トケノリ	+	+	+	+		
13				ヤサキノリ属		+	+	+	+	+
14				マクリ	+	+				
15				アカソゾ					+	+
16				ソゾ属		+				
17				イトクスヅサ	+	+	+		+	
18	褐藻	シオミドロ	シオミドロ	シオミドロ科		+			+	
19		アミシグサ	アミシグサ	ハイオキ	+	+				
20				ウスユキウチワ	+	+				
21				ウミウチワ属	+	+				
22		カヤモノリ	ムラチドリ	ムラチドリ					+	
23			カヤモノリ	カコメノリ		+				
24		ヒハマタ	ホシタウラ	ホシタウラ属						
25	緑藻	アオサ	アオサ	ボウアオリ	+	+				
26				スジアオリ		+				
27				アオサ属	+	+		+		+
28		シオクサ	ウキオリソウ	ウキオリソウ	+					
29			シオクサ	シオクサ属	+	+			+	+
30		ミドリケ	ハローニア	キッコウケサ	+	+				
31		イワスタ	イワスタ	ヨレスタ	+					
32			ハコロモ	ハウチリ属	+	+	+		+	
33				サボテンクサ属	+	+				
34				ヒメイチョウ					+	
35				ハコロモ					+	
36		カサノリ	タシクラス	ミスタマ	+	+				
37				ウスカサネ	+	+				
38				フデノホ	+	+				
39		カサノリ		ホソエカサ				+		
40				リュウキュウカサ	+	+				
41				イソスキナ	+			+		+
42	単子葉植物	オモダカ	トチカガミ	リュウキュウスカモ	+	+			+	+
43				ウミヒルモ	+	+	+	+	+	+
44			ヘニアマモ	ウミシグサ			+	+	+	+
45				マツバウミシグサ	+	+	+	+		
藻場被度(%)					+	+	+	+	+	+
藻場構成種数					3	3	3	3	3	3
海藻草類出現種数					31	31	11	13	18	15

注1: 「+」は、5%未満であることを示す。

2: ■ は、海草藻場構成種を示す。

表－ 6. 2. 42 (2) 出現種一覧 (St. S5～S7)

No.	綱	目	科	調査地点	St. S5		St. S6		St. S7	
				和名	R2. 7	R3. 1-2	R2. 7	R3. 1-2	R2. 7	R3. 1-2
1	藍藻	—	—	藍藻綱	+	+	+	+		+
2	紅藻	サンゴモ	サンゴモ	カニテ属					+	
3			ハバ [○] リテ [○] ウム	サヒ [○] 亜科(無節サンゴモ類)	+	+	+	+	+	+
4		テンク [○] サ	テンク [○] サ	テンク [○] サ属			+			
5		スキ [○] ノリ	イバ [○] ラノリ	イバ [○] ラノリ		+	+	+	+	+
6			イワノカリ	イワノカリ科	+	+	+	+	+	+
7		オコ [○] ノリ	オコ [○] ノリ	オコ [○] ノリ属			+	+		
8		マサコ [○] シハ [○] リ	フシツナギ [○]	カイメンソウ			+	+		
9				テンク [○] サモト [○] キ属		+	+			
10				マサコ [○] シハ [○] リ	ニセイハ [○] ラノリ		+			
11		イギ [○] ス	イギ [○] ス	イギ [○] ス属				+		
12				ウブ [○] ケ [○] ク [○] サ			+	+		+
13				ランケ [○] リア				+		
14			フジ [○] マツモ	トゲ [○] ノリ			+	+		+
15				ヤナギ [○] ノリ属		+				+
16				アカソ [○]			+	+		
17				ソゾ [○] 属			+	+		
18				イトクス [○] ク [○] サ			+	+		+
19	褐藻	アミシ [○] ク [○] サ	アミシ [○] ク [○] サ	ハイオオギ [○]				+		
20				ウスユキウチリ	+	+	+		+	+
21				ウミウチリ属				+	+	
22		カヤモノリ	ムラチト [○] リ	ムラチト [○] リ			+			
23			カヤモノリ	カコ [○] メノリ			+			
24				モサクダ [○] フクロ			+			
25		ヒハ [○] マタ	ホンタ [○] ワラ	ホンタ [○] ワラ属			+	+		
26	緑藻	アオサ	アオサ	ボ [○] ウアオリ						5
27		シオク [○] サ	ウキオリソウ	ウキオリソウ			+			
28			シオク [○] サ	シオク [○] サ属		+	+	+		5
29		ミト [○] リケ [○]	ハ [○] ロニア	キッコウク [○] サ			+	+		+
30		イワス [○] タ	イワス [○] タ	クヒ [○] レス [○] タ				+		
31				センナリス [○] タ				+		
32				ヒラエス [○] タ			+	+		
33				ヨレス [○] タ			+	+		
34			ハコ [○] ロモ	サボ [○] テンク [○] サ属		+	+	+		
35				ヒメイチョウ			+	+		
36				ハコ [○] ロモ		+				+
37		カサノリ	ダ [○] シ [○] クラス [○] ス	ミス [○] タマ				+	+	+
38				ウスカ [○] サネ		+				
39				フデ [○] ノホ	+		+	+		+
40			カサノリ	ホソエカ [○] サ				+		
41				リュウキョウカ [○] サ			+	+		+
42				イソスキ [○] ナ						+
43	単子葉植物	オモダ [○] カ	トチカガ [○] ミ	リュウキョウウスカ [○] モ	+	+			15	15
44				ウミヒルモ	+	+				+
45		ベ [○] ニアマモ	ウミシ [○] ク [○] サ					+	+	
46			マツハ [○] ウミシ [○] ク [○] サ	+	+		+	+	+	
47			ボ [○] ウハ [○] アマモ					+	+	
藻場被度(%)					+	+	0	0	20	20
藻場構成種数					3	3	0	0	4	5
海藻草類出現種数					8	13	26	31	11	22

注1: 「+」は、5%未満であることを示す。

2: ■ は、海草藻場構成種を示す。

3) 重要な種

海藻草類調査において確認された重要な種は表－ 6.2.43 に示すとおりである。

令和２年度において、重要な種は９種確認された。いずれもこれまでに確認された種であった。

表－ 6.2.43 確認された重要な種及び確認位置（海藻草類）

No.	和名	環境省 RL 2017	沖縄県 RDB	水産庁 DB	WWF	確認地点					
						St. S2	St. S3	St. S4	St. S5	St. S6	St. S7
1	スジ [°] アオリ			減少傾向		冬					
2	クレズ [°] タ	DD								冬	
3	ウスカ [°] サネ	VU	VU			夏・冬			冬		
4	ホソエカ [°] サ	CR+EN	CR+EN	絶滅危惧			冬			冬	
5	リュウキュウスカ [°] モ	NT				夏・冬		夏・冬	夏・冬		夏・冬
6	ウミヒルモ	NT				夏・冬	夏・冬	夏・冬	夏・冬		冬
7	ウミジ [°] ク [°] サ	NT	NT				夏・冬	夏・冬			夏・冬
8	マツバ [°] ウミジ [°] ク [°] サ	NT	VU			夏・冬	夏・冬		夏・冬		夏・冬
9	ホ [°] ウハ [°] アモ	NT	NT								夏・冬

以下の①～④のいずれかに該当しているものを「重要な種」として選定した。

- ① 環境省 RL：「環境省レッドリスト 2020」（環境省、令和 2 年 3 月 27 日）に記載されている種及び亜種
- ・絶滅危惧Ⅰ類：絶滅の危機に瀕している種
 - ・絶滅危惧ⅠA類：絶滅の危機に瀕している種のうち、ごく近い将来における野生での絶滅の可能性が極めて高いもの
 - ・絶滅危惧ⅠB類：絶滅の危機に瀕している種のうち、A 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
 - ・絶滅危惧Ⅱ類：絶滅の危険が増大している種
 - ・準絶滅危惧：存続基盤が脆弱な種。現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種
 - ・情報不足：評価するだけの情報が不足している種
 - ・地域個体群：地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれが高い個体群
- ② 水産庁 DB：「日本の希少な野生水生生物に関するデータブック」（水産庁、平成 12 年）に記載されている種及び亜種
- ・絶滅危惧種：絶滅の危機に瀕している種・亜種
 - ・危急種：絶滅の危険が増大している種・亜種
 - ・希少種：存続基盤が脆弱な種・亜種
 - ・減少種：明らかに減少しているもの
 - ・減少傾向：長期的に見て減少しつつあるもの
- ③ 沖縄県 RDB：「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（レッドデータおきなわ）－菌類編・植物編－」（平成 30 年、沖縄県）に記載されている種及び亜種
- ・絶滅危惧Ⅰ類：沖縄県では絶滅の危機に瀕している種
 - ・絶滅危惧ⅠA類：沖縄県では、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
 - ・絶滅危惧ⅠB類：沖縄県では A 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
 - ・絶滅危惧Ⅱ類：沖縄県では絶滅の危機が増大している種
 - ・準絶滅危惧：沖縄県では存続基盤が脆弱な種
 - ・情報不足：沖縄県では評価するだけの情報が不足している種
 - ・絶滅のおそれのある地域個体群：沖縄県で地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの
- ④ WWF：「WWF Japan Science Report3 日本における干潟海岸とそこに生息する底生動物の現状」（平成 8 年、和田）に記載されている種及び亜種
- ・絶滅：野生状態ではどこにも見あたらなくなった種
 - ・絶滅寸前：人為の影響の如何に関わらず、個体数が異常に減少し、放置すればやがて絶滅すると推定される種
 - ・危険：絶滅に向けて進行しているとみなされる種。今すぐ絶滅という危機に瀕するということはないが、現状では確実に絶滅の方向へ向かっていると判断されるもの
 - ・稀少：特に絶滅を危惧されることはないが、もともと個体数が非常に少ない種
 - ・普通：個体数が多く普通にみられる種
 - ・現状不明：最近の生息の状況が乏しい種

(11) クビレミドロ

1) 調査概要

瀬長島北側の深場におけるクビレミドロの生育場において、クビレミドロの藻体の生育状況（被度）、分布面積、分布状況（高被度域の分布箇所など）、地形（水深、底質の概観）、浮泥の堆積状況の項目について調査を行いクビレミドロの分布状況を把握した。

2) 調査結果

残存域の被度別生育面積は表－ 6.2.44 に、分布状況の変化は図－ 6.2.28 に示すとおりである。

なお、クビレミドロについては、冬から春にかけて繁茂する生態的特性を踏まえて、分布面積が最も拡大した令和3年4月のデータを加えて考察を行った。

(ア) 生育面積と被度

残存域における生育面積は、令和2年4月に14.3haであったが、6月には0.7haまで減衰した。夏季休眠期を経た令和3年1月には7.0haとなり、4月には13.6haまで増加した。

被度別生育面積については、令和2年4月には被度6～10%、1～5%、1%未満の分布域が確認され、被度1～5%の分布域が最も大きかった。5月には被度1～5%と1%未満の分布域が確認され、6月には被度1%未満の分布域のみが確認された。令和3年1～2月には被度1%未満の分布域のみが確認され、3～4月には被度1～5%と1%未満の分布域が確認された。

(イ) 生育環境

ア) 底質基盤

クビレミドロが確認された地点における底質は、大部分が砂泥もしくは細砂であった。

なお、クビレミドロが確認された地点におけるコドラート内（30 cm×30 cm）の生物生息孔は大部分が1～10か所もしくは11～50か所であった。

イ) 浮泥の堆積状況

汚泥の堆積状況は図－ 6.2.29 に示すとおりである。

St. 18を除く全ての地点で浮泥の堆積厚が1mm以下であった。St. 28における浮泥堆積状況の経年比較をみると、堆積厚は平成29年4月に3mmであったが、平成30年4月、平成31年4月、令和2年4月、令和3年4月には1mmもしくは1mm未満であった。

表ー 6.2.44 クビレミドロの被度別生育面積（残存域）

単位：ha

調査年月 項目	事後調査						
	令和2年			令和3年			
	4月	5月	6月	1月	2月	3月	4月
被度6～10%	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
被度1～5%	7.4	0.9	0.0	0.0	0.0	1.3	0.9
被度1%未満	5.8	6.8	0.7	7.0	12.1	12.2	12.7
合計	14.3	7.7	0.7	7.0	12.1	13.5	13.6

※重要種保護のため位置情報は表示しない。

※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図一 6.2.28 (1) クビレミドロの分布状況の変化（令和2年4月～令和3年3月）

※重要種保護のため位置情報は表示しない。

図ー 6.2.28 (2) クビレミドロの分布状況の変化 (令和3年4月)

St. 28			
H29. 4		R2. 4	
	堆積厚 3mm		堆積厚 1mm
H30. 4		R3. 4	
	堆積厚 1mm		堆積厚 1mm 未満
H31. 4			
	堆積厚 1mm 未満		

図－ 6. 2. 29 浮泥の堆積状況

(12) 水質

1) 調査概要

「水質調査方法」(環境庁)等に基づき、バンドーン型採水器等を用いて、下げ潮時に海面下 0.5m 層より採水した。また、現場測定項目については、採水時当日の天候、気温、風速、波高、潮汐状況、測点、水温、塩分、試料の外観、周囲の状況等を記録した。また、水温・塩分については、CTD (「Conductivity Temperature Depth profiler」の略称であり、電気伝導度・水温・深度を計測する機器) により、鉛直分布を記録した。

生活環境項目及びその他の項目については、JIS 等に定められた公定法により分析した。

2) 調査結果

(ア) 現場測定項目

現場測定項目の結果は表ー 6.2.45 及び表ー 6.2.46 に示すとおりである。

表ー 6.2.45 気象等の状況

	夏季		冬季	
	採水前日	採水当日	採水前日	採水当日
	令和2年8月19日	令和2年8月20日	令和2年12月16日	令和2年12月17日
天気	晴	晴	曇後時々雨	曇一時雨
気温(℃)	30.3	30.5	16.3	16.5
降水量(mm)	－	－	1.0	0.5
風速(m/s)	3.8	3.9	5.6	4.8
波高(m) 有義波高	0.17～0.36	0.16～0.38	1.38～2.76	1.76～2.65
潮汐状況	大潮	大潮	大潮	中潮


注1: 天気、気温、風速は気象庁ホームページ「過去の気象データ検索:那覇」を基に作成した。

天気は、昼(6:00～18:00)の天気概況、気温は日ごとの平均気温、風速は日ごとの平均風速、採水当日の降水量については、採水時間までの合計を示す。

2: 波浪はナウファスホームページ「過去のデータ、連続データ速報値:那覇」を基に作成した。

波高は有義波高の最大と最小を、「－」は欠測を示す。

3: 潮汐状況は気象庁ホームページ「潮位表:那覇」を基に作成した。



図一 6.2.30 事後調査地点（海域生物・海域生態系、生息・生育環境①）

表－ 6.2.46 (1) 現場測定項目（夏季）

調査日：令和2年8月20日

調査地点	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5
潮時	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ
採水時間	9:06	7:40	9:18	8:00	9:35
天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
雲量	2	1	4	2	2
風向	北北東	東北東	北北東	東北東	北北東
風速 (m/s)	3.2	3.1	3.4	4.2	3.2
波高 (風浪階級)	2	1	2	1	2
気温 (°C)	30.2	30.0	29.6	30.5	30.1
水深 (m)	19.9	8.8	1.1	1.3	15.3
水温 (°C)	29.5	30.2	29.6	30.3	29.6
透明度	18.2	3.2	着底	着底	着底
水色	2	4	3	4	2
油膜	なし	なし	なし	なし	なし
濁り	なし	なし	なし	なし	なし
臭気	なし	なし	なし	なし	なし
備考	なし	なし	なし	なし	なし
汚濁負荷源の状況	なし	なし	なし	なし	なし
採水地点周辺状況	なし	なし	なし	なし	なし

調査地点	St. 6	St. 7	St. 8	St. 9	St. 10
潮時	下げ	下げ	下げ	下げ	下げ
採水時間	9:55	10:03	8:26	8:14	8:38
天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
雲量	4	6	3	2	2
風向	東北東	北北東	東北東	東北東	東
風速 (m/s)	2.9	2.8	3.4	3.8	3.8
波高 (風浪階級)	1	0	1	1	1
気温 (°C)	30.2	30.2	30.1	30.6	30.4
水深 (m)	2.6	2.3	5.5	1.0	1.0
水温 (°C)	30.2	30.3	30.0	30.4	30.5
透明度	着底	2.2	着底	着底	着底
水色	4	4	3	5	5
油膜	なし	なし	なし	なし	なし
濁り	なし	なし	なし	なし	なし
臭気	なし	なし	なし	なし	なし
備考	なし	なし	なし	なし	なし
汚濁負荷源の状況	なし	なし	なし	なし	なし
採水地点周辺状況	なし	なし	なし	なし	なし

注1：波高は風浪階級により観測した。

2：位置だしの方法・測点・角度はGNSSにて行った。

3：水色はフォーレル・ウーレ水色標準液に対応する水色階級を示した。

表－ 6.2.46 (2) 現場測定項目 (冬季)

調査日：令和2年12月17日

調査地点	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5
潮時	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮
採水時間	10:36	9:25	10:49	9:34	10:58
天気	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
雲量	10	10	10	10	10
風向	北東	北東	北東	北東	北東
風速 (m/s)	3	3	3	3	3
波高 (風浪階級)	4	3	2	2	2
気温 (°C)	15.5	14.0	17.0	15.2	15.8
水深 (m)	20.0	10.4	1.0	1.2	13.5
水温 (°C)	23.0	21.0	22.0	20.7	22.2
透明度	着底	3.5	着底	着底	着底
水色	2	3	3	4	3
油膜	なし	なし	なし	なし	なし
濁り	なし	なし	なし	なし	なし
臭気	なし	なし	なし	なし	なし
備考	なし	なし	なし	なし	なし
汚濁負荷源の状況	なし	なし	なし	なし	なし
採水地点周辺状況	なし	なし	なし	なし	なし

調査地点	St. 6	St. 7	St. 8	St. 9	St. 10
潮時	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮
採水時間	11:09	11:16	10:03	9:48	10:11
天気	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
雲量	10	10	10	10	10
風向	北東	北東	北東	北東	北東
風速 (m/s)	3	3	3	3	3
波高 (風浪階級)	2	2	2	2	2
気温 (°C)	15.8	15.3	16.0	14.4	15.9
水深 (m)	2.4	2.6	5.0	1.0	0.8
水温 (°C)	20.2	21.0	20.4	19.2	18.2
透明度	着底	着底	着底	着底	着底
水色	4	3	3	5	4
油膜	なし	なし	なし	なし	なし
濁り	なし	なし	なし	なし	なし
臭気	なし	なし	なし	なし	なし
備考	なし	なし	なし	なし	なし
汚濁負荷源の状況	なし	なし	なし	なし	なし
採水地点周辺状況	なし	なし	なし	なし	なし

注1：波高は風浪階級により観測した。

2：位置だしの方法・測点・角度はGNSSにて行った。

3：水色はフォーレル・ウーレ水色標準液に対応する水色階級を示した。

表－ 6.2.47 風浪階級表

風浪階級	波高	記述
0	no wave	鏡のようになめらかである
1	0 - 0.10	さざ波がある
2	0.10 - 0.50	なめらか、小波がある
3	0.50 - 1.25	やや波がある
4	1.25 - 2.50	かなり波がある
5	2.50 - 4.00	波がやや高い
6	4.00 - 6.00	波がかなり高い
7	6.00 - 9.00	相当荒れている
8	9.00 - 14.00	非常に荒れている
9	14.00+	異常な状態

表－ 6.2.48 風力階級表（風力と風速）

風力	日本名	日本名	地上10mの 風速m/s	陸上の状態	海上の状態
0	平穏	へいおん	0.0～0.2	煙はまっすぐのぼる	鏡のようになめらか
1	至軽風	しけいふう	0.3～1.5	煙のなびきで風向がわかる	うろこのようなさざ波がでる
2	軽風	けいふう	1.6～3.3	木の葉が動く	小波の小さなものがはっきりしてくる
3	軟風	なんふう	3.4～5.4	木の葉や小枝が絶えず動く	小波の大きいもの。波頭が砕けはじめ、ところどころに白波
4	和風	わふう	5.5～7.9	砂埃が立ち、紙片が舞い上がる	小波だが波長が長くなる。白波がかなり多くなる。
5	疾風	しゅっふう	8.0～10.7	樹木が揺れ始める	はっきりした中位の波。 波長は長くなり白波がたつて、しぶきを生ずる事がある
6	雄風	ゆうふう	10.8～13.8	傘が使えなくなる。	大きい波が出来る。 いたるところに白く泡だった波頭がひろがり、しぶきを生じる
7	強風	きょうふう	13.9～17.1	樹木全体が揺れる	波は益々大きく、波頭が砕ける。 白い泡が筋を引いて風下に吹き流れる
8	疾強風	しっきょうふう	17.2～20.7	小枝折れる。風に向かって歩けない	大波のやや小さい部類。波長が長くなり波頭が砕け水煙となりはじめる。 風下に流される泡筋は明確になる
9	大強風	だいきょうふう	20.8～24.4	煙突が折れる。瓦が飛ぶ。	大波。泡は濃い筋を引いて風下に吹き流され、波頭はのめって 崩れ落ち、逆巻きはじめる。しぶきの為視程は悪化する。
10	全強風	ぜんきょうふう	24.5～28.4	樹木が根こそぎ倒れる。	非常に高い大波になり、波頭はのしかかるようになる。 海面は真っ白になり波の崩れ方激しく、視界はしぶきの為悪い。
11	暴風	ぼうふう	28.5～32.6	家屋、建物 滅多に起こらない 広い範囲の破壊	山のような大波の連続で、中小の船舶は波に隠れて見えなくなることがでてる。 海面は長い白い泡の塊に覆われ、波頭の端は水煙となり、視界不良。
12	颱風	たいふう	32.7以上	大規模な損壊 被害は甚大	泡としぶきで海面白濁、視界は極端に悪化。

(イ) 水温・塩分

採取時に CTD (「Conductivity Temperature Depth profiler」の略称であり、電気伝導度・水温・深度を計測する機器) で測定した水温・塩分の鉛直分布は図－ 6.2.31 に示すとおりである。

ア) 夏季

(a) 水温

採水層 (0.5m) における水温は、閉鎖性海域 (St. 2, 4, 8, 9, 10) は 30.0～30.5℃、閉鎖性海域外 (St. 1, 3, 5, 6, 7) は 29.5～30.3℃であり、閉鎖性海域では St. 10 が最も高く、閉鎖性海域外では St. 7 が高かった。

各地点の鉛直分布については、採水層と海底直上で大きな水温の差はなかった。

(b) 塩分

採水層 (0.5m) における塩分は、34.3～34.4 で地点間の差はほとんどなかった。各地点の鉛直分布をみると、いずれの地点も底層まで一様に分布していた。


イ) 冬季

(a) 水温


採水層 (0.5m) における水温は、閉鎖性海域 (St. 2, 4, 8, 9, 10) は 18.2～21.0℃、閉鎖性海域外 (St. 1, 3, 5, 6, 7) は 20.2～23.0℃であり、閉鎖性海域では St. 2 が最も高く、閉鎖性海域外では St. 1 が高かった。

(b) 塩分

採水層 (0.5m) における塩分は、34.5～34.6 で地点間の差はほとんどなかった。また採水層と海底直上で大きな塩分の差はなかった。



図一 6.2.31 (1) 水温、塩分の鉛直分布 (夏季)



図一 6.2.31 (2) 水温、塩分の鉛直分布 (冬季)

(ウ) 生活環境項目等

海域の水質分析結果は、表－ 6.2.49 に示すとおりである。

ア) 夏季

(a) pH

pH は全地点において 8.1～8.2 であり、地点間で差はみられなかった。

参考として、環境基準の A 類型（pH：7.8 以上 8.3 以下）と比較すると、全地点において環境基準を満たしていた。

(b) D0

D0 は 5.5～6.5mg/L であり、全体的に低い値を示していた。

参考として、環境基準の A 類型（D0：7.5mg/L 以上）と比較すると、全地点において環境基準を満たさなかったが、D0 飽和度は 88.1～103.0% と高かった。

酸素等の気体は水温が高いほど溶解みにくい性質を有しているため、水温が高い沖縄周辺海域の D0 は環境基準以下となることが多い。沖縄県の公共用水質測定結果においても、同様の傾向が確認されており、水温等の自然要因が大きいと考えられることを述べている。^{出典}

出典：平成 29 年度水質測定結果（公共用水域及び地下水） 沖縄県環境部環境保全課

(c) n-ヘキサン抽出物質

n-ヘキサン抽出物質は全地点において、定量下限値（0.5mg/L）未満であり、検出されなかった。

参考として、環境基準の A 類型（n-ヘキサン抽出物：検出されないこと）と比較すると、全地点で環境基準を満たしていた。

(d) 大腸菌群数

大腸菌群数は 0.0MPN/100mL～46MPN/100mL であり、全体的に低い値を示していた。

参考として、環境基準の A 類型（大腸菌群数：1,000MPN/100mL 以下）と比較すると、全地点において環境基準を満たしていた。

(e) COD

COD は 0.6～1.6mg/L であり、St.9 で最も高かった。

参考として、環境基準の A 類型（COD：2mg/L 以下）と比較すると、全地点で環境基準を満たしていた。

(f) T-N（全窒素）

T-N は 0.09～0.18mg/L であり、St.7 で最も高かった。

参考として、環境基準のⅠ類型（T-N：0.2mg/L以下）と比較すると、全地点で環境基準を満たしていた。

(g) T-P（全りん）

T-Pは0.006～0.037mg/Lであり、St.7で最も高かった。

参考として、環境基準のⅠ類型（T-P：0.02mg/L以下）と比較すると、St.7で環境基準を上回っていたものの、その他の全地点では環境基準を満たしていた。

(h) クロロフィル a

クロロフィル a は0.23～1.70mg/Lであり、St.10で最も高かった。

(i) SS

SSは定量下限値（1mg/L）未満～11mg/Lであり、St.7で最も高かった。

(j) 濁度

濁度は0.2度カオリン～8.7度カオリンであり、St.7で最も高かった。

イ) 冬季

(a) pH

pH は全ての地点で 8.2 であり、地点間で変化は見られなかった。

参考として、環境基準の A 類型 (pH : 7.8 以上 8.3 以下) と比較すると、全地点において環境基準を満たしていた。

(b) DO

DO は 7.0~7.8mg/L であり、全体的にやや低い値を示していた。

参考として、環境基準の A 類型 (DO : 7.5mg/L 以上) と比較すると、St. 3 及び St. 10 は環境基準を満たしていたが、その他の地点では環境基準を満たさなかった。

なお、環境基準を満たしていなかった地点においても、DO 飽和度は 97.5~102.0% と高かった。

(c) n-ヘキサン抽出物質

n-ヘキサン抽出物質は全地点において、定量下限値 (0.5mg/L) 未満であり、検出されなかった。

参考として、環境基準の A 類型 (n-ヘキサン抽出物 : 検出されないこと) と比較すると、全地点で環境基準を満たしていた。

(d) 大腸菌群数

大腸菌群数は 2.0~13.0 MPN/100mL であり、全体的に低い値を示していた。

参考として、環境基準の A 類型 (大腸菌群数 : 1,000MPN/100mL 以下) と比較すると、全地点において環境基準を満たしていた。

(e) COD

COD は 0.8~1.8mg/L であり、St. 2 で最も高かった。

参考として、環境基準の A 類型 (COD : 2mg/L 以下) と比較すると、全地点で環境基準を満たしていた。

(f) T-N (全窒素)

T-N は 0.08~0.18mg/L であり、St. 2 で最も高かった。

参考として、環境基準の I 類型 (T-N : 0.2mg/L 以下) と比較すると、全地点で環境基準を満たしていた。

(g) T-P (全りん)

T-P は 0.004~0.007mg/L であり、地点間で大きな変化は見られなかった。

参考として、環境基準の I 類型 (T-P : 0.02mg/L 以下) と比較すると全地点で環境

基準を満たしていた。

(h) クロロフィル a

クロロフィル a は 0.21～0.36mg/L であり、地点間で大きな変化は見られなかった。

(i) SS

SS は定量下限値 (1mg/L) 未満～1.0mg/L であり、地点間で大きな変化は見られなかった。

(j) 濁度

濁度は 0.1 未満～1.7 度カオリンであり、地点間で大きな変化は見られなかった。

表－ 6.2.49 (1) 水質分析結果 (夏季)

調査日：令和2年8月20日

計量の対象	単位	試料名				
		St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5
水素イオン濃度 (pH) (pH測定時水温)	－ ℃	8.1 (28.8)	8.1 (28.8)	8.2 (28.3)	8.1 (28.7)	8.2 (28.9)
溶存酸素量 (DO) (溶存酸素量(DO)飽和度)※	mg/L %	6.5 (103.0)	5.8 (92.8)	6.4 (102.0)	5.6 (89.9)	6.1 (96.8)
ノルマルヘキサン 抽出物質質量 (n-hex)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
大腸菌群数※	MPN/100mL	4.5	4.5	2.0	11.0	0.0
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	1.5	1.3	0.6	0.7	1.2
全窒素 (T-N)	mg/L	0.11	0.13	0.11	0.17	0.09
全リン (T-P)	mg/L	0.007	0.012	0.006	0.018	0.006
クロロフィルa※	μg/L	0.26	1.20	0.26	1.40	0.23
浮遊物質質量 (SS)	mg/L	<1	3	<1	4	<1
濁度※	度カオリン	0.2	2.3	2.0	3.5	0.2

計量の対象	単位	試料名				
		St. 6	St. 7	St. 8	St. 9	St. 10
水素イオン濃度 (pH) (pH測定時水温)	－ ℃	8.1 (28.0)	8.1 (28.3)	8.1 (28.1)	8.2 (27.9)	8.2 (27.4)
溶存酸素量 (DO) (溶存酸素量(DO)飽和度)※	mg/L %	6.0 (96.0)	5.5 (88.1)	5.7 (91.1)	6.4 (103.0)	6.0 (96.6)
ノルマルヘキサン 抽出物質質量 (n-hex)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
大腸菌群数※	MPN/100mL	2.0	46.0	0.0	0.0	4.5
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	0.6	0.6	0.6	1.6	0.8
全窒素 (T-N)	mg/L	0.12	0.18	0.12	0.16	0.15
全リン (T-P)	mg/L	0.012	0.037	0.011	0.014	0.018
クロロフィルa※	μg/L	1.30	1.00	0.87	1.40	1.70
浮遊物質質量 (SS)	mg/L	2	11	1	3	4
濁度※	度カオリン	2.1	8.7	1.2	2.7	3.7

注1:※印は計量法第107条の計量対象外の項目を示す。

2:計量の結果欄に「<」の表示の数値は定量下限値を示す。

表－ 6.2.49 (2) 水質分析結果 (冬季)

調査日：令和2年12月17日

計量の対象	単位	試料名				
		St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5
水素イオン濃度 (pH) (pH測定時水温)	－ ℃	8.2 (19.6)	8.2 (19.4)	8.2 (19.4)	8.2 (19.2)	8.2 (19.0)
溶存酸素量 (DO) (溶存酸素量(DO)飽和度)※	mg/L %	7.1 (102.0)	7.4 (102.0)	7.8 (109.0)	7.3 (98.8)	7.0 (100.0)
ノルマルヘキサン 抽出物質質量 (n-hex)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
大腸菌群数※	MPN/100mL	4.5	13.0	7.8	4.0	2.0
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	1.0	1.8	0.8	1.0	0.9
全窒素 (T-N)	mg/L	0.08	0.18	0.09	0.11	0.08
全リン (T-P)	mg/L	0.004	0.007	0.004	0.005	0.004
クロロフィルa※	μg/L	0.21	0.24	0.24	0.36	0.22
浮遊物質質量 (SS)	mg/L	<1	1	<1	1	<1
濁度※	度カオリン	<0.1	1.2	<0.1	1.7	<0.1

計量の対象	単位	試料名				
		St. 6	St. 7	St. 8	St. 9	St. 10
水素イオン濃度 (pH) (pH測定時水温)	－ ℃	8.2 (19.3)	8.2 (19.8)	8.2 (19.9)	8.2 (19.7)	8.2 (20.0)
溶存酸素量 (DO) (溶存酸素量(DO)飽和度)※	mg/L %	7.4 (99.1)	7.0 (97.5)	7.2 (97.8)	7.4 (99.6)	7.8 (101.0)
ノルマルヘキサン 抽出物質質量 (n-hex)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
大腸菌群数※	MPN/100mL	7.8	4.5	4.0	7.8	2.0
化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	0.9	1.1	1.0	1.0	0.9
全窒素 (T-N)	mg/L	0.08	0.08	0.10	0.12	0.09
全リン (T-P)	mg/L	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006
クロロフィルa※	μg/L	0.23	0.29	0.21	0.30	0.26
浮遊物質質量 (SS)	mg/L	<1	1	1	1	1
濁度※	度カオリン	0.3	0.2	<0.1	0.7	0.8

注1:※印は計量法第107条の計量対象外の項目を示す。

注2:計量の結果欄に「<」の表示の数値は定量下限値を示す。

(13) 底質

1) 調査概要

「底質調査方法」(環境庁) 及び「赤土等流出防止対策の手引き」(沖縄県環境保健部) に基づき、スミス・マッキンタイヤー型採泥器を用い、ダイバーにより直接採泥するものとし、1 地点から 3 回以上採泥した。岩礁、サンゴ礁等表面が砂泥質でない場合は、地点近傍あるいは間隙に溜まっている砂泥質を採取した。また、現場測定項目については、泥温、外観、臭気等を記録した。一般項目及び SPSS については底質分析法、JIS 等に定められた公定法により分析した。

なお、外観については、採泥した土砂を船上でバットに移し、混合した状態で、目視により観察した結果を記録した。粒度組成は、この土砂を用いて分析した。しかし、75mm 以上の砂礫は粒度組成分析の対象外であるため、75mm 以上の砂礫による底質状況を確認するために、外観の性状を記録するとともに、分析サンプルのチェックにも用いた。

2) 調査結果

(ア) 現場測定項目

現場測定項目の結果は表－ 6.2.50 に示すとおりである。

ア) 泥温


泥温は夏季は 27.5～37.0℃、冬季は 18.0～24.1℃であった。

イ) 臭気

臭気は夏季は St.4 及び St.6 で確認されたが、冬季は確認されなかった。

ウ) 外観

夏季及び冬季とも St.1、10、13 は砂、St.2、7、8、17 で砂泥、その他の地点は砂礫であった。



図一 6.2.32 事後調査地点（海域生物・海域生態系、生息・生育環境①）

表－ 6.2.50 (1) 現場測定項目 (夏季)

区分	調査地点	調査日	採泥時間	天気	雲量	風向	風速	波高 (風浪階級)	気温 (℃)	水深 (m)	泥温 (℃)	外観			臭気
												性状	色調	夾雑物	
礁池・ 礁縁域	St. 1	7/8	8:05	曇り	9	南南西	5.9	2	29.8	19.3	27.6	砂	明オリーブ灰	なし	なし
	St. 2	7/9	7:35	小雨	10	南	5.5	1	27.0	11.1	27.6	砂泥	灰	なし	なし
	St. 3	7/8	8:35	曇り	9	南南西	5.8	1	29.3	1.3	27.8	砂礫	灰	海草片	なし
	St. 4	7/9	8:00	曇り	9	南	6.8	1	27.2	1.0	30.0	砂礫	暗緑灰	サンゴ片	あり
	St. 5	7/8	9:15	曇り	10	南	6.2	1	29.6	10.8	27.5	砂礫	灰オリーブ	貝・石	なし
	St. 6	7/8	10:05	曇り	9	南南西	6.5	1	30.3	3.1	28.8	砂礫	灰オリーブ	サンゴ片	あり
	St. 7	7/9	9:10	晴れ	8	南	6.4	2	27.4	3.9	28.4	砂泥	灰	なし	なし
	St. 8	7/9	8:45	曇り	9	南	7	1	27.1	5.0	28.2	砂泥	灰	なし	なし
干潟域	St. 9	7/21	11:00	雨	9	東北東	0.8	－	26.8	－	29.6	砂礫	灰黄	サンゴ片	なし
	St. 10	7/21	12:05	小雨	8	北北東	3.5	－	28.0	－	29.3	砂	灰オリーブ	なし	なし
礁池・礁縁域	St. 11	7/8	9:00	曇り	10	南	5.6	1	29.4	3.7	27.8	砂礫	淡黄	なし	なし
干潟域	St. 12	7/20	10:45	晴れ	3	南南西	5.7	－	30.0	－	32.2	砂礫	浅黄	サンゴ片+石	なし
礁池・礁縁域	St. 13	7/8	7:40	曇り	9	南南西	5.1	0	29.2	3.3	27.5	砂	灰オリーブ	なし	なし
干潟域	St. 14	7/20	12:15	晴れ	2	南	5	－	32.1	－	35.1	砂礫	灰	サンゴ片	なし
	St. 15	7/20	13:25	晴れ	3	南	4.6	－	31.9	－	36.5	砂礫	灰オリーブ	サンゴ片+石	なし
礁池・礁縁域	St. 16	7/9	8:20	曇り	9	南	7.2	1	27.5	1.7	29.9	砂礫	灰	サンゴ片	なし
干潟域	St. 17	7/21	12:55	晴れ	5	東北東	1.5	－	33.9	－	37.0	砂泥	灰	なし	なし
	St. 18	7/22	12:20	晴れ	3	南南西	5	－	31.1	－	32.2	砂礫	灰オリーブ	サンゴ片・石	なし

注 1:波高は風浪階級により観測した。

2:位置だしの方法・測点・角度はGNSSにて行った。

表－ 6.2.50 (2) 現場測定項目 (冬季)

区分	調査地点	調査日	採泥時間	天気	雲量	風向	風速	波高 (風浪階級)	気温 (℃)	水深 (m)	泥温 (℃)	外観			臭気
												性状	色調	夾雑物	
礁池・ 礁縁域	St. 1	12/23	12:35	曇り	10	東	2	2	18.1	20.4	22.9	砂	明オリーブ灰	なし	なし
	St. 2	12/15	7:21	曇り	10	北東	4	3	15.0	11.3	21.0	砂泥	灰	なし	なし
	St. 3	12/23	13:00	曇り	10	東	2	2	19.8	0.7	22.2	砂礫	灰黄	海草片・サンゴ片・貝	なし
	St. 4	12/15	7:45	曇り	10	北東	4	3	14.9	1.0	18.1	砂礫	灰オリーブ	サンゴ片	なし
	St. 5	12/23	13:35	曇り	10	東	2	3	18.0	12.6	22.8	砂礫	灰白	貝・石・サンゴ片	なし
	St. 6	12/15	8:50	曇り	10	北東	4	3	14.1	1.9	19.0	砂礫	灰オリーブ	サンゴ片	なし
	St. 7	12/15	9:20	曇り	10	北東	4	3	14.3	3.7	20.0	砂泥	灰オリーブ	なし	なし
	St. 8	12/15	8:35	曇り	10	北東	4	3	15.2	5.1	20.1	砂泥	灰	なし	なし
干潟域	St. 9	12/9	8:33	雨	10	－	－	－	16.9	－	18.1	砂礫	灰オリーブ	サンゴ片	なし
	St. 10	12/9	7:10	雨	10	－	－	－	17.0	－	18.0	砂	灰オリーブ	なし	なし
礁池・礁縁域	St. 11	12/23	13:15	曇り	10	東	2	2	19.2	2.3	22.1	砂礫	灰白	サンゴ片	なし
干潟域	St. 12	12/11	10:42	晴れ	7	－	－	－	24.2	－	24.1	砂礫	にぶい黄	サンゴ片+石	なし
礁池・礁縁域	St. 13	12/18	8:35	曇り	9	東北東	2	1	19.0	3.1	19.2	砂	灰オリーブ	なし	なし
干潟域	St. 14	12/11	9:20	晴れ	7	－	－	－	22.0	－	23.1	砂礫	灰	サンゴ片	なし
	St. 15	12/11	8:30	晴れ	8	－	－	－	21.1	－	21.1	砂礫	灰オリーブ	サンゴ片+石	なし
礁池・礁縁域	St. 16	12/15	8:13	曇り	10	北北東	4	3	14.6	1.7	20.0	砂礫	灰	サンゴ片	なし
干潟域	St. 17	12/9	7:59	雨	10	－	－	－	17.0	－	18.6	砂泥	灰	なし	なし
	St. 18	12/10	8:15	曇り	10	－	－	－	20.1	－	21.0	砂礫	灰オリーブ	サンゴ片・石	なし

注 1:波高は風浪階級により観測した。

2:位置だしの方法・測点・角度はGNSSにて行った。

(イ) 一般項目

海域の底質分析結果は、表－ 6.2.52 に示すとおりである。また、SPSS の評価一覧は表－ 6.2.51 に示すとおりである。

ア) 夏季

(a) 粒度組成

海域における粒度組成の結果をみると、St.2 では、シルト・粘土分が占める割合が 66.1%（シルト分 57.7%、粘土分 8.4%）と他の地点よりも高かった。

(b) 含水率

含水率は 6.3～32.6%の範囲となっており、St.2 で最も高かった。

(c) 強熱減量

強熱減量は 3.6～8.5%の範囲となっており、St.2 で最も高かった。

(d) 全硫化物

全硫化物は、定量下限値（0.005mg/g）未満～0.014mg/g の範囲となっており、St.7 で最も高かった。

(e) COD

底質の COD は、定量下限値（0.5mg/g）未満～3.1mg/g の範囲となっており St.2 で最も高かった。

(f) 底質中懸濁物質含量（海域：SPSS）

SPSS は 5.1～1460kg/m³ となっており、St.2 が最も高く、SPSS のランク 8（400kg/m³ 以上）に該当した。また St.8 もランク 8 に該当した。

イ) 冬季

(a) 粒度組成

海域における粒度組成の結果をみると、St. 2 では、シルト・粘土分が占める割合が 69.5%（シルト分 59.9%、粘土分 9.6%）と他の地点よりも高かった。

(b) 含水率

含水率は 11.9～31.8%の範囲となっており、St. 5 で最も高かった。

(c) 強熱減量

強熱減量は 3.8～8.4%の範囲となっており、St. 2 で最も高かった。

(d) 全硫化物

全硫化物は、定量下限値（0.005mg/g）未満～0.009mg/g の範囲となっており、St. 2 で最も高かった。

(e) COD

底質の COD は、0.5mg/g～3.6mg/g の範囲となっており St. 2 で最も高かった。

(f) 底質中懸濁物質含量（海域：SPSS）

SPSS は 15.6～1680kg/m³ となっており、St. 2 が最も高く、SPSS のランク 8（400kg/m³ 以上）に該当した。また St. 7 及び St. 8 もランク 8 に該当した。

表－ 6.2.51 SPSS の評価一覧

SPSS (kg/m ³)			底質状況とその他参考事項
ランク	下限	上限	
1	－	<0.4	水中で砂をかき混ぜてもほとんど濁らない。 白砂がひろがり生物活動はあまりみられない。
2	0.4≦	<1	水中で砂をかき混ぜても懸濁物質の舞い上がりを確認しにくい。 白砂がひろがり生物活動はあまりみられない。
3	1≦	<5	水中で砂をかき混ぜると懸濁物質の舞い上がりが確認できる。 生き生きとしたサンゴ礁生態系がみられる。
4	5≦	<10	見た目ではわからないが、水中で砂をかき混ぜると懸濁物質で海が濁る。 生き生きとしたサンゴ礁生態系がみられる。透明度良好。
5a	10≦	<30	注意してみると底質表面に懸濁物質の存在がわかる。 生き生きとしたサンゴ礁生態系のSPSS上限ランク。
5b	30≦	<50	底質表面にホコリ状の懸濁物質がかぶさる。 透明度が悪くなり、サンゴ被度に悪影響が出始める。
6	50≦	<200	一見して赤土等の堆積がわかる。底質攪拌で赤土等が色濃く懸濁。 ランク6以上は、明らかに人為的な赤土等の流出による汚染があると判断。
7	200≦	<400	干潟では靴底の模様がくっつきつく。赤土等の堆積が著しいがまだ砂を確認できる。 樹枝状ミドリイシ類の大きな群体はみられず、塊状サンゴの出現割合が増加。
8	400≦	－	立つと足がめり込む。見た目は泥そのもので砂を確認できない。 赤土汚染耐性のある塊状サンゴが砂漠のサボテンのように点在。

表－ 6.2.52 (1) 底質分析結果（夏季）

調査日：令和2年7月8日～9日、20日～22日

項目 \ 調査地点		単位	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	St. 9
一般項目	含水率	(%)	30.3	32.6	25.4	25.3	30.3	27.6	25	27.1	23.5
	強熱減量	(%)	4.9	8.5	5.3	6.1	5.3	5.3	5.5	6.7	4
	硫化物	(mg/g)	<0.005	0.013	0.007	0.013	<0.005	<0.005	0.014	<0.005	<0.005
	COD	(mg/g)	0.6	3.1	1.3	1.5	1.3	1.1	1.4	1.9	0.6
粒度組成	粗礫分(19～75mm)	(%)	－	－	－	1.9	0.9	4.2	－	－	1.0
	中礫分(4.75～19mm)	(%)	0.3	－	6.2	11.0	3.4	12.2	－	－	4.4
	細礫分(2.0～4.75mm)	(%)	0.2	－	4.0	12.2	5.5	9.1	1.2	－	1.2
	粗砂分(0.85～2.0mm)	(%)	1.9	－	24.0	34.5	25.3	15.6	7.5	0.2	5.4
	中砂分(0.25～0.85mm)	(%)	29.9	2.5	49.5	34.2	53.7	32.6	52.9	1.8	39.2
	細砂分(0.075～0.25mm)	(%)	65.5	31.4	13.0	2.0	8.9	22.9	28.0	53.7	47.3
	シルト分(0.005～0.075mm)	(%)	0.1	57.7	1.3	1.5	0.7	1.0	5.6	37.7	0.6
	粘土分(0.005mm以下)	(%)	2.1	8.4	2.0	2.7	1.6	2.4	4.8	6.6	0.9
その他	SPSS	(kg/m ³)	8.2	1460	66.4	214	38.0	101	255	488	42.6
		ランク	4	8	6	7	5b	6	7	8	5b

項目 \ 調査地点		単位	St. 10	St. 11	St. 12	St. 13	St. 14	St. 15	St. 16	St. 17	St. 18
一般項目	含水率	(%)	24.5	28.9	6.3	28.1	21.1	19.7	26.1	22.7	23.0
	強熱減量	(%)	4.5	5.2	5.4	4.6	5	5.4	5.3	3.6	5.2
	硫化物	(mg/g)	<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.008	<0.005	0.010	<0.005	0.006
	COD	(mg/g)	0.5	1	0.6	1.2	0.9	0.9	1.1	0.6	0.9
粒度組成	粗礫分(19～75mm)	(%)	－	1.1	－	－	－	－	2.2	－	12.2
	中礫分(4.75～19mm)	(%)	－	4.1	11.6	－	1.1	2.1	4.9	－	19.5
	細礫分(2.0～4.75mm)	(%)	－	9.5	27.8	－	3.5	3.5	6.3	0.4	7.9
	粗砂分(0.85～2.0mm)	(%)	1.2	47.5	44.1	0.2	13.9	21.0	24.7	3.2	11.9
	中砂分(0.25～0.85mm)	(%)	23.6	35.7	15.8	12.9	43.2	51.6	49.9	27.5	32.8
	細砂分(0.075～0.25mm)	(%)	70.9	0.7	0.3	74.9	34.0	17.1	9.5	66.7	13.4
	シルト分(0.005～0.075mm)	(%)	1.0	0.1	－	6.7	0.6	1.3	0.5	－	0.9
	粘土分(0.005mm以下)	(%)	3.3	1.3	0.4	5.3	3.7	3.4	2.0	2.2	1.4
その他	SPSS	(kg/m ³)	84.5	8.3	5.1	180	110	231	62.4	56.5	106
		ランク	6	4	4	6	6	7	6	6	6

注：全硫化物の<0.005mg/g は定量下限値未満を示す。

表－ 6.2.52 (2) 底質分析結果 (冬季)

調査日：令和2年12月9日～11日, 12月15日, 12月18日, 12月23日

調査地点 項目		単位	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	St. 9
一般項目	含水率	(%)	30.1	27.4	26.7	27.6	31.8	29.8	24.8	29.4	25.7
	強熱減量	(%)	5.4	8.4	5.5	5.7	5.5	5.1	5.7	6.2	4.3
	硫化物	(mg/g)	<0.005	0.009	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.007
	COD	(mg/g)	0.7	3.6	0.8	1.2	0.9	0.9	1.6	1.8	0.5
粒度組成	粗礫分 (19～75mm)	(%)	－	－	1.4	9.3	6.3	1.8	－	－	1.6
	中礫分 (4.75～19mm)	(%)	－	－	8.4	8.7	10.1	6.1	－	－	8.5
	細礫分 (2.0～4.75mm)	(%)	0.1	－	5.8	8.7	8.0	4.9	0.5	－	2.4
	粗砂分 (0.85～2.0mm)	(%)	0.8	0.1	33.7	29.5	21.6	13.6	5.7	0.3	8.7
	中砂分 (0.25～0.85mm)	(%)	16.8	2.2	42.1	39.0	44.2	48.4	43.3	1.5	41.8
	細砂分 (0.075～0.25mm)	(%)	71.8	28.2	6.8	2.2	7.6	22.5	34.9	56.3	36.0
	シルト分 (0.005～0.075mm)	(%)	6.0	59.9	－	－	0.5	－	8.2	35.2	－
	粘土分 (0.005mm以下)	(%)	4.5	9.6	1.8	2.6	1.7	2.7	7.4	6.7	1.0
その他	SPSS	(kg/m ³)	15.6	1680	25.4	93.3	39.6	80.8	450	471	27.5
		ランク	5a	8	5a	6	5b	6	8	8	5a

調査地点 項目		単位	St. 10	St. 11	St. 12	St. 13	St. 14	St. 15	St. 16	St. 17	St. 18
一般項目	含水率	(%)	26.3	27.4	11.9	29.1	23.7	22.8	26.9	22.7	25.6
	強熱減量	(%)	4.7	5.4	6.3	4.3	5.1	5.2	5.3	3.8	5.7
	硫化物	(mg/g)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	<0.005
	COD	(mg/g)	0.7	0.8	0.9	0.8	1.0	0.8	1.1	0.5	1.1
粒度組成	粗礫分 (19～75mm)	(%)	－	8.3	4.4	－	5.5	1.1	2.5	－	5.2
	中礫分 (4.75～19mm)	(%)	－	14.6	17.1	－	4.0	6.2	8.0	－	20.5
	細礫分 (2.0～4.75mm)	(%)	－	16.5	9.5	－	4.4	5.7	5.3	0.2	6.4
	粗砂分 (0.85～2.0mm)	(%)	1.7	31.6	23.0	0.4	11.4	26.8	27.3	4.2	12.6
	中砂分 (0.25～0.85mm)	(%)	28.0	26.4	31.3	14.4	39.6	46.3	47.0	37.6	39.7
	細砂分 (0.075～0.25mm)	(%)	68.1	1.4	7.3	76.7	30.7	11.5	7.6	56.1	11.5
	シルト分 (0.005～0.075mm)	(%)	－	－	3.5	3.1	1.2	0.7	0.1	0.1	1.4
	粘土分 (0.005mm以下)	(%)	2.2	1.2	3.9	5.4	3.2	1.7	2.2	1.8	2.7
その他	SPSS	(kg/m ³)	26.9	19.1	327	109	159	93.3	70.0	52.3	257
		ランク	5a	5a	7	6	6	6	6	6	7

注：全硫化物の<0.005mg/g は定量下限値未満を示す。